

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન

(સમય તા : ૦૨.૧૧.૧૩ થી તા : ૦૬.૧૧.૧૩)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાક્રિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	0.00
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગે.)	34.2
લઘુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	19.5
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	77-34
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	2.4

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૦૬.૧૧.૧૩ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૦૨.૧૧.૧૩	૦	૦
	૦૩.૧૧.૧૩	૦	૦
	૦૪.૧૧.૧૩	૦	૦
	૦૫.૧૧.૧૩	૦	૦
	૦૬.૧૧.૧૩	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૨.૧૧.૧૩	૩૨	૩૧
	૦૩.૧૧.૧૩	૩૩	૩૧
	૦૪.૧૧.૧૩	૩૨	૩૨
	૦૫.૧૧.૧૩	૩૩	૩૨
	૦૬.૧૧.૧૩	૩૩	૩૨
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૨.૧૧.૧૩	૨૧	૧૯
	૦૩.૧૧.૧૩	૨૨	૨૦
	૦૪.૧૧.૧૩	૨૨	૨૦
	૦૫.૧૧.૧૩	૨૨	૨૦
	૦૬.૧૧.૧૩	૨૨	૨૦
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૦૨.૧૧.૧૩	મોટે ભાગે ચોખ્ખુ	મોટે ભાગે ચોખ્ખુ
	૦૩.૧૧.૧૩	ચોખ્ખુ આકાશ	ચોખ્ખુ આકાશ
	૦૪.૧૧.૧૩	ચોખ્ખુ આકાશ	ચોખ્ખુ આકાશ
	૦૫.૧૧.૧૩	ચોખ્ખુ આકાશ	ચોખ્ખુ આકાશ
	૦૬.૧૧.૧૩	ચોખ્ખુ આકાશ	ચોખ્ખુ આકાશ
મહત્તમ ભેજ (%)	૦૨.૧૧.૧૩	૬૬	૬૨
	૦૩.૧૧.૧૩	૭૦	૬૭
	૦૪.૧૧.૧૩	૬૩	૬૦
	૦૫.૧૧.૧૩	૬૩	૫૯
	૦૬.૧૧.૧૩	૫૮	૫૫
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૦૨.૧૧.૧૩	૫૩	૪૯
	૦૩.૧૧.૧૩	૫૧	૪૬
	૦૪.૧૧.૧૩	૪૯	૪૩
	૦૫.૧૧.૧૩	૪૬	૪૧
	૦૬.૧૧.૧૩	૪૬	૪૦
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૦૨.૧૧.૧૩	૦૧૧	૦૧૧
	૦૩.૧૧.૧૩	૦૧૧	૦૦૯
	૦૪.૧૧.૧૩	૦૧૨	૦૧૧
	૦૫.૧૧.૧૩	૦૧૦	૦૦૮
	૦૬.૧૧.૧૩	૦૧૪	૦૧૪
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૦૨.૧૧.૧૩	૨૭૦	૨૭૯
	૦૩.૧૧.૧૩	૦૪૩	૦૪૨
	૦૪.૧૧.૧૩	૦૬૦	૦૪૨
	૦૫.૧૧.૧૩	૦૬૮	૦૪૪
	૦૬.૧૧.૧૩	૩૫૪	૩૫૭

પત્રક-ક ઘ×ઠ
જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
	કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાક મા કુલો અને અપરીપકવ જીંડવા ને ખરતા અટકવાવવા માટે નેપ્થેલિક એસીટીક એસીડ ૭ મીલી/ ૧૦ લીટર પાણી મા મીશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ❖ કપાસ ની વીણી વહેલી સવારે કરવી.
	દીવેલા	<ul style="list-style-type: none"> ➤ પાક ૪૦ દીવસ નો થાય ત્યારે પુરતી ખાતર નો પ્રથમ હપ્તો હેક્ટરે ૪૧ કીલો યુરીયા પ્રમાણે આપવું
	ભીંડો	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ડુખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ નીયંત્રણ માટે લીમ્બોળી ના બીજ નો અકું ૫૦૦ મીલી અથવા લીમ્બોળી નુ તેલ ૫૦ મીલી ૧૦ લિટર પાણી મા ઓગાળી ૧૫ દીવસ ના અંતરે ૪ છંટકાવ કરવા.
	મરચા	<ul style="list-style-type: none"> ✓ પાક મા સુકારા ના રોગ ના નિયંત્રણ માટે ટ્રાઈકોડરમા વિરીડી ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણી મા ઓગાળી છોડ ના થડ પાસે ડ્રેથિંગ કરવું.
	દાડમ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ દાડમ મા રસ યુસનાર કુદા ના નીયંત્રણ માટે કંરજ તેલ, નેપાળો(રતન જ્યોત) તેલ અથવા લીમ્બોળી નુ તેલ ૪૦ મીલી/ ૧૦ લીટર લીટર પાણી મા ઓગાળી છંટકાવ કરવો .
	પશુપાલન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ઈતરડી ના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રિન અથવા એમીટાજ દવા ૧૦ લિટર પાણી મા નાખી છંટકાવ કરવો. ❖ પુખ્ત પશુ ને ૬ થી ૮ કિલો સારી ગુણવત્તા વાલો સુકો ચારો અને ૧૫ થી ૨૦ કીલો લીલો ચારો આપવો . ❖ ચોમાસા દરમિયાન જાનવરોને માખીઓ અને મછરોના ઉપદ્રવ થી બચાવવા જાનવરો ના રહેઠાણ ની જગ્યાએ ફીનાઈલ નો છંટકાવ કરવો

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date: 01-11-2013

(Period 02 to 06 November -2013)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	0.00
Maximum temperature °C	33.2-34.7
Minimum temperature °C	18.5-21.0
RH % (Morning/Afternoon)	77-34
Wind speed (Kmph)	2.0-2.9
Cloud cover	0

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 06- 11-2013

Parameters	Day-1 02-11-13	Day-5 03-11-13	Day-5 04-11-13	Day-5 05-11-13	Day-5 06-11-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	32	33	32	33	33
Minimum temperature °C	21	22	22	22	22
Cloud cover (Okta)	1	0	0	1	1
RH % (Morning/After noon)	66-53	70-51	63-49	63-46	58-46
Wind speed (Kmph)	011	011	012	010	014
Wind direction(Deg)	270	043	060	068	354

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Cotton	Maturity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ To reduce dropping of flower and immature balls, spray Nephthelic acetic Acid in 10 liter of water. ▪ Picking of cotton should be carried out early in the morning.
Castor	Capsule foemation	<ul style="list-style-type: none"> • Apply N fertilizer as top dressing @41 kg urea/ ha after 40 DAS.
Ladies Finger	Fruiting	❖ For the control of Shoot and fruit borer, spray neem seed extract 500ml or neem seed oil 50 ml/10 liter of water at 15 days interval (total 4 spray).
Chili	Fruiting	❖ For the control of wilting disease, drenching of <i>Tricoderma viride</i> @40 gm/10 liter of water
Pomegranate	Fruiting	❖ For the control of fruit sucking moth, spray neem oil 40ml/10 lit. of water.
Live stocks	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of tick, spray Deltamathrin or Amitaz 20 ml/10 liter of water. ➤ Provide 6-8 kg of good quality of dry fodder with 15 to 20 kg green fodder to animal. ➤ Spry phenyl in animal shed to protect the animals against flays and mosquitoes.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date : 01-11-2013

(Period 02 to 06 November -2013)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 06- 11-2013

Parameters	Day-1 02-11-13	Day-5 03-11-13	Day-5 04-11-13	Day-5 05-11-13	Day-5 06-11-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	31	31	32	32	32
Minimum temperature °C	19	20	20	20	20
Cloud cover (Okta)	1	0	1	1	1
RH % (Morning/After noon)	62-49	67-46	60-43	59-41	55-40
Wind speed (Kmph)	011	009	011	008	014
Wind direction(Deg)	279	042	042	044	357

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Cotton	Maturity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ To reduce dropping of flower and immature balls, spray Nephthelic acetic Acid in 10 liter of water. ▪ Picking of cotton should be carried out early in the morning.
Castor	Capsule foemation	<ul style="list-style-type: none"> • Apply N fertilizer as top dressing @41 kg urea/ ha after 40 DAS.
Ladies Finger	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of Shoot and fruit borer, spray neem seed extract 500ml or neem seed oil 50 ml/10 liter of water at 15 days interval (total 4 spray).
Chili	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of wilting disease, drenching of <i>Tricoderma viride</i> @40 gm/10 liter of water
Pomegranate	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of fruit sucking moth, spray neem oil 40ml/10 lit. of water.
Live stocks	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of tick, spray Deltamathrin or Amitaz 20 ml/10 liter of water. ➤ Provide 6-8 kg of good quality of dry fodder with 15 to 20 kg green fodder to animal. ➤ Spry phenyl in animal shed to protect the animals against flays and mosquitoes.