

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
(સમય તા: ૦૪.૦૧.૧૨ થી ૦૮.૦૧.૧૨)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	000.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	28.0
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	12.5
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	50-30
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	8.3

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૦૮.૦૧.૧૨ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૦૪.૦૧.૧૨	૦	૦
	૦૫.૦૧.૧૨	૦	૦
	૦૬.૦૧.૧૨	૦	૦
	૦૭.૦૧.૧૨	૦	૦
	૦૮.૦૧.૧૨	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૪.૦૧.૧૨	૨૬	૨૭
	૦૫.૦૧.૧૨	૨૭	૨૮
	૦૬.૦૧.૧૨	૨૮	૨૭
	૦૭.૦૧.૧૨	૨૭	૨૭
	૦૮.૦૧.૧૨	૨૭	૨૬
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૪.૦૧.૧૨	૧૨	૧૫
	૦૫.૦૧.૧૨	૧૩	૧૬
	૦૬.૦૧.૧૨	૧૪	૧૬
	૦૭.૦૧.૧૨	૧૩	૧૬
	૦૮.૦૧.૧૨	૧૨	૧૫
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૦૪.૦૧.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૫.૦૧.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૬.૦૧.૧૨	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું
	૦૭.૦૧.૧૨	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું
	૦૮.૦૧.૧૨	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૦૪.૦૧.૧૨	૪૭	૫૦
	૦૫.૦૧.૧૨	૬૩	૭૨
	૦૬.૦૧.૧૨	૭૯	૮૧
	૦૭.૦૧.૧૨	૫૪	૫૪
	૦૮.૦૧.૧૨	૪૪	૪૫
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૦૪.૦૧.૧૨	૩૩	૩૩
	૦૫.૦૧.૧૨	૩૧	૩૩
	૦૬.૦૧.૧૨	૪૫	૪૯
	૦૭.૦૧.૧૨	૪૦	૩૮
	૦૮.૦૧.૧૨	૩૦	૩૧
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૦૪.૦૧.૧૨	૦૧૩	૦૧૩
	૦૫.૦૧.૧૨	૦૧૫	૦૧૫
	૦૬.૦૧.૧૨	૦૧૫	૦૧૫
	૦૭.૦૧.૧૨	૦૧૯	૦૧૯
	૦૮.૦૧.૧૨	૦૧૭	૦૧૭
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૦૪.૦૧.૧૨	૩૪	૩૨
	૦૫.૦૧.૧૨	૯૦	૧૯૫
	૦૬.૦૧.૧૨	૮	૫૩
	૦૭.૦૧.૧૨	૧૭	૨૦
	૦૮.૦૧.૧૨	૧૮	૨૬

**પત્રક-ક**  
**જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ**

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
<b>દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર</b>	ઘઉં	૧. મર્યાદીત પિયત વ્યવસ્થા હોયતો પાકને કટોકટી અવસ્થાઓ જેવીકે તંતુમુળ, ફુટ અવસ્થા તથા ગાભ અવસ્થાએ અવશ્ય પિયત આપવું.
	ધાણા	૧. ધાણા ના ભુકીછારાના નિયંત્રણ માટે ડીનોકેપ ૪૮ ઈ.સી. ૧૦ મીલી. અથવા દ્રાવ્ય ગંધક ૮૦ % વે.પા. ૩૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણી મા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	લસણ	૧. પાકમા સમયસર નિંદામણ કરવું. ૨. ગાંઠીયાના વિકાસ સમયે અવશ્ય પિયત આપવું. ૩. પાનના સુકારા રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણી મા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	ડુંગળી	૧. પાકમા હાથ થી નિંદામણ કરવું અને કટોકટી અવસ્થાએ અવશ્ય પિયત આપવું.
	આંબો	૧. આંબામા મઘીયા જીવાંતના નિયંત્રણ માટે મોનોક્રોટોફોસ ૧૦ મીલી. અથવા કાર્બારીલ ૫૦ ટકા વે.પા ૪૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણી મા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	લીંબુ	૧. બળીયા ટપકા રોગના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્સી કલોરાઈડ ૩૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણી મા ભેળવી છંટકાવ કરવો.



**AGROMET ADVISORY SERVICE BULLETIN FOR  
JUNAGADH DISTRICT OF SOUTH SAURASHTRA AGRO-  
CLIMATIC ZONE**

(Issued jointly by IAAS, Junagadh, Junagadh Agricultural University and  
India Meteorological Department)

(Period 04 to 08 January-2012)

**Significant weather for the preceding week**

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	26.8-29.0
Minimum temperature °C	9.5-14.5
RH % (Morning/Afternoon)	50-30
Wind speed (Kmph)	3.9-10.6
Cloud cover	0

**Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 08-01-2012**

Parameters	Day-1 04-01- 2012	Day-2 05-01-12	Day-3 06-01-12	Day-4 07-01-12	Day-5 08-01- 2012
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	26	27	28	27	27
Minimum temperature °C	12	13	14	13	12
Cloud cover (Okta)	0	0	1	2	1
RH % (Morning/After noon)	47-33	63-31	79-45	54-40	44-30
Wind speed (Kmph)	013	015	015	019	017
Wind direction(Deg)	34	90	8	17	18

**Agro meteorological Advisories**

Crop	Stage	Agromet Advisories
Chickpea/Gram	Pod Development	1) For the control of <i>Heliothis</i> , Spray Endosulphan 35 EC 20 ml. or Monocrotophos 36 EC. 12 ml. or Quinalphos 25 Ec 20 ml. or D.D.V.P 85 EC 5 ml in 10 liter of water. 2) Apply irrigation as and when required.
Wheat	Tillering	1) Apply irrigation to the crop at the tillering and dough stages.
Cotton	Physiological maturity	1) Picking of cotton should be carried out.
Castor	Capsule developments	1) Apply irrigation as and when required..
Garlic	-	1) Timely weeding operation should be carried out. 2) Apply irrigation at the time of bulb formation and development.

(Period 04 to 08 January-2012)

**Weather forecast for Porbandar Dist. until 0830 hrs of 08-01-2012**

Parameters	Day-1 04-01- 2012	Day-2 05-01-12	Day-3 06-01-12	Day-4 07-01-12	Day-5 08-01- 2012
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature <sup>0</sup> C	27	28	27	27	26
Minimum temperature <sup>0</sup> C	15	16	16	16	15
Cloud cover (Okta)	0	0	1	2	1
RH % (Morning/After noon)	50-38	72-33	81-49	54-38	45-31
Wind speed (Kmph)	013	015	015	019	017
Wind direction(Deg)	32	195	53	20	26

**Agro meteorological Advisories**

Crop	Stage	Agromet Advisories
Chickpea/Gram	Pod Development	1) For the control of heliothis ,Spray Endosulphan 35 EC 20 ml. or Monocrotophos 36 EC. 12 ml. or Quinalphos 25 Ec 20 ml. or D.D.V.P 85 EC 5 ml in 10 liter of water. 2) Apply irrigation as and when required.
Wheat	Tillering/ Dough	1) Apply irrigation to the crop at the tillering and dough stages.
Cotton	Physio. maturity	1) Picking of cotton should be carried out.
Castor	Capsule Development	2) Apply irrigation as and when required.
Garlic	-	1) Timely weeding operation should be carried out. 2) Apply irrigation at the time of bulb formation and development.