

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(સમય તા: ૧૫.૧૨.૧૦ થી ૧૯.૧૨.૧૦)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	000.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	28.5
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	11.2
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	80-34
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	3.2

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૧૯.૧૨.૧૦ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૧૫.૧૨.૧૦	૦	૦
	૧૬.૧૨.૧૦	૦	૦
	૧૭.૧૨.૧૦	૦	૦
	૧૮.૧૨.૧૦	૦	૦
	૧૯.૧૨.૧૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૫.૧૨.૧૦	૨૮	૨૮
	૧૬.૧૨.૧૦	૨૯	૨૯
	૧૭.૧૨.૧૦	૩૦	૨૯
	૧૮.૧૨.૧૦	૨૯	૨૯
	૧૯.૧૨.૧૦	૨૯	૨૯
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૫.૧૨.૧૦	૧૭	૧૭
	૧૬.૧૨.૧૦	૧૮	૧૮
	૧૭.૧૨.૧૦	૧૯	૧૯
	૧૮.૧૨.૧૦	૨૦	૧૮
	૧૯.૧૨.૧૦	૨૦	૧૮
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૧૫.૧૨.૧૦	Clear	Clear
	૧૬.૧૨.૧૦	Clear	Clear
	૧૭.૧૨.૧૦	Clear	Clear
	૧૮.૧૨.૧૦	Clear	Clear
	૧૯.૧૨.૧૦	Clear	Clear
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૫.૧૨.૧૦	૪૨	૪૭
	૧૬.૧૨.૧૦	૪૯	૪૫
	૧૭.૧૨.૧૦	૫૦	૬૩
	૧૮.૧૨.૧૦	૩૮	૫૫
	૧૯.૧૨.૧૦	૩૦	૩૦
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૫.૧૨.૧૦	૩૬	૩૫
	૧૬.૧૨.૧૦	૩૬	૩૮
	૧૭.૧૨.૧૦	૨૮	૩૧
	૧૮.૧૨.૧૦	૨૨	૨૧
	૧૯.૧૨.૧૦	૨૩	૧૮
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૫.૧૨.૧૦	૦૧૦	૦૧૨
	૧૬.૧૨.૧૦	૦૧૦	૦૧૦
	૧૭.૧૨.૧૦	૦૧૦	૦૧૦
	૧૮.૧૨.૧૦	૦૧૧	૦૧૧
	૧૯.૧૨.૧૦	૦૧૨	૦૧૫
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૧૫.૧૨.૧૦	૦૫૦	૦૬૦
	૧૬.૧૨.૧૦	૦૫૦	૦૫૦
	૧૭.૧૨.૧૦	૦૩૦	૦૨૦
	૧૮.૧૨.૧૦	૦૨૦	૦૨૦
	૧૯.૧૨.૧૦	૦૪૦	૦૪૦

પત્રક-ક
જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	કપાસ	૧. કપાસ જેમ પાકતો જાય તેમ તેની વીણી કરતા રહેવી. ૨. કપાસના પાકને જરૂરિયાત મુજબ પાણી આપવું.
	એરડા	૧. એરડાના પાકમા મોલોમસી, તરતડીયા, ગ્રિયસ અને સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે ટ્રાયઝોફોસ ૨૦ મી.લી. અથવા મિથાઈલ-ઓ-ડિડિમેટોન અથવા મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ઈ.સી. ૧૨ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો. ૨. દિવેલાની લુમો પરીપકવ થાય એટલે કાળજીપુર્વક લણણી કરી લેવી.
	શેરડી	૧. શેરડીના પાકને જમીનની પ્રત મુજબ ૬ થી ૭ દિવસે પિયત આપવું. ૨. પાકનો વાવેતર સમય ધ્યાને લઈને પુર્તિ ખાતરનો પ્રથમ હપ્તો એક થી દોઢ માસે હેક્ટરે ૧૬૨ કિગ્રા. યુરીયા (૨૭ કિગ્રા. પ્રતિ વીઘા) અથવા ૩૭૫ કિગ્રા. એમોનીયમ સલ્ફેટ (૬૦ કિગ્રા. પ્રતિ વીઘા) આપવું.
	જીરૂ તથા ધાણા	૧. જીરૂના પાકમા ચરમી રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ દવા ૨૫ ગ્રામ ૧૦ લી. પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો. ૨. જીરૂ તથા ધાણાના પાકમા ભુકીછારા રોગના નિયંત્રણ માટે ડીનોકેપ ૪૮ ઈ.સી. ૧૦ મીલી. અથવા દૂરવ્ય ગંધક ૮૦% વે.પા. ૩૦ ગ્રામ ૧૦ લી. પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	શાકભાજી પાકો	૧. મરચીની રોપણી બાદ યુસીયા પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ માટે દાણાદાર ફોરેટ અથવા થીમેટ ૧૦જી છોડદીઠ ૨ગ્રામ જમીનમા આપવું.