

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
( સમય તા : ૨૨.૦૯.૧૨ થી ૨૬.૦૯.૧૨ )

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	000.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	33.2
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	23.9
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	87-53
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	4.9

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી ( તા.૨૬.૦૯.૧૨ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૨.૦૯.૧૨	૦	૦
	૨૩.૦૯.૧૨	૦	૦
	૨૪.૦૯.૧૨	૦	૦
	૨૫.૦૯.૧૨	૦	૦
	૨૬.૦૯.૧૨	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૨.૦૯.૧૨	૩૧	૨૯
	૨૩.૦૯.૧૨	૩૧	૨૯
	૨૪.૦૯.૧૨	૩૦	૨૯
	૨૫.૦૯.૧૨	૩૦	૨૯
	૨૬.૦૯.૧૨	૩૦	૩૦
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૨.૦૯.૧૨	૨૬	૨૬
	૨૩.૦૯.૧૨	૨૭	૨૬
	૨૪.૦૯.૧૨	૨૭	૨૬
	૨૫.૦૯.૧૨	૨૭	૨૬
	૨૬.૦૯.૧૨	૨૭	૨૭
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૨.૦૯.૧૨	અંશત: વાદળછાયુ	મોટેભાગેચોખ્ખું
	૨૩.૦૯.૧૨	મોટેભાગેચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૨૪.૦૯.૧૨	મોટેભાગેચોખ્ખું	અંશત: વાદળછાયું
	૨૫.૦૯.૧૨	મોટેભાગેચોખ્ખું	મોટેભાગેચોખ્ખું
	૨૬.૦૯.૧૨	મોટેભાગેચોખ્ખું	મોટેભાગેચોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૨૨.૦૯.૧૨	૭૮	૭૯
	૨૩.૦૯.૧૨	૭૪	૭૬
	૨૪.૦૯.૧૨	૮૩	૮૪
	૨૫.૦૯.૧૨	૭૫	૭૩
	૨૬.૦૯.૧૨	૭૬	૭૮
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૨.૦૯.૧૨	૬૯	૬૮
	૨૩.૦૯.૧૨	૬૯	૬૮
	૨૪.૦૯.૧૨	૭૦	૬૮
	૨૫.૦૯.૧૨	૬૬	૬૩
	૨૬.૦૯.૧૨	૬૮	૬૮
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૨.૦૯.૧૨	૦૦૯	૦૦૮
	૨૩.૦૯.૧૨	૦૧૧	૦૧૦
	૨૪.૦૯.૧૨	૦૧૨	૦૦૭
	૨૫.૦૯.૧૨	૦૧૦	૦૦૭
	૨૬.૦૯.૧૨	૦૦૬	૦૦૪
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૨.૦૯.૧૨	૨૬૧	૨૪૮
	૨૩.૦૯.૧૨	૨૩૮	૨૩૦
	૨૪.૦૯.૧૨	૨૩૨	૨૧૧
	૨૫.૦૯.૧૨	૨૭૮	૨૪૪
	૨૬.૦૯.૧૨	૨૧૭	૧૨૧

**પત્રક-ક**  
**જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ**

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	કપાસ	- વાવેતર નો સમય ધ્યાને લઈ પાક ત્રણ માસ નો થયે પુર્તી રસાયણીક ખાતરનો ત્રીજો હપ્તો ૪૦ કિગ્રા નાઈટ્રોજન એટલે કે ૮૮ કિગ્રા યુરીયા આપવું.
	મગફળી	- મગફળી નો પાક પીળો જણાય તો ૧૦૦ ગ્રામ હિરાકસી (ફેરસ સલ્ફેટ) અને ૧૦ ગ્રામ લીંબુના ફુલ (સાઈટ્રીક એસીડ) ૧૦ લીટર પાણીમાઓગાળી છંટકાવ કરવો. - મગફળીમા ગેરૂ તેમજ ટીકકા રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ દવા ૨૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાઢાવણ બનાવી છંટકાવ કરવો.
	દિવેલા	- દિવેલા ના પાકમા જરૂરીયાત મુજબ આંતરખેડ તથા નિંદામણ કરવું.
	શાકભાજી	- શાકભાજીના પાકોમા જરૂરીયાત મુજબ નિંદામણ કરવું.

## Junagadh

Phone: 0285-2670139

Date :21-09-2012

**(Period 22 to 26 September -2012)**

### Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	32.5-33.6
Minimum temperature °C	23.4-24.3
RH % (Morning/Afternoon)	87-53
Wind speed (Kmph)	2.8-7.1
Cloud cover	4-6

### Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 26-09-2012

Parameters	Day-1 22-09-2012	Day-2 23-09-12	Day-3 24-09-12	Day-4 25-09-12	Day-5 26-09-12
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	31	31	30	30	30
Minimum temperature °C	26	27	27	27	27
Cloud cover (Okta)	3	2	2	1	1
RH % (Morning/After noon)	78-69	74-69	83-70	75-66	76-68
Wind speed (Kmph)	009	011	012	010	006
Wind direction(Deg)	261	238	232	278	217

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Cotton	Squaring/Ball formation	- After three month of sowing, apply third dose of top dressing of nitrogen @ 40 kg/ha i.e. 88 kg urea/ha.
Ground nut	Pegging	- If yellowing in ground nut is found, Spray Ferrous sulphate @ 100 gm with 10 gm of citric acid in 10 liter of water. - For the control of tikka disease in peanut, spray mencozeb @ 20 gm in 10 liter of water.
Castor	Vegetative	- Carry out interculturing and hand weeding in the crop.
Vegetables	-	- Carry out hand weeding in vegetable crops.

## Porbandar

Phone : 0285-2670139

Date : 21-09-2012

(Period 22 to 26 September -2012)

### Weather forecast for Porbandar Dist. until 0830 hrs of 26-09-2012

Parameters	Day-1 22-09-2012	Day-2 23-09-12	Day-3 24-09-12	Day-4 25-09-12	Day-5 26-09-12
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	29	29	29	29	30
Minimum temperature °C	26	26	26	26	27
Cloud cover (Okta)	1	0	3	2	1
RH % (Morning/After noon)	79-68	76-68	84-68	73-63	78-68
Wind speed (Kmph)	008	010	007	007	004
Wind direction(Deg)	248	230	211	244	121

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Cotton	Squaring/Ball formation	- After three month of sowing, apply third dose of top dressing of nitrogen @ 40 kg/ha i.e. 88 kg urea/ha.
Ground nut	Pegging	- If yellowing in ground nut is found, Spray Ferrous sulphate @ 100 gm with 10 gm of citric acid in 10 liter of water. - For the control of tikka disease in peanut, spray mencozeb @ 20 gm in 10 liter of water.
Castor	Vegetative	- Carry out interculturing and hand weeding in the crop.
Vegetables	-	- Carry out hand weeding in vegetable crops.