

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૂષિ સલાહ બુલેટીન

(સમય તા : ૨૮ .૦૩ .૧૪ થી તા : ૦૨ .૦૪ .૧૪)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

| હવામાન પરીબળો | કૂષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર |
|-----------------------------|--|
| વરસાદ (મીભી) | 00.0 |
| મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.) | 36.1 |
| લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.) | 20.3 |
| ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ) | 74-22 |
| પવનની ગતિ (કિમી/કલાક) | 5.8 |

પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૦૨.૦૪.૧૪ સુધી)

| હવામાન પરીબળોએ | તારીખ | દક્ષિણ સૈરાજુ | |
|----------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| | | જુનાગઢ | પોરબંદર |
| વરસાદ (મીમી) | ૨૮.૩.૧૪ | ૦ | ૦ |
| | ૩૦.૩.૧૪ | ૦ | ૦ |
| | ૩૧.૩.૧૪ | ૦ | ૦ |
| | ૦૧.૪.૧૪ | ૦ | ૦ |
| | ૦૨.૪.૧૪ | ૦ | ૦ |
| મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.) | ૨૮.૩.૧૪ | ૩૬ | ૩૪ |
| | ૩૦.૩.૧૪ | ૩૫ | ૩૪ |
| | ૩૧.૩.૧૪ | ૩૬ | ૩૫ |
| | ૦૧.૪.૧૪ | ૩૬ | ૩૫ |
| | ૦૨.૪.૧૪ | ૩૬ | ૩૫ |
| લઘૃતમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.) | ૨૮.૩.૧૪ | ૨૨ | ૨૦ |
| | ૩૦.૩.૧૪ | ૨૨ | ૨૦ |
| | ૩૧.૩.૧૪ | ૨૩ | ૨૧ |
| | ૦૧.૪.૧૪ | ૨૩ | ૨૨ |
| | ૦૨.૪.૧૪ | ૨૩ | ૨૨ |
| વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા) | ૨૮.૩.૧૪ | મોટેભાગે ચોખ્યુ | મોટેભાગે ચોખ્યુ |
| | ૩૦.૩.૧૪ | મોટેભાગે ચોખ્યુ | મોટેભાગે ચોખ્યુ |
| | ૩૧.૩.૧૪ | ચોખ્યુ | ચોખ્યુ |
| | ૦૧.૪.૧૪ | ચોખ્યુ | ચોખ્યુ |
| | ૦૨.૪.૧૪ | ચોખ્યુ | ચોખ્યુ |
| મહત્વમાન લેજ (%) | ૨૮.૩.૧૪ | ૬૫ | ૬૮ |
| | ૩૦.૩.૧૪ | ૬૯ | ૬૮ |
| | ૩૧.૩.૧૪ | ૬૭ | ૭૧ |
| | ૦૧.૪.૧૪ | ૬૮ | ૭૧ |
| | ૦૨.૪.૧૪ | ૭૮ | ૮૨ |
| લઘૃતમાન લેજ (%) | ૨૮.૩.૧૪ | ૫૦ | ૪૪ |
| | ૩૦.૩.૧૪ | ૫૩ | ૪૯ |
| | ૩૧.૩.૧૪ | ૪૯ | ૪૨ |
| | ૦૧.૪.૧૪ | ૫૦ | ૪૩ |
| | ૦૨.૪.૧૪ | ૫૫ | ૫૧ |
| પવનની ગતિ (કિમી/કલાક) | ૨૮.૩.૧૪ | ૦૨૦ | ૦૧૯ |
| | ૩૦.૩.૧૪ | ૦૨૨ | ૦૨૧ |
| | ૩૧.૩.૧૪ | ૦૨૩ | ૦૨૨ |
| | ૦૧.૪.૧૪ | ૦૨૧ | ૦૨૦ |
| | ૦૨.૪.૧૪ | ૦૧૮ | ૦૧૬ |
| પવનની દિશા (ડિગ્રી) | ૨૮.૩.૧૪ | ૩૩૦ | ૩૩૦ |
| | ૩૦.૩.૧૪ | ૩૩૦ | ૩૩ |
| | ૩૧.૩.૧૪ | ૩૨૦ | ૩૨૦ |
| | ૦૧.૪.૧૪ | ૩૨૦ | ૩૨૦ |
| | ૦૨.૪.૧૪ | ૩૧૦ | ૩૧૦ |

પત્રક-૫

જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

| પાકનું નામ | કૃષિ સલાહ |
|------------------------|--|
| લસણ | ❖ લસણની પરીપક્વ અવસ્થાએ લણણી કરવી અને સુકા વાતાવરણમા સુકવણી કરવી. |
| તુવેર | ❖ લસણની પરીપક્વ અવસ્થાએ લણણી કરવી અને સુકા વાતાવરણમા સુકવણી કરવી. |
| મેશી | <ul style="list-style-type: none"> ▪ મેશી ના પાકમા ભુકીછારા ના નિયંત્રણ માટે સલ્ફર ૮૦ % wp ૫૦ ગ્રામ/૧૫ લીટર પાણી મા ઓગાળી છંટકાવ કરવો |
| ભાડો | <ul style="list-style-type: none"> ➢ ડુખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ નીયંત્રણ માટે લીમ્બોળી ના બીજનો અર્ક ૫૦૦ મીલી અથવા લીમ્બોળી નુ તેલ ૫૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણી મા ઓગાળી ૧૫ દીવસ ના અંતરે ૪ છંટકાવ કરવો અથવા ડાઇવિપી ૫ મીલી અથવા ઈન્ફોકાકાર્બ ૨ મીલી અથવા સ્પિનોસાડ ૨ ગ્રામ/ ૧૦ લીટર પાણી મા ઓગાળી છંટકાવ કરવો |
| રીંગણા અને ટ્રેમેટા | <ul style="list-style-type: none"> ➢ પાકમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે ડાઈમીથોયેટ ૦.૦૩ % અથવા મીથાઈલ ઓ ડેમેટોન ૦.૦૨૫ % અથવા ટ્રાઇઝોફેસ ૦.૦૪ % અથવા એસીફેટ ૦.૧ ટકા ૧૦ લીટર પાણીમાં પ્રવાહી મીશ્રણનો છંટકાવ કરવો. |
| મરચા | <ul style="list-style-type: none"> ✓ પાકમા સુકારાના રોગના નિયંત્રણ માટે ટ્રાઇકોડરમા વિરીડી ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છોડ થડ પાસે ફ્રેંચીગ કરવુ. |
| ઉનાળુ મગ | <ul style="list-style-type: none"> ✓ મગના પાકમાં પાન ખાનારી ઈયળના નિયંત્રણ માટે મીથાઈલ ઓ ડેમેટોન ૧૦ મીલી અથવા મોનોકોટોફોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીના મેળવી જરૂરત મુજબ છંટકાવ કરવો. |
| ઉનાળુ મગફળી | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ઉનાળુ મગફળીમાં વહેલા લાગતા પાનના ટપકાં ના રોગ ના નિયંત્રણ માટે પાક ૩૦ દિવસ નો થાય ત્યારે કાર્બોન્ડેઝીમ ૦.૦૨૫ ટકા (૧૦ લીટર પાણીમાં ૫ ગ્રામ) અથવા કલોરોથેલોનીલ (૧૦ લીટર પાણીમાં ૨૫ ગ્રામ) દવાનાં ૩ છંટકાવ ૧૨ થી ૧૫ દિવસના અંતરે કારવા. |
| ઉનાળુ તલ | <ul style="list-style-type: none"> ❖ તલમાં મોલોમશી ના નિયંત્રણ માટે ડાઈમીથીયોટ મીલી અથવા મીથાઈલ ઓ ડેમેટોન ૧૦ મીલી અથવા થાયોમીથોકાકામ ૪ ગ્રામ/ ૧૦ લીટર લીટર પાણી લેળવી છંટકાવ કરવો . |
| દાડમ | <ul style="list-style-type: none"> ✓ દાડમ મા રસ ચુસનાર ફુદા ના નિયંત્રણ માટે કરજ તેલ, નેપાળો(રતન જ્યોત) તેલ અથવા લીમ્બોળી નુ તેલ ૪૦ મીલી/ ૧૦ લીટર લીટર પાણી મા ઓગાળી છંટકાવ કરવો . |
| આંબો | <ul style="list-style-type: none"> ❖ આંબામા કાલવ્રણ (એન્થ્રોકનોઝ) રોગના નિયંત્રણ માટે બોર્ડોમિક્ષણ ૦.૮ % ૮૦ ગ્રામ + ૧૦ લીટર પાણીમા લેળવી છંટકાવ કરી આરોગનુ નિયંત્રણ થાય છે. |

દક્ષિણ
આબોહવાક્ય
વિસ્તાર ખેત

| | | |
|--|---------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ❖ આંબામા રૂંખ ઈયળનો વધુ પડતો ઉદ્ગવ હોય તો તેના નિયંત્રણ માટે મોનોકોટોફોસ ૩૬ એસ. એલ. ૧૦ મીલી અથવા કાર્બોરીલ ૫૦ % વે.પા. ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણી મા ભેળવી દરેક કાણામાં પ્લટગ કરવુ. |
| | પશુપાલન | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ઇતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ દવા ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ પશુઓને ઠડી થી રક્ષણ આપવા સુકાચારા નુ પ્રમાણ વધારવુ અને તેઓને શેડ મા રાખવા |

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:28-03-2014

(Period 29 March to 2 April -2014)

Significant weather for the preceding week

| | |
|--------------------------|-----------|
| Rain fall (mm) | 00.0 |
| Maximum temperature °C | 35.6-36.8 |
| Minimum temperature °C | 17.5-22.6 |
| RH % (Morning/Afternoon) | 74-22 |
| Wind speed (Kmph) | 5.4-6.1 |
| Cloud cover | 0-4 |

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 02-04-2014

| Parameters | Day-1 29-03-14 | Day-2 30-03-14 | Day-3 31-03-14 | Day-4 01-04-14 | Day-5 02-04-14 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rain fall (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum temperature °C | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Minimum temperature °C | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Cloud cover (Okta) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RH % (Morning/After noon) | 65-50 | 69-53 | 67-68 | 68-50 | 78-55 |
| Wind speed (Kmph) | 020 | 022 | 023 | 021 | 018 |
| Wind direction(Deg) | 330 | 330 | 320 | 320 | 310 |

Agro meteorological Advisories

| Crop | Stage | Agromet Advisories |
|-------------------|------------|---|
| Garlic | Harvesting | <ul style="list-style-type: none"> ▪ The crop becomes harvest when the tops turn yellowish or brownish and show sign of drying. After harvesting, bulbs are dried. Bulbs should be stored in cool dry place having proper aeration. |
| Onion | Harvesting | <ul style="list-style-type: none"> ▪ The crop becomes ready for harvest when the tops turn yellowish and drying. After harvesting, bulbs are dried and stored in cool dry place having proper aeration. |
| Summer Peanut | Vegetative | <ul style="list-style-type: none"> • For the control of early leaf spot disease, Three Spray of Carbendenzim 0.025 % (5 gram/10lit. water) or Clorothelonil (25 gram/ 10 lit of water) at 12 to 15 days interval. |
| Summer Green gram | Vegetative | <ul style="list-style-type: none"> ▪ For the Control of Leaf eating caterpillar , spray Diamethoate 10 ml or Monocrotophos 10 ml in 10 lit. of water. |
| Summer Sesame | Vegetative | <ul style="list-style-type: none"> ▪ For the control of Aphid, Spray Diamethoate 10 ml or Metyl-o-Demeton 10 ml, Thiomethoxam 4 gm/10 liter of water. |
| Ladies Finger | Fruiting | <ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of Shoot and fruit borer, spray neem seed extract 500ml or neem seed oil 50 ml/10 liter of water at 15 days interval (total 4 spray). Or DDVP 5ml or Indoxacarb 2 ml or Spinosad 2 gm/ 10 liter of water. |
| Chili | Fruiting | <ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of wilting disease, drenching of <i>Trichoderma viride</i> @40 gm/10 liter of water |
| Brinjal & | Fruiting | <ul style="list-style-type: none"> ❖ For control of white fly, spray Dimethoate 0.03 % or Trozophos 0.04 % or Methyl-O-Demeton 0.025% or Aciphate 0.1% (10 |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Tomato | | ml/10lit water). |
| Pomegranate | Fruiting | <ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of fruit sucking moth, spray neem oil 40ml/10 lit. of water. |
| Mango | Fruting | <ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of Anthrecnose, spray Bordex mixture 0.8 % 88 gram in 10 liter Water. ❖ For the control of caterpillar, spray injecting emulsion of Monocrotophos 36 SL 10 ml or carbaryl 50 % WP 40 grm in 10 liter of water in each hole and plugging them with mud can control the pest. |
| Live stocks | - | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of tick, spray Deltamathrin or Amitaz 20 ml/10 liter of water. ➤ Increase the quantity of dry fodder. ➤ Keep animal in shed to protect against cold. |

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date : 29-03-2014

(Period 29 March to 2 April -2014)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 02-04-2014

| Parameters | Day-1 29-03-14 | Day-2 30-03-14 | Day-3 31-03-14 | Day-4 01-04-14 | Day-5 02-04-14 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rain fall (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum temperature °C | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| Minimum temperature °C | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| Cloud cover (Okta) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RH % (Morning/After noon) | 68-44 | 68-49 | 71-42 | 70-43 | 82-51 |
| Wind speed (Kmph) | 019 | 021 | 022 | 020 | 016 |
| Wind direction(Deg) | 330 | 330 | 320 | 320 | 310 |

Agro meteorological Advisories

| Crop | Stage | Agromet Advisories |
|-----------------------------|------------|---|
| Garlic | Harvesting | ▪ The crop becomes harvest when the tops turn yellowish or brownish and show sign of drying. After harvesting, bulbs are dried. Bulbs should be stored in cool dry place having proper aeration. |
| Onion | Harvesting | ▪ The crop becomes ready for harvest when the tops turn yellowish and drying. After harvesting, bulbs are dried and stored in cool dry place having proper aeration. |
| Summer Peanut | Vegetative | • For the control of early leaf spot disease, Three Spray of Carbendenzim 0.025 % (5 gram/10lit. water) or Clorothelonil (25 gram/ 10 lit of water) at 12 to 15 days interval. |
| Summer Green gram | Vegetative | ▪ For the Control of Leaf eating caterpillar , spray Diamethoate 10 ml or Monocrotophos 10 ml in 10 lit. of water. |
| Summer Sesame | Vegetative | ▪ For the control of Aphid, Spray Diamethoate 10 ml or Metyl-o-Demeton 10 ml, Thiomethoxam 4 gm/10 liter of water. |
| Ladies Finger | Fruiting | ❖ For the control of Shoot and fruit borer, spray neem seed extract 500ml or neem seed oil 50 ml/10 liter of water at 15 days interval (total 4 spray). Or DDVP 5ml or Indoxacarb 2 ml or Spinosad 2 gm/ 10 liter of water. |
| Chili | Fruiting | ❖ For the control of wilting disease, drenching of <i>Trichoderma viride</i> @40 gm/10 liter of water |
| Brinjal & Tomato | Fruiting | ❖ For control of white fly, spray Dimethoate 0.03 % or Trozophos 0.04 % or Methyl-O-Demeton 0.025% or Aciphate 0.1% (10 ml/10lit water). |
| Pomegranate | Fruiting | ❖ For the control of fruit sucking moth, spray neem oil 40ml/10 lit. of water. |
| Mango | Fruting | ❖ For the control of Anthracnose, spray Bordex mixture 0.8 % 88 gram in 10 liter Water. ❖ For the control of caterpillar, spray injecting emulsion of Monocrotophos 36 SL 10 ml or carbaryl 50 % WP 40 grm in 10 |

| | | |
|--------------------|---|--|
| | | liter of water in each hole and plugging them with mud can control the pest. |
| Live stocks | - | <ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of tick, spray Deltamathrin or Amitaz 20 ml/10 liter of water. ➤ Increase the quantity of dry fodder. ➤ Keep animal in shed to protect against cold. |