



હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
તા. ૨૩-૧૧-૨૦૧૩ થી તા. ૨૭-૧૧-૨૦૧૩



(સંકલીત કૃષિ મૌસમ સલાહ સેવા, સૂકી ખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરઘડીયા અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં : ૬૭/૨૦૧૩

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરિબલો	ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર
	રાજકોટ
વરસાદ (મી.મી)	0.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	31.7-33.3
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	14.8-15.3
ભેજ (%) સવાર	56-78
બપોરબાદ	33-35
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	8-13

હવામાન આગાહી:

૧. રાજકોટ જીલ્લો

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૨૩-૧૧-૧૩	૨૪-૧૧-૧૩	૨૫-૧૧-૧૩	૨૬-૧૧-૧૩	૨૭-૧૧-૧૩
વરસાદ (મી.મી)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	33	33	32	32	32
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	16	17	16	16	17
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	0	0	1	0	0
મહત્તમ ભેજ (%) સવાર	58	59	58	57	61
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	35	32	40	40	30
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	11	9	8	11	12
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	34	27	27	23	35

૨. જામનગર જીલ્લો

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૨૩-૧૧-૧૩	૨૪-૧૧-૧૩	૨૫-૧૧-૧૩	૨૬-૧૧-૧૩	૨૭-૧૧-૧૩
વરસાદ (મી.મી)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	૩૦	૩૦	૩૧	૩૦	૩૦
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	૧૮	૧૮	૧૯	૧૭	૧૭
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્તમ ભેજ (%) સવાર	૬૧	૬૦	૫૯	૬૨	૬૧
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૩૭	૩૭	૩૬	૩૬	૩૯
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૧	૧૧	૯	૧૩	૧૬
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૭	૨૩	૨૭	૩૫	૩૬

૩. અમરેલી જીલ્લો

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૨૩-૧૧-૧૩	૨૪-૧૧-૧૩	૨૫-૧૧-૧૩	૨૬-૧૧-૧૩	૨૭-૧૧-૧૩
વરસાદ (મી.મી)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	૩૦	૩૦	૩૧	૩૧	૩૦
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	૧૮	૧૮	૧૭	૧૭	૧૭
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૦	૦	૧	૦	૦
મહત્તમ ભેજ (%) સવાર	૬૧	૬૩	૬૧	૫૯	૬૨
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૩૫	૩૭	૩૪	૩૩	૩૪
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૨	૯	૧૦	૧૨	૧૨
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૭	૨૫	૩૨	૩૨	૩૬

૪. સુરેન્દ્રનગર જીલ્લો





તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૨૩-૧૧-૧૩	૨૪-૧૧-૧૩	૨૫-૧૧-૧૩	૨૬-૧૧-૧૩	૨૭-૧૧-૧૩
વરસાદ (મી.મી)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	૩૨	૩૩	૩૩	૩૨	૩૨
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	૧૬	૧૭	૧૭	૧૬	૧૫
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટા)	૦	૦	૧	૦	૦
મહત્તમ ભેજ (%) સવાર	૬૨	૫૮	૫૮	૬૦	૬૦
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૩૭	૩૯	૩૦	૩૦	૩૨
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૪	૯	૧૦	૧૨	૧૨
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૫	૨૩	૨૭	૩૫	૩૬

પત્રક-ક
ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
હવામાન આગાહી
(તા. ૨૩-૧૧-૨૦૧૩ થી તા. ૨૭-૧૧-૨૦૧૩)

કૃષિ સલાહ :

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૨૩-૧૧-૧૩	૨૪-૧૧-૧૩	૨૫-૧૧-૧૩	૨૬-૧૧-૧૩	૨૭-૧૧-૧૩
વરસાદ (મી.મી)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	૩૩	૩૩	૩૨	૩૨	૩૨
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	૧૬	૧૭	૧૬	૧૬	૧૭
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૦	૦	૧	૦	૦
મહત્તમ ભેજ (%) સવાર	૫૮	૫૯	૫૮	૫૭	૬૧
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૩૫	૩૨	૪૦	૪૦	૩૦
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૧	૯	૮	૧૧	૧૨
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૩૪	૨૭	૨૭	૨૩	૩૫

સામાન્ય	<p>▶ ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના કૃષિ હવામાન વિભાગ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરઘડીયા તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના રાજકોટ જીલ્લામાં આગામી તા. ૨૩-૧૧-૨૦૧૩ થી તા. ૨૭-૧૧-૨૦૧૩ દરમિયાન આકાશ સ્વરૂપ રહેશે અને પવનની દિશા ઉત્તરની રહેવાની સંભાવના છે. પવનની ઝડપ ૮ થી ૧૦ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૩૨ થી ૩૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રિ દરમિયાન ૧૬ થી ૧૭ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.</p> <p>▶ ઘઉં, ચણા, જીરૂ અને ઘાણાનું પસંદગી મુજબ વાવેતર સમયસર પુરુ કરવું.</p>		
મુખ્ય પાક	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિ સલાહ (૧૦ હેક્ટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી)
ઘઉં	વાવેતર	લોક-૧, GW-496	પાયામાં ૧૩૦ કિ.ગ્રા. ડીએપી, ૮૦ કિ.ગ્રા. યુરીયા અને ૨૫ કિ.ગ્રા. ઝીંક સલ્ફેટ પ્રતિ હેક્ટર મુજબ આપી વાવણી કરવી.
ચણા	વાવેતર	ગુજરાત ચણા-૨ બીનપિયત માટે અને ગુજરાત ચણા-૩	પાયામાં ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ પ્રતિ હેક્ટર મુજબ આપી ચણાની વાવણી કરવી. વાવતી વખતે ચણાના બીજને ૨૫૦ ગ્રામ રાઈઝોબીયમ કલ્ચરનો પ્રતિ ૧૦ કિ.ગ્રા. બીજ મુજબ પટ આપવો.
જીરૂ	વાવેતર	ગુજરાત જીરૂ-૪	પાયામાં ૩૩ કિ.ગ્રા. ડીએપી પ્રતિ હેક્ટર મુજબ આપી વાવણી કરવી. તેમજ જીરૂના બીયારણને ૨ ગ્રામ થાયરમ પ્રતિ કિ.ગ્રા. મુજબ પટ આપવો.

ધાણા	વાવેતર	ગુજરાત ધાણા-૨	પાયામાં ૪૩ કિ.ગ્રા. ડીએપી પ્રતિ હેક્ટર મુજબ આપી વાવણી કરવી.
કપાસ	જીડવા ખુલવા	 લીલી પોપટી, શ્રીપ્સ, મોલો ખાતર અને પિયત →	નિયંત્રણ માટે ઈમીડાકલોપ્રીડ ૩૦.૫ એસસી ૫ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છાંટવી. કપાસના પાકમાં ઝડપી રીકવરી માટે સૂક્ષ્મ તત્વોયુક્ત NPK (૧૯-૧૯-૧૯) ૭૫ ગ્રામ ૧૦ લી પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
ડુંગળી	વિકાસ	પાનનીટોચનોસુકારો /જાંબલી ધાબાનો રોગ  શ્રીપ્સ	આ રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અને હેકઝાકોનાઝોલ ૧૫ મીલી દવાના ૧૦ લી પાણીમાં મિશ્ર કરી વારાફરતી બે છંટકાવ ૧૦ દિવસના અંતરે કરવા. તેના નિયંત્રણ માટે સ્પીનોસેડ ૩ મીલી ૧૦ લી પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
રીંગણી અને ટમેટી	ફુલ/ફળ	ડૂંબ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ સફેદમાખી તડતડીયા 	ડૂંબ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે નુકશાન થયેલ ડૂંબ અને ફળોને તોડીને દર અઠવાડિએ નિયમિત અવશ્ય જમીનમાં દાટી દેવા અને લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસેડ ૪૮ ઈસી અથવા રીનાક્ષીપીયર ૩ મીલી ૧૦ લી પાણીમાં મિશ્ર કરી દવા છાંટવી.
મરચી	ફુલ/ફળ	શ્રીપ્સ  સુકારો	સ્પીનોસેડ ૪૮ ટકા ૩ મીલી અથવા એબામેક્ટીન ૧૦ મી.લી. દવા વારા ફરતી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ૧૦ દિવસના અંતરે છાંટવી. ૪૦ ગ્રામ ટ્રાયકોડર્મા ફુગનો પાવડર ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી જમીનમાં થડની ફરતે મુળ વિસ્તારમાં નિતારવો.
વેલાવાળા શાકભાજી	ફુલ/ફળ	તળછારો -	મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા કલોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ દિવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવા.
પશુ/મરઘા	પશુઓમાં ખરવા મોવાસાના રોગના નિયંત્રણ માટે રસીકરણ કરવું. તેમજ ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મી.લી. એક લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. જાનવરોની રહેઠાણની જગ્યાની વ્યવસ્થિત સફાઈ તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફિનાઈલ છાંટવું.		

જા.નં. જુકૃયુ/ સંવે(સુખે)/એગ્રોમેટ/ભુલેટીન/૩૯૧૮ /૨૦૧૩
તરઘડીયા(રાજકોટ). તારીખ: ૨૨-૧૧-૨૦૧૩

પ્રતિ,

તંત્રીશ્રી/ ડાયરેક્ટરશ્રી,

રાજકોટ.

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં, રેડિયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ધ કરવા નમ્ર વિનંતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (સૂકી ખેતી)

જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી,

તરઘડીયા



**Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
Targhadia (Rajkot) - 360 003
Phone: (0281)2784260(O), 2331686(R)
Fax : (0281)2784722, Cell :94277 28523**



Agro met Advisory Service bulletin no.-67 for the Rajkot district
(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department)
(Period 23rd To 27th November- 2013)

Significant past weather for the preceding week of Rajkot


Rainfall (mm)	0.0
Maximum temperature (°C)	31.7-33.3
Minimum temperature (°C)	14.8-15.3
Relative Humidity (%) I	56-78
Relative Humidity (%) II	33-35
Wind speed (Kmph)	8-13





Weather forecast until 08-30 hrs of 27/11/2013

(1) RAJKOT DISTRICT:

	23/ 11/13	24/ 11/13	25/ 11/13	26/ 11/13	27/ 11/13
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	33	33	32	32	32
Min.Temp.(°C)	16	17	16	16	17
Total CC (octa)	0	0	1	0	0
RH-I (%)	58	59	58	57	61
RH-II (%)	35	32	40	40	30
Wind Speed (kmph)	11	9	8	11	12
Wind Direction(deg.)	34	27	27	23	35

Agro meteorological Advisories:

General Advice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incoming next FIVE days sky will remain mostly clear and weather will remain dry and mild cold. Maximum temperature will raise up to 32 ° c in day time. ➤ Farmers are advised to complete sowing of wheat, cumin and coriander without any delay. 		
Crops	Stage	Insect/Pest/Variety	Advisory
Wheat	Sowing 	Lok-1, GW-496	Do sowing of wheat in time.
Cumin	Sowing	Gujarat cumin-4 ,Gujarat cumin-2	Carry out sowing of cumin, If kharif crop is harvested.
Coriander	Sowing	Gujarat Coriander-1 , Gujarat Coriander-2	Carry out sowing of coriander, If kharif crop is harvested.

Cotton	Regenerate the crop after damage due to heavy rain durin September-Cotober	Jassid/Thrips/Aphid → 	acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water Apply urea 100 kg/ha
Castor	Vegetative & reproductive	Jassid, Whitefly →	Spray Thiomethoxam 25 % WG @ 4 g / 10 lit of water
Vegetables	Growing/fruiting	Sucking pest Fruit borer 	To control them spray acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water and hexaconazole 5% SC @ 10 ml/10 lit of water. In brinjal, cauliflower, cabbage, tomato etc spraying of Spinosad 3.0 ml/10 litre of water is advised against fruit borer, diamond back moth in cloud free days. Spray NPK (19-19-19) and micronutrient 50 g/10 lit of water for quick regrowth.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips, →  Wilting →	Spray 3 ml spinosad in 10 litres of water. Drenching of Trichoderma viridi 4 gm in 1 liter of water.
Runner vegetable	Flowering/ fruiting	Downy mildew	Alternate three spray of Mancozeb 27 g or chlorothalonil 27 g or fosatyl 20 g/10 lit of water at 15 days interval.
Livestock & poultry 	Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick and for prevention of foot & mouth disease in animals do vaccination with FMD vaccine. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.		

IAAS Unit, DFRS, JAU, Targhadia



**Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
Targhadia (Rajkot) - 360 003
Phone: (0281)2784260(O), 2331686(R)
Fax : (0281)2784722, Cell :94277 28523**



Agro met Advisory Service bulletin for the Jamnagar district

(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department)

(Period 23rd To 27th November - 2013)




Weather forecast until 08-30 hrs of 27/11/2013




(2) JAMNAGAR DISTRICT:

	23/ 11/13	24/ 11/13	25/ 11/13	26/ 11/13	27/ 11/13
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	30	30	31	30	30
Min.Temp.(°C)	18	18	19	17	17
Total CC (octa)	0	0	0	0	0
RH-I (%)	61	60	59	62	61
RH-II (%)	37	37	36	36	39
Wind Speed (kmph)	11	11	9	13	16
Wind Direction(deg.)	27	23	27	35	36

Agro meteorological Advisories:-

IAAS Unit, DFRS, JAU, Targhadia

General Advice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incoming next FIVE days sky will remain mostly clear and weather will remain dry and mild cold. Maximum temperature will raise up to 31 °c in day time. ➤ Farmers are advised to complete sowing of wheat, cumin and coriander without any delay. 		
Crops	Stage	Insect/Pest/Variety	Advisory
Wheat	Sowing 	Lok-1, GW-496	Do sowing of wheat in time.
Cumin	Sowing	Gujarat cumin-4 ,Gujarat cumin-2	Carry out sowing of cumin, If kharif crop is harvested.
Coriander	Sowing	Gujarat Coriander-1 , Gujarat Coriander-2	Carry out sowing of coriander, If kharif crop is harvested.
Cotton	Regenerate the crop after damage due to heavy rain durin September-Cotober	Jassid/Thrips/Aphid →  	acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water Apply urea 100 kg/ha

Castor	Vegetative & reproductive	Jassid, Whitefly →	Spray Thiomethoxam 25 % WG @ 4 g / 10 lit of water
Vegetables	Growing/fruiting	Sucking pest Fruit borer 	To control them spray acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water and hexaconazole 5% SC @ 10 ml/10 lit of water. In brinjal, cauliflower, cabbage, tomato etc spraying of Spinosad 3.0 ml/10 litre of water is advised against fruit borer, diamond back moth in cloud free days. Spray NPK (19-19-19) and micronutrient 50 g/10 lit of water for quick regrowth.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips, →  Wilting →	Spray 3 ml spinosad in 10 litres of water. Drenching of Trichoderma viridi 4 gm in 1 liter of water.
Runner vegetable	Flowering/ fruiting	Downy mildew	Alternate three spray of Mancozeb 27 g or chlorothalonil 27 g or fosatyl 20 g/10 lit of water at 15 days interval.
Livestock & poultry 	Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick and for prevention of foot & mouth disease in animals do vaccination with FMD vaccine. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.		



**Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
Targhadia (Rajkot) - 360 003
Phone: (0281)2784260(O), 2331686(R)
Fax : (0281)2784722, Cell :94277 28523**



Agro met Advisory Service bulletin for the Amreli district

(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department)




(Period 23rd To 27th November - 2013)




Weather forecast until 08-30 hrs of 27/11/2013

(3) AMRELI DISTRICT:

	23/ 11/13	24/ 11/13	25/ 11/13	26/ 11/13	27/ 11/13
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	30	30	31	31	30
Min.Temp.(°C)	18	18	17	17	17
Total CC (octa)	0	0	1	0	0
RH-I (%)	61	63	61	59	62
RH-II (%)	35	37	34	33	34
Wind Speed (kmph)	12	9	10	12	12
Wind Direction(deg.)	27	25	32	32	36

Agro meteorological Advisories

General Advice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incoming next FIVE days sky will remain mostly clear and weather will remain dry and mild cold. Maximum temperature will raise up to 31 °c in day time. ➤ Farmers are advised to complete sowing of wheat, cumin and coriander without any delay. 		
Crops	Stage	Insect/Pest/Variety	Advisory
Wheat	Sowing 	Lok-1, GW-496	Do sowing of wheat in time.
Cumin	Sowing	Gujarat cumin-4 ,Gujarat cumin-2	Carry out sowing of cumin, If kharif crop is harvested.
Coriander	Sowing	Gujarat Coriander-1 , Gujarat Coriander-2	Carry out sowing of coriander, If kharif crop is harvested.
Cotton	Regenerate the crop after damage due to heavy rain durin September-Cotober	Jassid/Thrips/Aphid →  	acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water Apply urea 100 kg/ha
Castor	Vegetative & reproductive	Jassid, Whitefly →	Spray Thiomethoxam 25 % WG @ 4 g / 10 lit of water

Vegetables	Growing/fruiting	Sucking pest Fruit borer 	To control them spray acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water and hexaconazole 5% SC @ 10 ml/10 lit of water. In brinjal, cauliflower, cabbage, tomato etc spraying of Spinosad 3.0 ml/10 litre of water is advised against fruit borer, diamond back moth in cloud free days. Spray NPK (19-19-19) and micronutrient 50 g/10 lit of water for quick regrowth.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips, →  Wilting →	Spray 3 ml spinosad in 10 litres of water. Drenching of Trichoderma viridi 4 gm in 1 liter of water.
Runner vegetable	Flowering/ fruiting	Downy mildew	Alternate three spray of Mancozeb 27 g or chlorothalonil 27 g or fosatyl 20 g/10 lit of water at 15 days interval.
Livestock & poultry 	Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick and for prevention of foot & mouth disease in animals do vaccination with FMD vaccine. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.		

IAAS Unit, DFRS, JAU, Targhadia



Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
Targhadia (Rajkot) - 360 003
Phone: (0281)2784260(O), 2331686(R)
Fax : (0281)2784722, Cell :94277 28523



Agro met Advisory Service bulletin for the Surendranagar district

(Issued jointly by DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) and India Meteorological Department)




(Period 23rd To 27th November - 2013)




Weather forecast until 08-30 hrs of 27/11/2013

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	23/ 11/13	24/ 11/13	25/ 11/13	26/ 11/13	27/ 11/13
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	32	33	33	32	32
Min.Temp.(°C)	16	17	17	16	15
Total CC (octa)	0	0	1	0	0
RH-I (%)	62	58	58	60	60
RH-II (%)	37	39	30	30	32
Wind Speed (kmph)	14	9	10	12	12
Wind Direction(deg.)	25	23	27	35	36

Agro meteorological Advisories:

General Advice	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incoming next FIVE days sky will remain mostly clear and weather will remain dry and mild cold. Maximum temperature will raise up to 32 °c in day time. ➤ Farmers are advised to complete sowing of wheat, cumin and coriander without any delay. 		
Crops	Stage	Insect/Pest/Variety	Advisory
Wheat	Sowing 	Lok-1, GW-496	Do sowing of wheat in time.
Cumin	Sowing	Gujarat cumin-4 ,Gujarat cumin-2	Carry out sowing of cumin, If kharif crop is harvested.
Coriander	Sowing	Gujarat Coriander-1 , Gujarat Coriander-2	Carry out sowing of coriander, If kharif crop is harvested.
Cotton	Regenerate the crop after damage due to heavy rain durin September-Cotober	Jassid/Thrips/Aphid →  	acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water Apply urea 100 kg/ha
Castor	Vegetative & reproductive	Jassid, Whitefly →	Spray Thiomethoxam 25 % WG @ 4 g / 10 lit of water

Vegetables	Growing/fruiting	Sucking pest Fruit borer 	To control them spray acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water and hexaconazole 5% SC @ 10 ml/10 lit of water. In brinjal, cauliflower, cabbage, tomato etc spraying of Spinosad 3.0 ml/10 litre of water is advised against fruit borer, diamond back moth in cloud free days. Spray NPK (19-19-19) and micronutrient 50 g/10 lit of water for quick regrowth.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips, →  Wilting →	Spray 3 ml spinosad in 10 litres of water. Drenching of Trichoderma viridi 4 gm in 1 liter of water.
Runner vegetable	Flowering/ fruiting	Downy mildew	Alternate three spray of Mancozeb 27 g or chlorothalonil 27 g or fosatyl 20 g/10 lit of water at 15 days interval.
Livestock & poultry 	Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick and for prevention of foot & mouth disease in animals do vaccination with FMD vaccine. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.		

IAAS Unit, DFRS, JAU, Targhadia