

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
તા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૫ થી તા. ૦૫-૦૮-૨૦૧૫

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૫

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	035.4
મહત્વમાન (સે.ગે.)	27.7
લઘુત્વમાન (સે.ગ્રે.)	24.8
ભોજ(%) (સવાર/ખપોરખાદ)	94-89
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	10.0

પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૦૫-૦૮-૧૫ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૦૧.૦૮.૧૫	૦	૦
	૦૨.૦૮.૧૫	૦	૦
	૦૩.૦૮.૧૫	૦	૦
	૦૪.૦૮.૧૫	૦	૦
	૦૫.૦૮.૧૫	૦	૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૧.૦૮.૧૫	૩૧	૩૧
	૦૨.૦૮.૧૫	૩૧	૩૧
	૦૩.૦૮.૧૫	૩૧	૩૧
	૦૪.૦૮.૧૫	૩૧	૩૧
લઘુત્વમાન (સે.ગ્રે.)	૦૧.૦૮.૧૫	૨૬	૨૬
	૦૨.૦૮.૧૫	૨૬	૨૬
	૦૩.૦૮.૧૫	૨૭	૨૭
	૦૪.૦૮.૧૫	૨૭	૨૭
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટોબર)	૦૧.૦૮.૧૫	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૦૨.૦૮.૧૫	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૦૩.૦૮.૧૫	મોટાભાગે વાદળછાયુ	મોટાભાગે વાદળછાયુ
	૦૪.૦૮.૧૫	મોટાભાગે વાદળછાયુ	મોટાભાગે વાદળછાયુ
મહત્વમાન લેજ (%)	૦૧.૦૮.૧૫	૮૪	૮૫
	૦૨.૦૮.૧૫	૮૪	૮૫
	૦૩.૦૮.૧૫	૮૫	૮૫
	૦૪.૦૮.૧૫	૮૫	૮૫
લઘુત્વમાન લેજ (%)	૦૧.૦૮.૧૫	૮૧	૮૨
	૦૨.૦૮.૧૫	૮૦	૮૧
	૦૩.૦૮.૧૫	૮૦	૮૦
	૦૪.૦૮.૧૫	૮૦	૮૧
	૦૫.૦૮.૧૫	૮૧	૮૧
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૦૧.૦૮.૧૫	૦૩૬	૦૩૩
	૦૨.૦૮.૧૫	૦૩૬	૦૩૩
	૦૩.૦૮.૧૫	૦૩૦	૦૨૮
	૦૪.૦૮.૧૫	૦૩૦	૦૨૮
	૦૫.૦૮.૧૫	૦૩૪	૦૩૧
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૦૧.૦૮.૧૫	૨૪૯	૨૪૮
	૦૨.૦૮.૧૫	૨૫૦	૨૫૧
	૦૩.૦૮.૧૫	૨૪૯	૨૪૭
	૦૪.૦૮.૧૫	૨૫૭	૨૫૭
	૦૫.૦૮.૧૫	૨૫૫	૨૫૬

દક્ષિણ ખેત આબોહવાક્ય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર ફૂષિ સલાહ)

પાકનું નામ	ફૂષિ સલાહ
મગફળી	<ul style="list-style-type: none"> ❖ અગામી પાચ દિવસ દરમ્યાન વરસાદ પડવાની નહિવત આગાહી હોય વરાપ થયે રાસાયણીક દવાનો છંટકાવ ભલામણ મુજબ કરવો. ❖ દ્રાયકોર્ડર્મા વીરીડી (કુગા) યુક્ત પાવડર વાબ્યા પછી ૩૦ દિવસે ૨.૫ કિલો હેકટરે પાણી સાથે ઓગાળી આપવો અથવા ૨.૫ કિલો પાવડર ખોળ અથવા છાણીયા ખાતર સાથે મીક્ષ કરી ચાસમાં આપવો. ❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી. ❖ ખેતર માથી વધારાના વરસાદ ના પાણીનો નિકાલ કરવો.
કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી. ❖ કપાસમાં ગુલાબી ઈયળના નિયત્રણ માટે ૫૦ ઈ.સી. પ્રોફેનોઝોસ ૧૦ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમા દવાનુ પ્રમાણ રાખી મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો તથા ગુલાબી ઈયળના નર કુદાઓને આકર્ષવા ફેરોમોન ટ્રેપ્સ હેકટરે ૧૦ ની સંખ્યામા ગોઠવવા.
તુવેર	<ul style="list-style-type: none"> ❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી.
સોયાબીન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી.
રીંગણા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ચુસીયા પ્રકારની જાવાતના નિયત્રણ માટે લીબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનુ મીજનુ ૫ ટકા અર્કનુ દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો
ભાડો	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકમાં ચુસીયા ના નિયત્રણ માટે એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અને લીબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનુ મીજનુ ૫ ટકા અર્કનુ દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો દ્રાયઝોઝોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો
પશુ પાલન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. ❖ પશુમા કુટ અને માઉથ રોગના આવે તે માટે જરૂરી રશીકરણ કરાવવુ. ❖ પશુઓને વરસાદના સમયે ખુલ્લામા, ઝાડ નીચેકે ઈલેક્ટ્રીક પોલ પાસે ન રાખતા શેડમાં બાંધવાની વ્યવસ્થા કરવી.

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 31-07-2015

(Period from 01 to 05 August -2015)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	035.4
Maximum temperature °C	26.6-29.2
Minimum temperature °C	24.6-25.4
RH % (Morning/Afternoon)	94-89
Wind speed (Kmph)	6.3-12.7
Cloud cover	8

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 05-08-2015

Parameters	Day-1 01-08-15	Day-2 02-08-15	Day-3 03-08-15	Day-4 04-08-15	Day-5 05-08-15
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	31	31	31	31	31
Minimum temperature °C	26	26	27	27	27
Cloud cover (Okta)	8	8	7	7	8
RH % (Morning/After noon)	84-81	84-80	85-80	84-80	85-81
Wind speed (Kmph)	036	036	030	030	034
Wind direction(Deg)	249	250	249	257	255

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
Groundnut	Flowering	GG-20, GG-11	<ul style="list-style-type: none"> ➤ There is no forecasting of rainfall during next five days. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out after vaspa condition. ➤ Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil. ➤ Drain out excess rain water from the field.
Cotton	Growth	Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.
		Pink bollworm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of pink bollworm, spray 50 EC profenophos 10 ml in 10 liter of water and 10 pheromon trap in one ha for the attraction of male moth of pink bollworm.
Soybean	Growth	Gujarat Soybean-1,2,3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.

Pigeon pea	Growth	BDN-2, GTH-1	➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.
Brinjla	Flowering/ fruiting	Thrips and White Fly	➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).
Lady's finger	Flowering/ fruiting	Shoot fruit borer	➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.
Livestock	-	-	➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases. ➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date :31-07-2015

(Period from 01 to 05 August -2015)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 05-08-2015

Parameters	Day-1 01-08-15	Day-2 02-08-15	Day-3 03-08-15	Day-4 04-08-15	Day-5 05-08-15
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	31	31	31	31	31
Minimum temperature °C	26	26	27	27	27
Cloud cover (Okta)	8	8	8	7	8
RH % (Morning/After noon)	85-82	85-81	85-80	85-81	85-81
Wind speed (Kmph)	033	033	028	028	031
Wind direction(Deg)	248	251	247	257	256

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
Groundnut	Flowering	GG-20, GG-11	<ul style="list-style-type: none"> ➤ There is no forecasting of rainfall during next five days. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out after vaspa condition. ➤ Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil. ➤ Drain out excess rain water from the field.
Cotton	Growth	Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.
		Pink bollworm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of pink bollworm, spray 50 EC profenophos 10 ml in 10 liter of water and 10 pheromon trap in one ha for the attraction of male moth of pink bollworm.
Soybean	Growth	Gujarat Soybean-1,2,3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.
Pigeon pea	Growth	BDN-2, GTH-1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.
Brinjla	Flowering/ fruiting	Thrips and White Fly	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).
Lady's finger	Flowering/ fruiting	Shoot and fruit	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed

		borer	<p>oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.
Livestock	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases. ➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.