

**હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૫ થી તા. ૦૬-૧૦-૨૦૧૫**

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૫

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	0.00
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	34.6
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	22.5
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	81-57
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	1.2

પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૦૬-૧૦-૧૫ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૦૨.૧૦.૧૫	૦	૦
	૦૩.૧૦.૧૫	૦	૦
	૦૪.૧૦.૧૫	૦	૦
	૦૫.૧૦.૧૫	૦	૦
	૦૬.૧૦.૧૫	૦	૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૨.૧૦.૧૫	૩૬	૩૬
	૦૩.૧૦.૧૫	૩૫	૩૫
	૦૪.૧૦.૧૫	૩૪	૩૪
	૦૫.૧૦.૧૫	૩૨	૩૨
	૦૬.૧૦.૧૫	૩૨	૩૨
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૨.૧૦.૧૫	૨૪	૨૪
	૦૩.૧૦.૧૫	૨૪	૨૪
	૦૪.૧૦.૧૫	૨૪	૨૪
	૦૫.૧૦.૧૫	૨૪	૨૪
	૦૬.૧૦.૧૫	૨૪	૨૪
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટોબર)	૦૨.૧૦.૧૫	મોટેભાગે ચોખ્મુ	મોટેભાગે ચોખ્મુ
	૦૩.૧૦.૧૫	અશાંત: વાદળછાયુ	અશાંત: વાદળછાયુ
	૦૪.૧૦.૧૫	મોટેભાગે ચોખ્મુ	મોટેભાગે ચોખ્મુ
	૦૫.૧૦.૧૫	મોટેભાગે ચોખ્મુ	ચોખ્મુ
	૦૬.૧૦.૧૫	ચોખ્મુ	ચોખ્મુ
મહત્વમાન લેજ (%)	૦૨.૧૦.૧૫	૬૦	૬૨
	૦૩.૧૦.૧૫	૬૨	૬૨
	૦૪.૧૦.૧૫	૭૫	૭૬
	૦૫.૧૦.૧૫	૭૫	૭૭
	૦૬.૧૦.૧૫	૭૧	૭૧
લઘુત્તમ લેજ (%)	૦૨.૧૦.૧૫	૫૧	૪૮
	૦૩.૧૦.૧૫	૫૦	૪૮
	૦૪.૧૦.૧૫	૫૯	૫૮
	૦૫.૧૦.૧૫	૬૪	૬૫
	૦૬.૧૦.૧૫	૬૧	૬૨
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૦૨.૧૦.૧૫	૦૦૯	૦૦૮
	૦૩.૧૦.૧૫	૦૧૦	૦૦૯
	૦૪.૧૦.૧૫	૦૧૦	૦૦૯
	૦૫.૧૦.૧૫	૦૦૭	૦૦૭
	૦૬.૧૦.૧૫	૦૧૯	૦૧૮
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૦૨.૧૦.૧૫	૫૭	૫૬
	૦૩.૧૦.૧૫	૨૬૩	૨૬૬
	૦૪.૧૦.૧૫	૨૬૮	૨૬૭
	૦૫.૧૦.૧૫	૩૧૮	૩૨૦
	૦૬.૧૦.૧૫	૩૪૯	૩૪૬

દક્ષિણ ખેત આબોહવાક્ય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર ફૂષિ સલાહ)

પાકનું નામ	ફૂષિ સલાહ
	<p>❖ અગામી પાચ દિવસ દરમયાન નહિવત વરસાદ પડવાની આગાહી છે.</p>
મગફળી	<p>❖ મગફળીમા પાન ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે કલોરોપાયરીઝોસ ૨૫ મીલી અથવા ડાયકલોરોવોસ ૫ મીલી પ્રવાહી ૧૦ લીટર પાણીના ભેળવી છંટકાવ કરવો.</p>
કપાસ	<p>❖ પાકમાં ચુસીયા પ્રકારની જાવાત ના નિયંત્રણ માટે મીથાઈલ પેરાથીયોન ૧૦ મીલી અથવા મોનોકોટોઝોસ ૧૫-૨૦ મીલી અને એસીફેટ ૨૫ ગ્રામ અથવા કલોરપાઈરીઝોસ ૨૫ મીલી અથવા પ્રોફેનોઝોસ ૨૦ મીલી દવા અથવા ઈમીડાકલોપ્રાઈડ ૫ મીલી અથવા થાયોમીથોકામ ૩ ગ્રામ સાથે ડિટરજન્ટ પાવડર ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમા મિશ્રણ કરી છંટકાવ કરવાથી સારુ પરિણામ મળે છે.</p> <p>❖ કપાસના પાકમાં સુકારાના નિયંત્રણ માટે ૫૦ ગ્રામ કોપર ઓક્ઝિકલોરાઈડ અથવા બ્લુ કોપર ને ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છોડના થડ પાસે છાંટવાથી સારુ પરિણામ મળે છે.</p>
તુવેર	<p>❖ પાકમાં શિંગો કોરી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૪૫ એસ.એલ સ્પિનોસાડ ૩ મીલી અથવા કલોરાન્ડ્રાનિલીપોલ ૩ મીલી અથવા ફલુબેનીયામાઈડ ૨ મીલી દવા ને ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી બે છંટકાવ કરવા.</p>
સોયાબીન	<p>❖ પાકમા લશકરી ઈયળનો ઉપક્રમ ખુબ જોવા મળે તો તેના નિયંત્રણ માટે સંકલિત જીવાત નિયંત્રણના પગલા લેવા. જેવાકે ઊંડી ખેડ કરવી, ફેરોમેન ટ્રેપ, વર્ટીસેલીયમ લોહાટી કુગા, લિંબોળીનો અર્ક વગેરેનો ઉપયોગ કરવો.</p>
રીંગણા	<p>❖ ચુસીયા પ્રકારની જાવાતના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનુ મીજનુ ૫ ટકા અર્કનુ દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપક્રમ હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો</p>
ભીડો	<p>❖ પાકમાં ચુસીયા ના નિયંત્રણ માટે એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અને લીબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનુ મીજનુ ૫ ટકા અર્કનુ દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપક્રમ હોય તો દ્રાયઓઝોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો</p>
પશુ પાલન	<p>❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો.</p> <p>❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.</p> <p>❖ પશુમા કુટ અને માઉથ રોગના આવે તે માટે જરૂરી રશીકરણ કરાવવું.</p> <p>❖ પશુઓને વરસાદના સમયે ખુલ્લામા, ઝાડ નીચેકે ઈલેક્ટ્રીક પોલ પાસે ન રાખતા</p>

શેડમાં બાંધવાની વ્યવસ્થા કરવી.

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 01-10-2015

(Period from 02 to 06 Oct. -2015)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	0.00
Maximum temperature °C	33.5-36.4
Minimum temperature °C	22.0-23.2
RH % (Morning/Afternoon)	81-57
Wind speed (Kmph)	1.0-1.5
Cloud cover	0-3

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 06-10-2015

Parameters	Day-1 02-10-15	Day-2 03-10-15	Day-3 04-10-15	Day-4 05-10-15	Day-5 06-10-15
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	36	35	34	32	32
Minimum temperature °C	24	24	24	24	24
Cloud cover (Okta)	2	3	1	1	0
RH % (Morning/After noon)	60-51	62-50	75-59	75-64	71-61
Wind speed (Kmph)	009	010	010	007	019
Wind direction(Deg)	57	263	268	318	349

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
<ul style="list-style-type: none"> • There is no forecasting of rainfall during next five days. 			
Groundnut	Harvesting	GG-20, GG-11	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of prodenia, spray cloropyriphos 25 ml OR dichlorvos 50 ml in 10 liter of water.
		Prodenia	
Cotton	Growth/Ball formation	Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of sucking pest, spray methyl parathion 10 ml or monocrotophos 15-20 ml and Acefet 25 gram or clorpyriphos 25 ml or prophenophos 20 ml OR Thiomethoxam 3 gm or imidaclopride 5 ml with 10 gram detergent powder mix in 10 liter of water.
		Sucking pest (Thrips, Aphid and white fly)	
		Wilt	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of wilt, drenching of copper oxychloride and blue copper 60 gm in 15 liter of water at base of the plant.
Soybean	Growth	Gujarat Soybean-1,2,3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apply IPM viz., deep ploughing, feromen trap, <i>Verticillium lacani</i>, neem seed extract

		Prodenia	etc. for the control of Prodenia.
Pigeon pea	Growth	BDN-2, GTH-1	➤ For the control of pod borer, spray spinosad 5 ml OR clorantrinilipol 3 ml OR flubendimide 2 ml in 10 liter of water.
		Pod borer	
Brinjla	Flowering/ fruiting	Thrips and White Fly	➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).
Lady's finger	Flowering/ fruiting	Shoot fruit borer	➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.
Livestock	-	-	➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases. ➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date :01-10-2015

(Period from 02 to 06 Oct. -2015)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 06-10-2015

Parameters	Day-1 02-10-15	Day-2 03-10-15	Day-3 04-10-15	Day-4 05-10-15	Day-5 06-10-15
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	36	35	34	32	32
Minimum temperature °C	24	24	24	24	24
Cloud cover (Okta)	2	3	1	0	0
RH % (Morning/After noon)	62-48	62-48	76-58	77-65	71-62
Wind speed (Kmph)	008	009	009	007	018
Wind direction(Deg)	56	266	267	320	346

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
<ul style="list-style-type: none"> • There is no forecasting of rainfall during next five days. 			
Groundnut	Harvesting	GG-20, GG-11	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of prodenia, spray cloropyriphos 25 ml OR dichlorvos 50 ml in 10 liter of water.
		Prodenia	
Cotton	Growth/Ball formation	Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of sucking pest, spray methyl parathion 10 ml or monocrotophos 15-20 ml and Acefet 25 gram or clorpyriphos 25 ml or prophenophos 20 ml OR Thiomethoxam 3 gm or imidaclopride 5 ml with 10 gram detergent powder mix in 10 liter of water.
		Sucking pest (Thrips, Aphid and white fly)	
		Wilt	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of wilt, drenching of copper oxychloride and blue copper 60 gm in 15 liter of water at base of the plant.
Soybean	Growth	Gujarat Soybean-1,2,3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apply IPM viz., deep ploughing, feromen trap, <i>Verticillium lacani</i>, neem seed extract etc. for the control of Prodenia.
		Prodenia	
Pigeon pea	Growth	BDN-2, GTH-1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of pod borer, spray spinosad 5 ml OR clorantrinilipol 3 ml OR flubendimide 2 ml in 10 liter of water.
		Pod borer	
Brinjla	Flowering/ fruiting	Thrips and White Fly	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval

			(4 spray).
Lady's finger	Flowering/ fruiting	Shoot and fruit borer	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.
Livestock	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases. ➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.