

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાક્રિય વિભાગ  
તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૬ થી તા. ૦૭-૦૮-૨૦૧૬

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૬

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાક્રિય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	058.0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	30.3
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	24.8
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	93-83
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	4.3

## પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૦૭-૦૮-૧૬ સુધી)

ભારત સરકારશીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસૂમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

**૧. જૂનાગઢ:-** જુલ્લામા આગામી તારીખ ૦૩/૦૮/૨૦૧૬ થી ૦૭/૦૮/૨૦૧૬ દરમયાન આકાશ મુખ્યત્વે મોટેભાગે વાદળથાયુ રહેશે, આગામી પાંચ દિવસમાં હળવો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. પવનની ઝડપ ૨૧ થી ૨૮ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૩૦ થી ૩૧ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન ૨૫ થી ૨૭ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

**૨. પોરબંદર:-** જુલ્લામા આગામી તારીખ ૦૩/૦૮/૨૦૧૬ થી ૦૭/૦૮/૨૦૧૬ દરમયાન આકાશ મુખ્યત્વે મોટેભાગે વાદળથાયુ રહેશે, આગામી પાંચ દિવસમાં હળવો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. પવનની ઝડપ ૨૦ થી ૨૭ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૩૦ થી ૩૧ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન ૨૫ થી ૨૬ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

### **જૂનાગઢ**

હવામાન પરીબળો / તારીખ	દિવસ-૧ ૦૩.૦૮.૧૬	દિવસ-૨ ૦૪.૦૮.૧૬	દિવસ-૩ ૦૫.૦૮.૧૬	દિવસ-૪ ૦૬.૦૮.૧૬	દિવસ-૫ ૦૭.૦૮.૧૬
વરસાદ (મી.મી)	0	0	0	2	3
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	31	31	31	30	30
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	27	27	26	26	25
વાદળની સ્થિતિ	અશત: વાદળથાયુ	મોટેભાગે વાદળથાયુ	મોટેભાગે વાદળથાયુ	મોટેભાગે વાદળથાયુ	મોટેભાગે વાદળથાયુ
સવારના ભેજના ટકા	83	83	83	82	82
બપોર બાદ ભેજના ટકા	73	73	76	76	76
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	21	23	26	28	28
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	253	249	249	251	255

### **પોરબંદર**

વરસાદ (મી.મી)	0	0	0	2	3
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	31	31	31	31	31
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	26	26	26	25	25
વાદળની સ્થિતિ	અશત: વાદળથાયુ	મોટેભાગે વાદળથાયુ	મોટેભાગે વાદળથાયુ	મોટેભાગે વાદળથાયુ	મોટેભાગે વાદળથાયુ
સવારના ભેજના ટકા	82	82	84	82	82
બપોર બાદ ભેજના ટકા	74	74	77	77	78
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	20	22	25	26	27
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	251	248	247	250	254

## દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાક્ય વિભાગ

પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/ જાત	કૃષિ સલાહ
મગફળી	કુલ અવસ્થા/પેગીંગ	અર્ધ વેલડી  જીજી-૨૦, જીજી-૨૨, વેલડી જીજી- ૧૧,૧૩, ઉભડી  જીજી-૨, ટીએજી-૨૪, ટીપીજી-૪૧, ટીએજી-૩૭	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ મગફળીના ઘૈણના નિયંત્રણ માટે કલોરોપાયરીફોસ હેક્ટરે ૪ લીટર પીયત સાથે આપવી અથવા પીયતની સગવડ ન હોય તો નોઝલ કાઢી ૧૦ લીટર પાણીમાં ૨૫ મીલી દવા ભેળવી મગફળીના મુળ પાસે પડે અને જમીનમાં ઉતરે તે રીતે રેડવાથી નિયંત્રણ મળે છે.</li> <li>❖ મગફળીના પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણ કરવું અથવા રાસાયણિક નિદામણનાશક ૦.૬ કી.ગ્રા./હે. પેન્ડીમીથેલીન ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી વાવણી બાદ તુરંતજ છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ મગફળીના પાકમાં થ્રીપ્સ અને લીલા તડતડીયાના નિયંત્રણ માટે ૩.૦ મીલી ફોસ્ફામીડોન અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ અથવા ૧૫ મીલી મીથાઇલ-ઓ-ડેમેટોન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ મગફળી પાકને લોહ તત્વની ઉણપના કારણે પાન પીળા દેખાય તો ૧૦૦ ગ્રામ હીરાકશી તથા ૧૦ ગ્રામ લીંબુના ફૂલને ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ મગફળીમાં ગેરુ અને ટીક્કાના નિયંત્રણ માટે કુગનાનાશક દવા મેન્કોઝેબ ૩૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી વાવેતર બાદ ૩૫ દિવસે છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ મગફળીમાં થડનો સડો/સુકારો હોયતો ટ્રાઈકોઝ્રમા પાવડર ૨.૫ કી.ગ્રા./હેક્ટર, ૫૦૦ કી.ગ્રા. એરેંડીના ખોળ અથવા વર્મિકમ્પોસ્ટ સાથે મીક્સ કરી ચાસમાં આપવું.</li> <li>❖ મગફળીમાં ઉગસુક રોગના નિયંત્રણ માટે બીજના ઊડા વાવેતર ટાળવા જોઈએ તેમજ ઊડી ખેડ કરવી અને મગફળી પછી ચણા અને ઘઉંના પાકનું રોટેશન કરવાથી આ રોગના નિયંત્રણ ઘટાડવા માટે ઉપયોગી છે.</li> </ul>
કપાસ	કુલ અવસ્થા	બોલગાર્ડ -૧૧  જીસીએચ-૬, ૮,૧૨, જથ બીટા, સોલાર- ૬૬,૭૬, સરજુ,	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ કપાસનો પાક બે માસનો થાય ત્યારે પુર્તી ખાતરનો હપ્તો હેક્ટરે ૧૬૬.૬ કી.ગ્રા. યુરીયા અથવા ૪૦૦ કી.ગ્રા. અમોનીયમ સલ્ફેટ આપવું.</li> <li>❖ કપાસના પાકમાં થ્રીપ્સ અને લીલા તડતડીયાના નિયંત્રણ માટે ૩.૦ મીલી ફોસ્ફામીડોન અથવા ૧૫ મીલી</li> </ul>

		<b>મલીકા</b>	<p>ડાયમીથોએટ અથવા ૧૫ મીલી મીથાઈલ-ઓ-ડેમેટોન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ કપાસના પાકમાં આંતરખેડ અને નિદામણની કીયા કરવી અથવા રાસાયણિક નિદામણનાશક ૦.૬ કી.ગ્રા./હે. ફલુક્લોરેલીન અથવા પેન્ડીમીથેલીન ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી વાવણી બાદ તુરંતજ છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ કપાસમાં ગુલાબી ઈયળના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા ટ્રાઇઝોક્લોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો તથા એતરમાં ફેરોમેન ટ્રેપ ગોઠવી નર ફુદાઓનો નાશ કરવો. પાકની છેલ્લી વીણી બાદ પાકમાં ઘેટા, બકરા કે ગાયો ઘણું ચરાવી દેવા. અથવા ૧૦૦ ગ્રામ બીવેરીયા પાવડર અને ૨૦ મીલી પ્રોફેનોક્લોસ ને ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો</li> </ul>
<b>તલ</b>	<b>કુલ અવસ્થા</b>	ગુ.તલ- ૧,૨,૩,૧૦	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકામાં કથીરીના નિયંત્રણ માટે ડાયકોક્લોલ ૨૦ મીલી અથવા દ્રાવ્ય ગંધક ૧૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો જરૂર જણાયતો બીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસ બાદ કરવો.</li> </ul>
<b>તુવેર</b>	<b>વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ</b>	બીડીએન-૨, વૈશાલી, જુટીએચ-૧,૨	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ મગફળિમાં રીલે પાક તરીકે તુવેર વાવવાથી વધુ ઉત્પાદન મળે છે.</li> <li>❖ તુવેરમા સ્ટરીલીટી મોઝેક (વંધ્યત્વનો રોગ, કથીરી)ના નિયંત્રણ માટે ડાયકોક્લોલ ૧૫ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી ૩૫, ૬૫, અને ૮૫ દિવસે છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
<b>સોયાબીન</b>	<b>કુલ અવસ્થા</b>	ગુ.સોયા.-૧,૨,૩	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ સોયાબીનનું વાવેતર કર્યા બાદ ૩૦ દિવસે રીલે આંતરપાક તરીકે બે હાર પછી એક હાર એરેંડાનું વાવેતર કરવું જેથી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.</li> <li>❖ પાકમાં લશકરી ઈયળનો ઉપક્રમ ખુબ જોવા મળે તો તેના નિયંત્રણ માટે સંકલીત જીવાત નિયંત્રણના પગલા લેવા જેવા કે ફેરોમેન ટ્રેપ, વર્ટીસીલીયમ લોહાટી કુગા વગેરેનો ઉપયોગ કરવો અથવા ૨૫ મીલી ક્લોરોપાયરીક્લોસ અથવા ૧૦ મીલી મીથોમાઈલ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
<b>એરેંડા</b>	<b>વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ</b>	જુએયુસીએચ- ૧, જુસીએચ- ૪,૫,૬,૭	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકમાં વાવેતર સમયે પાચામાં ડીએપી ૬૫.૨ કીલો અને ૬૧.૪ કીલો યુરીયા/હે આપવું.</li> <li>❖ એત મજુરોની અછતની પરીસ્થીતીમાં પાક વાવ્યા બાદ</li> </ul>

			<p>નીદામણ નાશક દવા ટ્રાઈફલુરાલીન ૧.૦ કી.ગ્રા. અથવા પેન્ફીમીથેલીન ૧.૦ કી.ગ્રા. સર્કીય તત્ત્વ રૂપે છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વાદળણાયું હવામાન સ્થિતિને કારણે એરંડામાં ઘોડીયા ઈચ્છાના નિયંત્રણ માટે ૨૦ મીલી ક્વીનાફ્લોસ ( ૧.૫ % ભુકી) અથવા ૪૦ ગ્રામ કાર્બોરીલ ૧૦ લી. પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
શાકભાજુ	વૃધ્ધી/કુલ/ફળ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ચુસીયા પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનું મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્પ્રોફિડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. અથવા ડ્રાયઝોફ્લોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી.પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ પાકમાં કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપરગાઈટ ૧૦ મીલી/૧૦ લીટર પાણી મિશ્રણ કરી છાંટવી.</li> <li>❖ શાકભાજુના પાકોને કુલ અને ફળની અવસ્થાએ તથા જમીનની પ્રતને ધ્યાને લઈ નીયમીત ક થી ૮ દિવસે પીયત આપવું.</li> <li>❖ શાકભાજુના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવું અને નીયમીત પીયત આપવું.</li> <li>❖ શાકભાજુ ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડિંગ કરી બજારમાં મુકવા.</li> </ul>
પશુપાલન		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા.</li> <li>❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.</li> <li>❖ પશુઓને ખરવા-મોવાસા રોગની રસીનો પ્રથમ ડોઝ ૪ માસની ઉમરે, બીજો ડોઝ ક માસની ઉમરે અને ત્યાર બાદ ૬૨ ક માસે આપવો.</li> <li>❖ ચોમાસાની ઝતુમાં વરસાદના સમયે પશુઓએ શેડમાં બાધંવા.</li> </ul>

## JUNAGADH

**Phone: 0285-2670139**

**Date:- 02-09-2016**

**(Period from 03 to 07 September -2016)**

### **Significant weather for the preceding week**

Rain fall (mm)	058.0
Maximum temperature °C	28.9-31.5
Minimum temperature °C	24.7-25.0
RH % (Morning/Afternoon)	93-83
Wind speed (Kmph)	2.6-5.5
Cloud cover	8

### **Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 07-09-2016**

Parameters	Day-1 03-09-16	Day-2 04-09-16	Day-3 05-09-16	Day-4 06-09-16	Day-5 07-09-16
Rain fall (mm)	0	0	0	2	3
Maximum temperature °C	31	31	31	30	30
Minimum temperature °C	27	27	26	26	25
Cloud cover (Okta)	4	5	5	6	6
RH I % (Morning)	83	83	83	82	82
RH II % (After noon)	73	73	76	76	76
Wind speed (Km/h)	21	23	26	28	28
Wind direction(Deg)	253	249	249	251	255

### **Agro meteorological Advisories**

<b>General Advice</b>	<b>Rain fall</b> <b>Temperature</b> <b>RH (%)</b> <b>Wind Direction and Speed</b>	There is forecasting of light rainfall during next five days. Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30-31°C and 25-27 °C, respectively. The Relative Humidity is likely to be in the range of 83-73%. Direction and speed of wind is likely to be WSW and 21-28 km/h, respectively.		
<b>Crop</b>	<b>Variety/ pest/insect</b>	<b>Stage</b>	<b>Agro met Advisories</b>	
<b>Kharif Groundnut</b>	<b>GG-20 &amp; 22, GUG-10, GG- 2,11,13, TAG- 24 &amp; 37, TPG- 41</b>	<b>Pegging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of fungal disease, soil application of 3-4 kg/ha <i>Tichodarma viride</i> for the suppression of various diseases caused by fungal pathogens.</li> <li>➤ For the control of white grub, 4 liter/ha choloropayriphos apply with irrigation OR Drenching of 25 ml choloropayriphos in 10 liter of</li> </ul>	

			<p>water near the base of the plant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in groundnut. OR spray weedicide 0.9 kg/ha pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing.</li> <li>➤ For the control of Thrips and Jassid in groundnut, spray 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water.</li> <li>➤ In Ground nut, spray 0.1% <math>\text{FeSO}_4</math> @ 100 gram with 10 gram citric acid solution to correct chlorosis.</li> <li>➤ For the control of rust, spray fungicides mencozeb 26 gm mix in 10 litre of water at after sowing of 35 days.</li> <li>➤ For the control of collar rot, deep planting of seed should be avoided. Avoiding mechanical damage, destroying plant debris, deep ploughing and rotation of groundnut with gram and wheat are useful in reducing the collar rot disease incidence.</li> <li>➤ For the control of stem rot, furrow application of 2.5 kg/ha <i>Trichoderma viridi</i>, 500 kg castor cake OR vermicomposting.</li> </ul>
<b>Cotton</b>	<b>Bg-II GCH-8, 12</b> <b>Jay Bt, Solar-66, 76, Sarju,</b> <b>Bg- II GCH-6, Mallika</b>	<b>Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In cotton apply split application of nitrogen fertilizer 166 kg urea/ha OR 400 kg AS/ha after sowing of two month.</li> <li>➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in cotton. OR spray weedicides 0.9 kg/ha fluchloralin or pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing.</li> <li>➤ For the control of Thrips and Jassid, spray 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water.</li> <li>➤ For the control of pink bollworm, spray 10 ml deltamethrin OR trizophos in 10 litre of water. Install pink bollworm pheromone traps and</li> </ul>

			remove and destroy crop residues. OR spray 100 gm <i>Beauveria bassiana</i> powder and 20 ml prophenophos mix in 10 liter of water.
<b>Sesame</b>	<b>Guj.Til-1,2,3,10</b>	<b>Flowering</b>	➤ Due to cloudy weather condition incidence of mite, for the control of spray dicophol 20 ml OR ethion 20 ml in 10 litre of water.
<b>Pigeon pea</b>	<b>BDN-2, Vaishali, GTH-1</b>	<b>Vegetative</b>	➤ Groundnut are relay cropping with pigeon pea to increase production. ➤ For the control of mite, spray Diacofol 15 ml in 10 liter of water at 35, 65 and 95 days after sowing.
<b>Soybean</b>	<b>Guj. Soya. - 1,2,3</b>	<b>Flowering</b>	➤ 30 days after sowing of soybean relay intercropping with castor planting can be obtained more production. ➤ For the control of prodenia, spray 25 ml chloropyariphos OR 10 ml methomile OR 5 ml DDVP in 10 litre of water. OR use of integrated pest management like a pheromone trap, <i>verticillium locati</i> fungi etc..
<b>Castor</b>	<b>GAUCH-1, GCH-4,5,6,7, GC-2,3</b>	<b>Vegetative</b>	➤ In unirrigated castor apply 65.2 kg DAP/ha & 61.4 kg urea/ha at the time of sowing. ➤ After sowing of castor before emergence of seed spray weedicides 1.0 kg/ha trifluralin OR 1.0 kg/ha pendimethalin. ➤ Due to cloudy weather condition for the control of castor semi looper, spray 20 ml quinalphos (1.5 % powder) OR 40 gm carbaryl in 10 liter of water.
<b>Vegetable crops</b>	-	<b>Flowering/ fruiting</b>	➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ For the control of severe attack of thrips, spray 3 ml spinosad in 10 litres of water.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the flowering and fruiting stage.</li> <li>➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.</li> </ul>
Livestock		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To provide adequate food and keep the animals clean shed.</li> <li>➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases.</li> <li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitzaz 2 ml in 1 litre of water.</li> <li>➤ During the monsoon season at the time of rain animal transfer to livestock shed.</li> </ul>

## PORBANDAR

**Phone : 0285-2670139**

**Date:- 02-09-2016**

**(Period from 03 to 07 September -2016)**

**Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 07-09-2016**

Parameters	Day-1 03-09-16	Day-2 04-09-16	Day-3 05-09-16	Day-4 06-09-16	Day-5 07-09-16
Rain fall (mm)	0	0	0	2	3
Maximum temperature °C	31	31	31	31	31
Minimum temperature °C	26	26	26	25	25
Cloud cover (Okta)	3	5	5	6	6
RH I % (Morning)	82	82	84	82	82
RH II % (After noon)	74	74	77	77	78
Wind speed (Km/h)	20	22	25	26	27
Wind direction(Deg)	251	248	247	250	254

### Agro meteorological Advisories

<b>General Advice</b>	<b>Rain fall</b>	There is forecasting of light rainfall during next five days.		
	<b>Temperature</b>	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30-31°C and 25-26°C, respectively.		
	<b>RH (%)</b>	The Relative Humidity is likely to be in the range of 84-74 %.		
	<b>Wind Direction and Speed</b>	Direction and speed of wind is likely to be WSW and 20-27 km/h, respectively.		
<b>Crop</b>	<b>Variety/ pest/insect</b>	<b>Stage</b>	<b>Agro met Advisories</b>	
<b>Kharif Groundnut</b>	<b>GG-20 &amp; 22, GUG-10, GG- 2,11,13, TAG- 24 &amp; 37, TPG- 41</b>	<b>Pegging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ For the control of fungal disease, soil application of 3-4 kg/ha <i>Tichodarmma viride</i> for the suppression of various diseases caused by fungal pathogens.</li> <li>➢ For the control of white grub, 4 liter/ha choloropayriphos apply with irrigation OR Drenching of 25 ml choloropayriphos in 10 liter of water near the base of the plant.</li> <li>➢ Interculturing and hand weeding should be carried out in groundnut. OR spray weedicide 0.9 kg/ha pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing.</li> <li>➢ For the control of Thrips and Jassid in groundnut, spray 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate</li> </ul>	

			<p>OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In Ground nut, spray 0.1% <math>\text{FeSO}_4</math> @ 100 gram with 10 gram citric acid solution to correct chlorosis.</li> <li>➤ For the control of rust, spray fungicides mencozeb 26 gm mix in 10 litre of water at after sowing of 35 days.</li> <li>➤ For the control of collar rot, deep planting of seed should be avoided. Avoiding mechanical damage, destroying plant debris, deep ploughing and rotation of groundnut with gram and wheat are useful in reducing the collar rot disease incidence.</li> <li>➤ For the control of stem rot, furrow application of 2.5 kg/ha <i>Trichoderma viridi</i>, 500 kg castor cake OR vermicomposting.</li> </ul>
<b>Cotton</b>	<b>Bg-II GCH-8, 12 Jay Bt, Solar-66, 76, Sarju, Bg- II GCH-6, Mallika</b>	<b>Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In cotton apply split application of nitrogen fertilizer 166 kg urea/ha OR 400 kg AS/ha after sowing of two month.</li> <li>➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in cotton. OR spray weedicides 0.9 kg/ha fluchloralin or pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing.</li> <li>➤ For the control of Thrips and Jassid, spray 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water.</li> <li>➤ For the control of pink bollworm, spray 10 ml deltamethrin OR trizophos in 10 litre of water. Install pink bollworm pheromone traps and remove and destroy crop residues. OR spray 100 gm <i>Beauveria bassiana</i> powder and 20 ml prophenophos mix in 10 liter of water.</li> </ul>
<b>Sesame</b>	<b>Guj.Til-1,2,3,10</b>	<b>Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Due to cloudy weather condition incidence of mite, for the control of spray dicophol 20 ml OR ethion 20 ml in 10 litre of water.</li> </ul>

<b>Pigeon pea</b>	<b>BDN-2, Vaishali, GTH-1</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Groundnut are relay cropping with pigeon pea to increase production.</li> <li>➤ For the control of mite, spray Diacofol 15 ml in 10 liter of water at 35, 65 and 95 days after sowing.</li> </ul>
<b>Soybean</b>	<b>Guj. Soya. - 1,2,3</b>	<b>Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 30 days after sowing of soybean relay intercropping with castor planting can be obtained more production.</li> <li>➤ For the control of prodenia, spray 25 ml chloropyariphos OR 10 ml methomile OR 5 ml DDVP in 10 litre of water. OR use of integrated pest management like a pheromone trap, <i>verticillium locati</i> fungi etc..</li> </ul>
<b>Castor</b>	<b>GAUCH-1, GCH-4,5,6,7, GC-2,3</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In unirrigated castor apply 65.2 kg DAP/ha &amp; 61.4 kg urea/ha at the time of sowing.</li> <li>➤ After sowing of castor before emergence of seed spray weedicides 1.0 kg/ha trifluralin OR 1.0 kg/ha pendimethalin.</li> <li>➤ Due to cloudy weather condition for the control of castor semi looper, spray 20 ml quinalphos (1.5 % powder) OR 40 gm carbaryl in 10 liter of water.</li> </ul>
<b>Vegetable crops</b>	-	<b>Flowering/ fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</li> <li>➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</li> <li>➤ For the control of severe attack of thrips, spray 3 ml spinosad in 10 litres of water.</li> <li>➤ Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the flowering and fruiting stage.</li> <li>➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.</li> </ul>

<b>Livestock</b>		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To provide adequate food and keep the animals clean shed.</li> <li>➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases.</li> <li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.</li> <li>➤ During the monsoon season at the time of rain animal transfer to livestock shed.</li> </ul>
------------------	--	---	---