



ગ્રામીણકૃષિ મૌસમ સેવા
કૃષિ હવામાન સેવ, કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ઈમેઈલ:- amfuind@yhaoo.com ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯



હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં જુનાગઢ જિલ્લા માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(કૃષિ હવામાન સેવ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

(#આઝાદી નોઅમૃત મહોત્સવ#)

વાર:- શુક્રવાર

તારીખ:- ૦૩/૧૨/૨૦૨૧

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૭૧(૨૦૨૧-૨૨)

પાછલાપાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૨૮ નવેમ્બર થી ૦૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧)					હવામાન પરિબળો	હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૦૩ થી ૦૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧) માન્ય ૦૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ સવારના ૮:૩૦ વાગ્યાં સુધી				
૨૮/૧૧	૨૯/૧૧	૩૦/૧૧	૦૧/૧૨	૦૨/૧૨	તારીખ	૦૪/૧૨	૦૫/૧૨	૦૬/૧૨	૦૭/૧૨	૦૮/૧૨
૦	૦	૦	૦	૦	વરસાદ(મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦
૩૨.૩	૩૦.૮	૩૦.૩	૨૪.૧	૨૧.૯	મહત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૨૬	૨૮	૨૯	૨૯	૨૯
૧૭.૭	૧૭.૮	૧૮.૭	૨૧.૧	૧૯.૩	લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૧૬	૧૭	૧૭	૧૬	૧૭
૦	૦	૪	૭	૬	વાદળની સ્થિતિ	૦	૦	૦	૦	૦
૮૪	૭૭	૭૧	૮૭	૯૪	સવારના ભેજના ટકા	૫૩	૫૬	૫૯	૪૪	૪૬
૪૬	૪૦	૫૨	૮૦	૮૪	બપોરબાદ ના ભેજના ટકા	૩૬	૩૬	૩૩	૨૭	૨૬
૧.૦	૧.૦	૦.૦	૧.૦	૪.૦	પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૩.૬	૯.૫	૧૦.૧	૧૧.૧	૮.૭
૬૨	૬૯	૫૧	૨૫૫	૧૮	પવનની દિશા	૩૨	૭૯	૨૭	૪૫	૬૮

સામાન્યસલાહ

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના જુનાગઢ જિલ્લામાં આગામી તારીખ ૦૪/૧૨/૨૦૨૧ થી ૦૮/૧૨/૨૦૨૧ દરમિયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં યોગ્ય રહેશે, જિલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નથી. પવનની ઝડપ થી કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન થી ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન થી ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ જુનાગઢ જિલ્લામાં ૧૪ઓક્ટોબર થી ૧૦ નવેમ્બર, ૨૦૨૧ ના સમયગાળા દરમિયાન વધુહળવીસૂકીસ્થિતિ જોવા મળેલ છે.

સાપ્તાહિક વરસાદ આગાહીનીસૂચી મુજબ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રનાંવિસ્તારમાં તા. ૦૮/૧૨/૨૦૨૧ થી તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૧ સામાન્ય થી નીચે વરસાદની શક્યતાઓ છે.

મેઘદૂત એપ્લિકેશન-કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારીમેળવવામાટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત એપ્લિકેશન કે જે ખેડૂતોને તેમનીસ્થાનિક ભાષામાંસ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.

મેઘદૂત એપ્લિકેશનનેડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

એન્ડ્રોઇડ(મોબાઈલ)ઉપયોગકર્તા:<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

આઈ.ઓ.એસ.ઉપયોગકર્તા:-


<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

❖ કોરોના (કોવીડ-૧૯) રોગચાળાની મહામારી ના લીધે,ખેડૂતમિત્રો એ ખેતર પર ખેતીની કામગીરી દરમિયાન ખેત સાધનો / ઓજારો અને ખેત મજૂરો સાથે એકબીજાથી સામાજિક અંતર રાખવું અને તે માટે ની સાવધાની અને સલામતી રાખવી તેમજ અગમચેતી જાળવવી.

❖ ખેડૂતોને ચોમાસું પાકોની કાપણી થયાં બાદ શિયાળુ પાકોનાં વાવેતર માટે ખેતરો તૈયાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

❖ શિયાળુ પાકોમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિંદામણની કામગીરી કરવી.

❖ શિયાળુ પાકોમાં ભલામણ મુજબ ખાતર અને કૃષિ રસાયણ આપવું.



5FSGJ\GFD	5FS VJ:YF	ZMUqHLJFT q HFT	S'IQF ;,FC
ધઉં	વાવેતર/ ઉગાવો / વૃદ્ધિ	ગુ.જુ.ધઉં - ૪૬૩, લોક - ૧ અને ૧૧, ગુ. ધઉં - ૩૬૬, ૪૮૬, ૧૭૩ અને ૧૧	❖ ૨૬ નવેમ્બર થી ૧૦ ડિસેમ્બરનાં સમયગાળા દરમિયાન ઘઉંનું મોડું વાવેતર કરવું. ❖ ઉધઈનો ઉપદ્રવ ઘટાડવા અગાઉનાં પાકનાં અવશેષોપાંદડાં, મૂળ અને ડાળીઓનો નાશ કરવો. ❖ સારુ કહોવાયેલુ છાણિયું ખાતર વાપરવું. ખાતર તરીકે દિવેલા,લીંબોળી અનેકરંજ વગેરેના ખોળનો ઉપયોગ કરવો. ❖ ઘઉંનાં૧૦૦ કિ.ગ્રા. બિયારણ દીઠ બાયફેન્ટ્રીન ૧૦ ઈસી ૨૦૦ મિ.લિ. અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૬૦૦ મિ.લિ. અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૪૦૦ મિ.લિ. ૫ લિટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૫ટ આપવો.

			❖ પાકને એકસરખાંસમયગાળામાં પીયત આપવું. ❖ ઘઉંના ઉભા પાકમાં ઉધઈનો ઉપદ્રવ શરુ થતો જણાય તો તુરત જ એક હેક્ટર પાક વિસ્તાર માટે ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૧.૬૦૦ લિટર અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૧.૫ લિટર દવાને ૧૦૦ કિ.ગ્રા. રેતી સાથે મિશ્રણ કરી બરાબર ભેળવીને દવાની માવજત આપેલ રેતી ઘઉંના ઉભા પાકમાં પુંખવી અને ત્યાર બાદ પાકને હળવુ પિયત આપવું. ❖ વાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ દિવસે નિદામણ નિયંત્રણ માટે ૨૦ મીલી ૨,૪ ડી. અથવા મેટસલ્ફ્યુરન મિથાઈલ ૦.૮ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં હાથથી નિદામણ ની કામગીરી કરવી.
ચણા	ઉગાવો / વૃદ્ધિ	મોલો	❖ પાકને એકસરખાંસમયગાળામાં પીયત આપવું. ❖ મોલોનાં પરિક્ષણ માટે પીળા ચીકણા પીંજર પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ પ્રમાણે ગોઠવવા. ❖ પાકમાં હાથથી નિદામણ અને આંતરખેડની કામગીરી કરવી.
ઘાણા	ઉગાવો / વૃદ્ધિ	મોલો	❖ વધારે પડતું પાણી આપવું નહિ. ❖ મોલો સામે રક્ષણ મેળવવા થાયામેથોકઝામ ૭૦ ડબલ્યુએસ દવા ૪.૨ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજને પટ આપવો. ❖ પાકને એકસરખાંસમયગાળામાં પીયત આપવું. ❖ પાકમાં હાથથી નિદામણ ની કામગીરી કરવી.
લસણ	ઉગાવો / વૃદ્ધિ	ચુસીયા	❖ પાકને એકસરખાંસમયગાળામાં પીયત આપવું. ❖ આ ચુસીયાજીવાતના અસરકારક નિયંત્રણ માટે બ્યુવેરીયા બાઝીયાના ૧.૧૫ લિ. પા. નો પ્રથમ છંટકાવ જીવાત દેખાય ત્યારે ૦.૦૦૩૫% (૩૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં), બીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) અને ત્રીજો ૦.૦૦૮ ટકા (૮૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) ૧૦ દિવસના અંતરે કરવા. ૨. ❖ આ ચુસીયાજીવાતના રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૩૦ ઈ.સી. ૧૦ મિ.લી. અથવા ક્વીનાલફોસ ૨૫ ઈ.સી. ૨૦ મિ.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી દવાની અસરકારકતા વધારવા તેમાં સ્ટીકર ઉમેરી દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં હાથથી નિદામણ ની કામગીરી કરવી.
કપાસ	ફૂલ / ઝીન્ડવા વિકાસ/ વીણી	ગુલાબી ઈયળ	❖ ફૂલ અવસ્થાથી ગુલાબી ઈયળની મોજણીની શરૂઆત કરવી. જો છોડ પર બંધ પાંખડીવાળા ફૂલ જોવા મળે તો એને વીણી લઈ તેનો નાશ કરવો. ❖ એક એકર વિસ્તાર માંથી ૨૦ લીલા જીંડવા તોડી ગુલાબી ઈયળની ક્ષમ્યમાત્રાની ચકાસણી કરવી. ❖ ગુલાબી ઈયળની ક્ષમ્યમાત્રા ૧૦% નુકશાન કરેલ ફૂલ અથવા ૧૦% નુકશાન કરેલ જીંડવા અથવા ૮ નર ફૂદા પકડાયેલા/ટ્રેપ/રાત્રી સતત ૩ દિવસ માટે છે. ❖ જો ગુલાબી ઈયળ ક્ષમ્યમાત્રા વટાવે તો થાયોડીકાર્બ ૭૫ ડબલ્યુ. પી. ૨૦ ગ્રામ અથવા ક્વીનાલફોસ ૨૦ એ. ફ. ૨૦ મી.લી./૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી પાક પર છંટકાવ કરવો. ❖ બર્ડ પર્ચીસ ગોઠવવા. ❖ ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦% ઈ. સી. ૨૫ મી. લી. અથવા થાયોડીકાર્બ ૭૫% ડબલ્યુ. પી. ૨૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી ભમરી છોડયાનાં ૧૦ દિવસ પછી છંટકાવ કરવો. ❖ સારો અને નુકશાનવાળો કપાસ જુદો વીણવો. સારા કપાસનો સંગ્રહ કરવો કે બજારમાં વેચવો જ્યારે નુકશાનવાળા કપાસનો નાશ કરવો. ❖ કપાસ જેમ જેમ પાકતો જાય તેમ તેમ વીણી કરવી અને વીણી સવારના સમયે કરવી. ❖ પાકને જરૂરીયાત મુજબ પીયત આપવું.
તુવેર	ડાળી / ફૂલ	તુવેર નો વ્યંધત્વ વાયરસ , ચુસીયા	❖ પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈસી અથવા સ્પાયરોમેસીફ્થિન ૨૨.૮ એસસી ૧૦ મિલી/૧૦ લી. નો છંટકાવ કરીને તુવેર નો વ્યંધત્વ વાયરસ અટકાવી શકાય છે. ❖ પાકમાં હાથથી નિદામણ અને આંતરખેડની કામગીરી કરવી. ❖ પાકને જરૂરીયાત મુજબ પીયત આપવું. ❖ તુવેરના પાકમાં ૫૦ % ફૂલ બેસવાની અવસ્થાએ ચુસીયા જીવાતના નિયંત્રણ માટે ૧૫ મીલી પોલીટ્રીન અથવા ૨૦ ગ્રામ એસીફેટ અથવા ૫ મીલી ઈન્ડોક્ષાકાર્બ

			અથવા ૨૫ મીલી પ્રોફેનોફોસ દવાને ૧૦લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
એરંડા	કૂલ/ ગળ બંધાવા	ઝાળ અને પાનનાં ટપકાનો રોગ	- ઝાળ અને પાનનાં ટપકાનાં રોગમાટેમેન્કોઝેબ ૭૫% વે.પા. ૨૬ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ ૫૦% વે.પા. ૪૦ ગ્રામ/૧૦ લી. મુજબ છંટકાવ કરવો. - પાકમાંહાથથી નિંદામણઅને આંતરખેડની કામગીરી કરવી. - પાકને જરૂરીયાત મુજબ પીયત આપવું. - વાદળછાયું હવામાન સ્થિતિને કારણે એરંડામાં ઘોડીયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૨૦ મીલી ક્વીનાલ્ફોસ (૧.૫ % ભુકી) અથવા ૪૦ ગ્રામ કાર્બારીલ ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
શાકભાજી	વૃધ્ધી/કૂલ/ ફૂલ	-	- આ સમયગાળા દરમિયાન દવા છંટકાવની કામગીરી કરવી. - પાકમાંહાથથી નિંદામણઅને આંતરખેડની કામગીરી કરવી. - શાકભાજી પાકોને સમયસર પીયત આપવું. - શાકભાજીના પાકોને નીંદામણ મુક્ત કરવું અને નિયમીત પિયત આપવું. શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા.
પશુપાલન	-	-	- પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો& પીવા માટે ચોખ્ખુંપાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા. - માખી મરછરથી રક્ષણ માટે ફીનાઇલ છાટવું. - પશુઓને યોગ્ય આહારમાંખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ. - ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો. - પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. - દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઇડ અથવા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.



ગ્રામીણકૃષિ મૌસમ સેવા
કૃષિ હવામાન સેવ, કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ
જુનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી
જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧
ઈમેઇલ:-amfujnd@yhaoo.com ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯



હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં પોરબંદર જિલ્લા માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(કૃષિ હવામાન સેવ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

(#આઝાદી નોઅમૃત મહોત્સવ#)

વાર:- શુક્રવાર

તારીખ: ૦૩/૧૨/૨૦૨૧

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૭૧(૨૦૨૧-૨૨)

પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૨૮ નવેમ્બર થી ૦૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧)					હવામાન પરિબળો	હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૦૩ થી ૦૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧) માન્ય ૦૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ સવારના ૮:૩૦ વાગ્યાં સુધી				
૨૮/૧૧	૨૯/૧૧	૩૦/૧૧	૦૧/૧૨	૦૨/૧૨	તારીખ	૦૪/૧૨	૦૫/૧૨	૦૬/૧૨	૦૭/૧૨	૦૮/૧૨
0	0	0	0	0	વરસાદ(મિમી)	0	0	0	0	0
-	33.7	33.5	31.0	25.0	મહત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	27	29	29	30	30
17.6	17.5	18.6	20.4	17.8	લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	16	17	17	17	17
2	3	5	7	4	વાદળની સ્થિતિ	0	0	0	0	0
86	71	49	69	74	સવારના ભેજના ટકા	48	48	48	45	47

-	35	47	40	70	બપોરબાદ ના ભેજના ટકા	35	36	37	33	32
7.4	0.0	11.1	3.7	14.8	પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	18.1	15.0	14.9	16.3	15.2
14	00	07	09	05	પવનની દિશા	22	56	27	30	26

સામાન્ય સલાહ


ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જાણવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાપોરબંદર જીલ્લામાં આગામી તારીખ ૦૪/૧૨/૨૦૨૧ થી ૦૮/૧૨/૨૦૨૧ દરમિયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં ચોખ્ખું રહેશે, જીલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નથી.પવનની ઝડપ 14.9 થી 18.1 કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન 27 થી 30 ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન થી ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

- માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ પોરબંદરજીલ્લામાં ૧૪ઓક્ટોબર થી૧૦નવેમ્બર, ૨૦૨૧ નાસમયગાળા દરમિયાન હળવીભેજનીસ્થિતિ જોવા મળેલ છે.
- સાપ્તાહિક વરસાદ આગાહીનીસૂચી મુજબ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રનાં વિસ્તારમાં તા. ૦૮/૧૨/૨૦૨૧ થી તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૧ સામાન્ય થી નીચે વરસાદની શક્યતાઓ છે.
- મેઘદૂત એપ્લીકેશન-કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારીમેળવવામાટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત એપ્લીકેશન કે જે ખેડૂતોને તેમનીસ્થાનિક ભાષામાંસ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.
- મેઘદૂત એપ્લીકેશનનેડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.
એન્ડ્રોઇડ(મોબાઈલ)ઉપયોગકર્તા:<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>
આઈ.ઓ.એસ.ઉપયોગકર્તા:-
<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ કોરોના (કોવીડ-૧૯) રોગચાળાની મહામારી ના લીધે,ખેડૂતમિત્રો એ ખેતર પર ખેતીની કામગીરી દરમિયાન ખેત સાધનો / ઓજારો અને ખેત મજૂરો સાથે એકબીજાથી સામાજિક અંતર રાખવું અને તે માટે ની સાવધાની અને સલામતી રાખવી તેમજ અગમચેતી જાળવવી.
- ❖ ખેડૂતોને ચોમાસું પાકોની કાપણી થયાં બાદ શિયાળુ પાકોનાં વાવેતર માટે ખેતરો તૈયાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
- ❖ શિયાળુ પાકોમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિંદામણની કામગીરી કરવી.
- ❖ શિયાળુ પાકોમાં ભલામણ મુજબ ખાતર અને કૃષિ રસાયણ આપવું.

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 47
(19.11.2021 to 25.11.2021) over Agricultural region

Gujarat



Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

5FSGJ\ GFD	5FS VJ:YF	ZMUqHLJF Tq HFT	S'IQF ;,FC
ઘઉં	વાવેતર / ઉગાવો / વૃદ્ધિ	ગુ.જુ.ઘઉં - ૪૬૩, લોક - ૧ અને ૧૧, ગુ. ઘઉં - ૩૬૬, ૪૮૬, ૧૭૩ અને ૧૧	❖ ૨૬ નવેમ્બર થી ૧૦ ડિસેમ્બરનાં સમયગાળા દરમિયાન ઘઉંનું મોડું વાવેતર કરવું. ❖ ઉધઈનો ઉપદ્રવ ઘટાડવા અગાઉનાં પાકનાં અવશેષોપાંદડાં, મૂળ અને ડાળીઓનો નાશ કરવો. ❖ સારુ કહોવાયેલુ છાણિયું ખાતર વાપરવું. ખાતર તરીકે દિવેલા, લીંબોળી અનેકરંજ વગેરેના ખોળનો ઉપયોગ કરવો. ❖ ઘઉંનાં ૧૦૦ કિ.ગ્રા. બિયારણ દીઠ બાયફેન્ટ્રીન ૧૦ ઈસી ૨૦૦ મિ.લિ. અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૬૦૦ મિ.લિ. અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૪૦૦ મિ.લિ. ૫ લિટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૫ટ આપવો. ❖ પાકને એકસરખાંસમયગાળામાં પીયત આપવું. ❖ ઘઉંના ઉભા પાકમાં ઉધઈનો ઉપદ્રવ શરુ થતો જણાય તો તુરત જ એક હેક્ટર પાક વિસ્તાર માટે ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૧.૬૦૦ લિટર અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૧.૫ લિટર દવાને ૧૦૦ કિ.ગ્રા. રેતી સાથે મિશ્રણ કરી બરાબર ભેળવીને દવાની માવજત આપેલ રેતી ઘઉંના ઉભા પાકમાં પુંખવી અને ત્યાર બાદ પાકને હળવુ પિયત આપવું. ❖ વાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ દિવસે નિદામણ નિયંત્રણ માટે ૨૦ મીલી ૨,૪ ડી. અથવા મેટસલ્ફ્યુરન મિથાઈલ ૦.૮ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં હાથથી નિદામણ ની કામગીરી કરવી.
ચણા	ઉગાવો / વૃદ્ધિ	મોલો	❖ પાકને એકસરખાંસમયગાળામાં પીયત આપવું. ❖ મોલોનાં પરિક્ષણ માટે પીળા ચીકણા પીંજર પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ પ્રમાણે ગોઠવવા. ❖ પાકમાં હાથથી નિદામણ અને આંતરખેડની કામગીરી કરવી.
જરૂ	વાવેતર/ ઉગાવો	ચુસીયા	❖ જરૂમાં થાયોમેથોકઝામ ૭૦ ડબલ્યુએસ દવા ૪.૨ ગ્રામ અથવા ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યુએસ દવા ૧૦ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજને ૫ટ આપીને વાવણી કરવાથી શિપ્સ સામે રક્ષણ મળે છે. ❖ થાયરમ ૩ ગ્રામ/કિલો મુજબ બીજ માવજત આપવી. ❖ પાકને એકસરખાંસમયગાળામાં પીયત આપવું. ❖ ચુસીયાના નિયંત્રણ માટે એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો.

			❖ પાકમાં હાથથી નિંદામણ અને આંતરખેડની કામગીરી કરવી.
લસણ	ઉગાવો / વૃદ્ધિ	ચુસીયા	❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું. ❖ આ ચુસીયા જીવાતના અસરકારક નિયંત્રણ માટે બ્યુવેરીયા બાઝીયાના ૧.૧૫ વે.પા. નો પ્રથમ છંટકાવ જીવાત દેખાય ત્યારે ૦.૦૦૩૫% (૩૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં), બીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) અને ત્રીજો ૦.૦૦૮ ટકા (૮૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) ૧૦ દિવસના અંતરે કરવા ૨. ❖ આ ચુસીયા જીવાતના રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૩૦ ઇ.સી. ૧૦ મિ.લી. અથવા ક્વીનાલ્ફોસ ૨૫ ઇ.સી. ૨૦ મિ.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી દવાની અસરકારકતા વધારવા તેમાં સ્ટીકર ઉમેરી ટ્રાવેલનો છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં હાથથી નિંદામણ ની કામગીરી કરવી.
કપાસ	ફૂલ / ઝીન્ડવા વિકાસ / વીણી	ગુલાબી ઈયળ	❖ ફૂલ અવસ્થાથી ગુલાબી ઈયળની મોજણીની શરૂઆત કરવી. જો છોડ પર બંધ પાંખડીવાળા ફૂલ જોવા મળે તો એને વીણી લઈ તેનો નાશ કરવો. ❖ એક એકર વિસ્તાર માંથી ૨૦ લીલા જીન્ડવા તોડી ગુલાબી ઈયળની ક્ષમ્યમાત્રાની ચકાસણી કરવી. ❖ ગુલાબી ઈયળની ક્ષમ્યમાત્રા ૧૦% નુકશાન કરેલ ફૂલ અથવા ૧૦% નુકશાન કરેલ જીન્ડવા અથવા ૮ નર ફૂદા પકડાયેલા ટ્રેપ/રાત્રી સતત ૩ દિવસ માટે છે. ❖ જો ગુલાબી ઈયળ ક્ષમ્યમાત્રા વટાવે તો થાયોડીકાર્બ ૭૫ ડબલ્યુ. પી. ૨૦ ગ્રામ અથવા ક્વીનાલ્ફોસ ૨૦ એ. ફ. ૨૦ મી.લી./૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી પાક પર છંટકાવ કરવો. ❖ બર્ડ પર્ચિસ ગોઠવવા. ❖ પરજીવી ભમરી ટ્રાઈકોગામાં બેક્ટરી @ ૬૦,૦૦૦/ એકર છોડવી. ❖ ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦% ઇ. સી. ૨૫ મી. લી. અથવા થાયોડીકાર્બ ૭૫% ડબલ્યુ. પી. ૨૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી ભમરી છોડયાનાં ૧૦ દિવસ પછી છંટકાવ કરવો. ❖ સારો અને નુકશાનવાળો કપાસ જુદો વીણવો. સારા કપાસનો સંગ્રહ કરવો કે બજારમાં વેંચવો જ્યારે નુકશાનવાળા કપાસનો નાશ કરવો. ❖ કપાસ જેમ જેમ પાકતો જાય તેમ તેમ વીણી કરવી અને વીણી સવારના સમયે કરવી. ❖ પાકને જરૂરીયાત મુજબ પીયત આપવું.
તુવેર	ડાળી / ફૂલ	તુવેર નો વ્યંધત્વ વાયરસ, ચુસીયા	❖ પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઇસી અથવા સ્પાયરોમેસીફેન ૨૨.૮ એસસી ૧૦ મિલી/૧૦ લી. નો છંટકાવ કરીને તુવેર નો વ્યંધત્વ વાયરસ અટકાવી શકાય છે. ❖ પાકમાં હાથથી નિંદામણ અને આંતરખેડની કામગીરી કરવી. ❖ પાકને જરૂરીયાત મુજબ પીયત આપવું. ❖ તુવેરના પાકમાં ૫૦ % ફૂલ બેસવાની અવસ્થાએ ચુસીયા જીવાતના નિયંત્રણ માટે ૧૫ મીલી પોલીટ્રીન અથવા ૨૦ ગ્રામ એસીફેટ અથવા ૫ મીલી ઈન્ડોક્ષાકાર્બ અથવા ૨૫ મીલી પ્રોફેનોફોસ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
એરંડા	ફૂલ/ ગળ બંધાવા	ઝાળ અને પાનના ટપકાનો રોગ	❖ ઝાળ અને પાનનાં ટપકાનાં રોગમાટે મેન્કોઝેબ ૭૫% વે.પા. ૨૬ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ ૫૦% વે.પા. ૪૦ ગ્રામ/૧૦ લી. મુજબ છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં હાથથી નિંદામણ અને આંતરખેડની કામગીરી કરવી. ❖ પાકને જરૂરીયાત મુજબ પીયત આપવું. ❖ વાદળછાયું હવામાન સ્થિતિને કારણે એરંડામાં ઘોડીયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૨૦ મીલી ક્વીનાલ્ફોસ (૧.૫ % ભુકી) અથવા ૪૦ ગ્રામ કાર્બારીલ ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
શાકભાજી	વૃદ્ધિ/ફૂલ/ ફળ	-	❖ આ સમયગાળા દરમિયાન દવા છંટકાવની કામગીરી કરવી. ❖ પાકમાં હાથથી નિંદામણ અને આંતરખેડની કામગીરી કરવી. ❖ શાકભાજી પાકોને સમયસર પીયત આપવું. ❖ શાકભાજીના પાકોને નીંદામણ મુક્ત કરવું અને નિયમિત પિયત આપવું. શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા.
પશુપાલન	-	-	❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો& પીવા માટે ચોખ્ખું પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા.

		❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઇલ છાટવું. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાં ખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ. ❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. ❖ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઇડ અથવા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.
--	--	---



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
કૃષિ હવામાન સેવા, કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ
જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી
જૂનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧
ઈમેઇલ:- amfujnd@yhaoo.com ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૮



હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં **ગીર સોમનાથ જિલ્લા** માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન

(કૃષિ હવામાન સેવા, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

(#આઝાદી નો અમૃત મહોત્સવ#)

વાર:- શુક્રવાર

તારીખ:- ૦૩/૧૨/૨૦૨૧

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૭૧ (૨૦૨૧-૨૨)

પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૨૮ નવેમ્બર થી ૦૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧)					હવામાન પરિબલો	હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૦૩ થી ૦૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧) માન ૦૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ સવારના ૮:૩૦ વાગ્યાં સુધી				
૨૮/૧૧	૨૯/૧૧	૩૦/૧૧	૦૧/૧૨	૦૨/૧૨	તારીખ	૦૪/૧૨	૦૫/૧૨	૦૬/૧૨	૦૭/૧૨	૦૮/૧૨
૦	૦	૦	૦.૮	૩.૭	વરસાદ(મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦
-	૩૨.૬	૩૩.૮	૩૨.૯	૨૩.૫	મહત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૨૭	૨૮	૨૯	૨૯	૩૦
૨૦.૭	૨૦.૬	૨૧.૨	૨૦.૦	૧૮.૫	લઘુતમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૧૭	૧૮	૧૮	૧૭	૧૬
૧	૦	૬	૮	૭	વાદળની સ્થિતિ	૦	૦	૦	૦	૦
૮૭	૭૨	૬૦	૯૧	૯૮	સવારના ભેજના ટકા	૬૦	૬૭	૬૯	૫૨	૫૫
-	૫૦	૫૬	૭૨	૮૫	બપોરના ભેજના ટકા	૪૫	૪૩	૪૦	૩૫	૩૫
૦.૦	૩.૭	૫.૬	૧૪.૮	૫.૬	પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૩.૫	૯.૮	૧૧.૫	૧૧.૧	૮.૮
૦૦	૦૭	૦૫	૦૯	૦૨	પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૩૨	૨૯૨	૩૦	૪૫	૧૮૦

સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જાણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં **ગીર સોમનાથ જિલ્લા**માં આગામી તારીખ **૦૪/૧૨/૨૦૨૧ થી ૦૮/૧૨/૨૦૨૧** દરમિયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં **ચોખ્ખું** રહેશે, જિલ્લામાં આગામી આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નથી. પવનની ઝડપ **૮.૮ થી ૧૩.૫** કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન **૨૭ થી ૩૦** ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુતમ તાપમાન **૧૬ થી ૧૮** ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

- માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ ગીર સોમનાથ જીલ્લામાં ૧૪ ઓક્ટોબર થી ૧૦ નવેમ્બર, ૨૦૨૧ ના સમયગાળા દરમિયાન હળવીભેજની સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.
- સાપ્તાહિક વરસાદ આગાહીની સૂચી મુજબ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રનાં વિસ્તારમાં તા. ૦૮/૧૨/૨૦૨૧ થી તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૧ સામાન્ય થી નીચે વરસાદની શક્યતાઓ છે.

- મેઘદૂત એપ્લિકેશન- કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારી મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત એપ્લિકેશન કે જે ખેડૂતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.

- મેઘદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

એન્ડ્રોઇડ (મોબાઈલ) ઉપયોગકર્તા: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

આઈ.ઓ.એસ. ઉપયોગકર્તા:-


<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- કોરોના (કોવીડ-૧૯) રોગચાળાની મહામારી ના લીધે, ખેડૂત મિત્રો એ ખેતર પર ખેતીની કામગીરી દરમિયાન ખેત સાધનો/ ઓજારો અને ખેત મજૂરો સાથે એકબીજાથી સામાજિક અંતર રાખવું અને તે માટે નીસાવધાની અને સલામતી રાખવી તેમજ અગમચેતી જાળવવી.

- ખેડૂતોને ચોમાસું પાકોની કાપણી થયાં બાદ શિયાળુ પાકોનાં વાવેતર માટે ખેતરો તૈયાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

- શિયાળુ પાકોમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિંદામણની કામગીરી કરવી.

- શિયાળુ પાકોમાં ભલામણ મુજબ ખાતર અને કૃષિ રસાયણ આપવું.



5FSGJ\GFD	5FS VJ:YF	ZMUqHLJF Tq HFT	S'IQF ;,FC
ઘઉં	વાવેતર / ઉગાવો/ વૃદ્ધિ	મોડુ વાવેતર :- ગુ.જુ.ઘઉં - ૧૭૩, લોક - ૧, ગુ. ઘઉં -૧૧ અને એમ પી	૨૬ નવેમ્બર થી ૧૦ ડિસેમ્બરનાં સમયગાળા દરમિયાન ઘઉંનું મોડું વાવેતર કરવું. - ઉષ્ઠનો ઉપદ્રવ ઘટાડવા અગાઉનાં પાકનાં અવશેષો પાંદડાં, મૂળ અને ડાળીઓનો નાશ કરવો. - સારુ કહોવાયેલુ છાણિયું ખાતર વાપરવું. ખાતર તરીકે દિવેલા, લીંબોળી અને કરંજ

		- ૩૨૮૮	વગેરેના ખોળનો ઉપયોગ કરવો. ❖ ઘઉંનાં ૧૦૦ કિ.ગ્રા. બિયારણ દીઠ બાયફેન્ટ્રીન ૧૦ ઇંસી ૨૦૦ મિ.લિ. અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૬૦૦ મિ.લિ. અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇંસી ૪૦૦ મિ.લિ. ૫ લિટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૫ટ આપવો. ❖ પાકને એક્સરખાંસમયગાળામાં પીયત આપવું. ❖ ઘઉંના ઉભા પાકમાં ઉધઈનો ઉપદ્રવ શરુ થતો જણાય તો તુરત જ એક હેક્ટર પાક વિસ્તાર માટે ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૧.૬૦૦ લિટર અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇંસી ૧.૫ લિટર દવાને ૧૦૦ કિ.ગ્રા. રેતી સાથે મિશ્રણ કરી બરાબર ભેળવીને દવાની માવજત આપેલ રેતી ઘઉંના ઉભા પાકમાં પુંખવી અને ત્યાર બાદ પાકને હળવુ પિયત આપવું. ❖ વાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ દિવસે નિદામણ નિયંત્રણ માટે ૨૦ મીલી ૨,૪ ડી. અથવા મેટસલ્ફ્યુરન મિથાઈલ ૦.૮ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં હાથથી નિદામણ ની કામગીરી કરવી.
ચણા	ઉગાવો / વૃદ્ધિ	મોલો	❖ પાકને એક્સરખાંસમયગાળામાં પીયત આપવું. ❖ મોલોનાં પરિક્ષણ માટે પીળા ચીકણા પીંજર પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ પ્રમાણે ગોઠવવા. ❖ પાકમાં હાથથી નિદામણ અને આંતરખેડની કામગીરી કરવી.
ધાણા	ઉગાવો / વૃદ્ધિ	મોલો	❖ વધારે પડતું પાણી આપવું નહિ. ❖ મોલો સામે રક્ષણ મેળવવા થાયમેથોક્ઝામ ૭૦ ડબલ્યુએસ દવા ૪.૨ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજને ૫ટ આપવો. ❖ પાકને એક્સરખાંસમયગાળામાં પીયત આપવું. ❖ પાકમાં હાથથી નિદામણ ની કામગીરી કરવી.
લસણ	ઉગાવો / વૃદ્ધિ	ચુસીયા	❖ પાકને એક્સરખાંસમયગાળામાં પીયત આપવું. ❖ આ ચુસીયાજીવાતના અસરકારક નિયંત્રણ માટે બ્યુવેરીયા બાઝીયાના ૧.૧૫ લે.પા. નો પ્રથમ છંટકાવ જીવાત દેખાય ત્યારે ૦.૦૦૩૫% (૩૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં), બીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) અને ત્રીજો ૦.૦૦૮ ટકા (૮૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) ૧૦ દિવસના અંતરે કરવા ૨. ❖ આ ચુસીયાજીવાતના રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૩૦ ઇ.સી. ૧૦ મિ.લી. અથવા કવીનાલફોસ ૨૫ ઇ.સી. ૨૦ મિ.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી દવાની અસરકારકતા વધારવા તેમાં સ્ટીકર ઉમેરી દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.
તુવેર	ડાળી/ ફૂલ	તુવેર નો વ્યંધત્વ વાયરસ , ચુસીયા	❖ પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઇંસી અથવા સ્પાયરોમેસીફ્ઝિન ૨૨.૮ એસસી ૧૦ મિલી/૧૦ લી. નો છંટકાવ કરીને તુવેર નો વ્યંધત્વ વાયરસ અટકાવી શકાય છે. ❖ પાકમાં હાથથી નિદામણ અને આંતરખેડની કામગીરી કરવી. ❖ પાકને જરૂરીયાત મુજબ પીયત આપવું. ❖ તુવેરના પાકમાં ૫૦ % ફૂલ બેસવાની અવસ્થાએ ચુસીયા જીવાતના નિયંત્રણ માટે ૧૫ મીલી પોલીટ્રીન અથવા ૨૦ ગ્રામ એસીફેટ અથવા ૫ મીલી ઈન્ડોક્ષાકાર્બ અથવા ૨૫ મીલી પ્રોફેનોફોસ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
શાકભાજી	બુધ્ધી/ફૂલ/ ફળ	-	❖ આ સમયગાળા દરમિયાન દવા છંટકાવની કામગીરી કરવી. ❖ પાકમાં હાથથી નિદામણ અને આંતરખેડની કામગીરી કરવી. ❖ શાકભાજી પાકોને સમયસર પીયત આપવું. ❖ શાકભાજીના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવું અને નિયમીત પિયત આપવું. શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા.
પશુપાલન	-	-	❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો& પીવા માટે ચોખ્ખું પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા. ❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવું. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાં ખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ. ❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો. ❖ પશુઓમાં ઇતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨

મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.
❖ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાવડરથી
બરાબર સાફ કરવા.

યાંત્રિક અધિકારી
ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
જુ.કૃ.યુ.

	Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS) Agro meteorological Cell Department of Agronomy Junagadh Agricultural University Junagadh-362001 E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139	
---	--	---

Agromet Advisory Service Bulletin for Junagadh District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

(#AZADI KA AMRIT MAHOTSAV#)

Day:- Friday

Date: 03-12-2021

Agromet Advisory Service bulletin. No:- 071 (2021-22)

Observed Weather during last Five days (Dated 28 th Nov. to 02 nd Dec., 2021)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 04 th to 08 th December, 2021) until 08:30 hrs of 08-12-2021				
28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	Date	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12
0	0	0	0	0	Rainfall(mm)	0	0	0	0	0
32.3	30.8	30.3	24.1	21.9	T _{max} (°C)	26	28	29	29	29
17.7	17.8	18.7	21.1	19.3	T _{min} (°C)	16	17	17	16	17
0	0	4	7	6	Cloud Cover	0	0	0	0	0
84	77	71	87	94	RH-I (%)	53	56	59	44	46
46	40	52	80	84	RH-II (%)	36	36	33	27	26
1.0	1.0	0.0	1.0	4.0	Wind speed (km/hr)	13.6	9.5	10.1	11.1	8.7
62	69	51	255	18	Wind direction	32	79	27	45	68

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall	As per IMD Forecast, There is forecasting of no rainfall occurs during next five days. Sky will be remaining clear.
	Temperature	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 26 - 29°C and 16 - 17°C, respectively.

	RH (%)	The Relative Humidity is likely to be in the range of 26 – 59 %.
	Wind Direction and Wind Speed	Direction and speed of wind is NE & E and 8.7 – 13.6 km/h, respectively.

✚ **Standardized Precipitation Index:** - For the period of **14th October to 10th November, 2021** for Junagadh district considered under the mildly dry condition.

✚ **AS per ERFs products** Below Normal rainfall may occur in South Saurashtra region during 08th to 14th December, 2021.

✚ **MEGHDOOT Mobile Application:-** Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.


Click on the following link to download the MEGHDOOT application:

Android users: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

IOS users: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ **Due to pandemic of CORONA (COVID-19), Farmers should maintain social distancing and safety precaution while handling farm machines and labour in the field.**
- ❖ **Farmers are advised to prepare their field after harvesting of kharif crops for the sowing of rabi season crops timely.**
- ❖ **Interculturing and hand weeding should be carried out in rabi crops.**
- ❖ **To apply fertilizer and agrochemicals as per recommendation dose in rabi crops.**

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 47
(19.11.2021 to 25.11.2021) over Agricultural region



Agricultural vigour is good over few places of Gujarat region.

Crop	Variety/ Pest/Insect	Stage	Agro met Advisories
Wheat	Late Sowing:- GJW-173, Lok-1, GW- 11 and MP - 3288	Sowing / Germination / Vegetative	➤ Late sowing of wheat crop done during 26th Nov. to 10th December duration. ➤ To control Termite, Removal and destruction of preceding crop plant parts. ➤ Seed treatment with bifenthrin 10 EC 200 ml or fipronil 5 SC 600 ml or chlorpyrifos 20 EC 400 ml in 5 litre of water for 100 kg of wheat seed. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Apply chlorpyrifos 20 EC 1.5 litre or fipronil 5 SC 1.6 litre in 100 kg of sand, mix it and spread it and give the light irrigation or through irrigation (chemigation). ➤ At 30-35 days after sowing spray 20 ml 2-4-D ethyle easter or Metasulfuron 0.8 gm/10 liters of water to control broad leafy weeds in wheat crop.
Chickpea	Aphid	Germination / Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor aphid population. ➤ Hand weeding and Interculturing operation should be carry out.
Coriander	Aphid	Germination / Vegetative	➤ Over irrigation should be avoided. ➤ Seed treatment of thiamethoxam 70 WS 4.2 gram/kg against aphid. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Hand weeding operation should be carry out.
Garlic	Thrips	Germination /	➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.

		Vegetative	➤ For management of thrips, apply schedule spraying of Beauveria bassiana 1.15 WP (min 2 x 10⁶ cfu/g), first spray at initiation of pest infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) spray at 10 days interval. ➤ To chemical control of thrips, spray Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water). ➤ Hand weeding operation should be carry out.
Cotton	Pink bollworm	Flowering / Boll formation, development / Picking	➤ Assess ETL by plucking 20 green bolls from randomly selected plants across one acre. ➤ ETL of pink bollworm -10% infested flowers or 10% infested bolls or 8 male moths catches/trap/night for 3 consecutive nights ➤ If ETL crossed, spray Thiodicarb 75 WP 20g or Quinalphos 20AF 20ml per 10 liters of water. ➤ Set up bird perches. ➤ Release parasitoid Trichogramma bactrae @60000/acre if available ➤ Spray Chlorpyrifos 20%EC 25ml Or Thiodicarb 75 WP 20g per 10 litres of water after 10 days of parasitoid release. ➤ Picking of clean and infested cotton may be carried out separately. Clean cotton may be stored or marketed. Infested cotton should be destroyed. ➤ Picking of cotton should be carried out during morning hours. ➤ Apply irrigation to the crop at critical stage.
Pigeon pea	Sterility mosaic virus, Sucking pest	Branching / Flowering	➤ To Spray Propargite 57 EC or Spiromesifen 22.9 SC 10 ml/10 l control of the sterility mosaic virus.

			➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out. ➤ Apply irrigation to the crop at critical stage. ➤ For the control of sucking pest at 50 % flowering, spray 15 ml politrin OR 20 gm acephate OR 50 ml endoxacarb OR 25 ml profenophos in 10 liter of water.
Castor	Blight and Leaf spot	Flowering / Capsule formation	➤ To control of blight and leaf spot, spray with Mancozeb 75 % WP 26 g/10 lit or copper oxichloride 50 % WP 40g/10 lit. ➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out. ➤ Apply irrigation to the crop at critical stage. ➤ Due to cloudy weather condition for the control of castor semi looper, spray 20 ml quinalphos (1.5 % powder) OR 40 gm carbaryl in 10 liter of water.
Vegetable crops	-	Sowing/ Flowering/ Fruiting	➤ To the spray of agrochemicals during this period. ➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.
Livestock	-	-	➤ To provide adequate food & clean water for drinking and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture.

			Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.
--	--	--	---



Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agro meteorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001
E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139



Agromet Advisory Service Bulletin for Porbandar District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

(#AZADI KA AMRIT MAHOTSAV#)

Day:-Friday

Date: 03-12-2021

Agromet Advisory Service bulletin. No:-071 (2021-22)

Observed Weather during last Five days (Dated 28 th Nov. to 02 nd Dec., 2021)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 04 th to 08 th December, 2021) until 08:30 hrs of 08-12-2021				
28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	Date	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12
0	0	0	0	0	Rainfall(mm)	0	0	0	0	0
-	33.7	33.5	31.0	25.0	Tmax (°C)	27	29	29	30	30
17.6	17.5	18.6	20.4	17.8	Tmin (°C)	16	17	17	17	17
2	3	5	7	4	Cloud Cover	0	0	0	0	0
86	71	49	69	74	RH-I (%)	48	48	48	45	47
-	35	47	40	70	RH-II (%)	35	36	37	33	32
7.4	0.0	11.1	3.7	14.8	Wind speed (km/hr)	18.1	15.0	14.9	16.3	15.2
14	00	07	09	05	Wind direction	22	56	27	30	26


Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall	As per IMD Forecast, There is forecasting of no rainfall occurs during next five days. Sky will be remaining clear.
	Temperature	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 27 - 30°C and 16 - 17°C, respectively.
	RH (%)	The Relative Humidity is likely to be in the range of 32 – 48 %.
	Wind Direction and	Direction and speed of wind is to be NE & E and 14.9 – 18.1 km/h, respectively.
	Wind Speed	

- ❖ **Standardized Precipitation Index:** - For the period **14th October to 10th November, 2021** for Porbandar district considered under the mildly wet condition.
- ❖ **AS per ERFs products** Below Normal rainfall may occur in South Saurashtra region during 08th to 14th December, 2021.
- ❖ **MEGHDOOT Mobile Application:-** **Download** the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.
Click on the following link to download the MEGHDOOT application:
Android users: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>
IOS users: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>
- ❖ **Due to pandemic of CORONA (COVID-19), Farmers should maintain social distancing and safety precaution while handling farm machines and labour in the field.**
- ❖ **Farmers are advised to prepare their field after harvesting of kharif crops for the sowing of rabi season crops timely.**
- ❖ **Interculturing and hand weeding should be carried out in rabi crops.**
- ❖ **To apply fertilizer and agrochemicals as per recommendation dose in rabi crops.**

**NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 47
(19.11.2021 to 25.11.2021) over Agricultural region**

Gujarat



Agricultural vigour is good over few places of Gujarat region.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

Crop	Variety/ Pest / Insect	Stage	Agro met Advisories
Wheat	Late Sowing:- GJW-173, Lok-1, GW- 11and MP - 3288	Sowing / Germination / Vegetative	➤ Late sowing of wheat crop done during 26th Nov. to 10th December duration. ➤ To control Termite, Removal and destruction of preceding crop plant parts. ➤ Apply well decomposed FYM to soil. Use castor, neem or karanj cake as organic manure. ➤ Seed treatment with bifenthrin10 EC 200 ml or fipronil5 SC 600 ml or chlorpyriphos20 EC 400 ml in 5 litre of water for 100 kg of wheat seed. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Apply chlorpyriphos 20 EC 1.5 litre or fipronil 5 SC 1.6 litre in 100 kg of sand, mix it and spread it and give the light irrigation or through irrigation (chemigation). ➤ At 30-35 days after sowing spray 20 ml 2-4-D ethyleeaster or Metasulfuron 0.8 gm/10

			liters of water to control broad leafy weeds in wheat crop.
Chickpea	Aphid	Germination / Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor aphid population. ➤ Hand weeding and Interculturing operation should be carry out.
Cumin	Guj. Cumin – 3 and 4 / Thrips	Germination / Establishment	➤ Seed treatment of thiamethoxam 70 WS 4.2 gram or imidacloprid 70 WS 10 gram/kg against thrips. ➤ Seed treatment of thiram 3 g/kg seed. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Spray acephate⁷⁵ SP 10 gram per 10 liter of water to control thrips. ➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out.
Garlic	Thrips	Germination / Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ For management of thrips, apply schedule spraying of Beauveria bassiana 1.15 WP (min 2×10^6 cfu/g), first spray at initiation of pest infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) spray at 10 days interval. ➤ To chemical control of thrips, spray Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water). ➤ Hand weeding operation should be carry

			out.
Cotton	Pink bollworm	Flowering / Boll formation, development / Picking	➤ Assess ETL by plucking 20 green bolls from randomly selected plants across one acre. ➤ ETL of pink bollworm -10% infested flowers or 10% infested bolls or 8 male moths catches/trap/night for 3 consecutive nights ➤ If ETL crossed, spray Thiodicarb 75 WP 20g or Quinalphos 20AF 20ml per 10 liters of water. ➤ Set up bird perches. ➤ Release parasitoid Trichogramma abactrae @60000/acre if available ➤ Spray Chlorpyrifos 20%EC 25ml Or Thiodicarb 75 WP 20g per 10 litres of water after 10 days of parasitoid release. ➤ Picking of clean and infested cotton may be carried out separately. Clean cotton may be stored or marketed. Infested cotton should be destroyed. ➤ Picking of cotton should be carried out during morning hours. ➤ Apply irrigation to the crop at critical stage.
Pigeon pea	Sterility mosaic virus	Branching / Flowering	➤ To Spray Propargite 57 EC or Spiromesifen 22.9 SC 10 ml/10 l control of the sterility mosaic virus. ➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out. ➤ Apply irrigation to the crop at critical stage. ➤ For the control of sucking pest at 50 % flowering, spray 15 ml politrin OR 20 gmacephate OR 50 ml endoxacarb OR 25 ml profenophos in 10 liter of water.
Castor	Blight and Leaf spot	Flowering / Capsule formation	➤ To control of blight and leaf spot, spray with Mancozeb 75 % WP 26 g/10 lit or copper oxichloride 50 % WP 40g/10 lit.

			➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out. ➤ Apply irrigation to the crop at critical stage. ➤ Due to cloudy weather condition for the control of castor semi looper, spray 20 ml quinalphos (1.5 % powder) OR 40 gmcarbaryl in 10 liter of water.
Vegetable crops	-	Sowing/ Flowering/ Fruiting	➤ To the spray of agrochemicals during this period. ➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.
Livestock	-	-	➤ To provide adequate food& clean water for drinking and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.



Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139



Agromet Advisory Service Bulletin for Gir Somnath District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

(#AZADI KA AMRIT MAHOTSAV#)

Day:-Friday

Date: 03-12-2021

Agromet Advisory Service bulletin. No:-071 (2021-22)

Observed Weather during last Five days (Dated 28 th Nov. to 02 nd Dec., 2021)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 04 th to 08 th December, 2021) until 08:30 hrs of 08-12-2021				
28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	Date	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12
0	0	0	0.8	3.7	Rainfall(mm)	0	0	0	0	0
-	32.6	33.8	32.9	23.5	Tmax (°C)	27	28	29	29	30
20.7	20.6	21.2	20.0	18.5	Tmin (°C)	17	18	18	17	16
1	0	6	8	7	Cloud Cover	0	0	0	0	0
87	72	60	91	98	RH-I (%)	60	67	69	52	55
-	50	56	72	85	RH-II (%)	45	43	40	35	35
0.0	3.7	5.6	14.8	5.6	Wind speed (km/hr)	13.5	9.8	11.5	11.1	8.8
00	07	05	09	02	Wind direction	32	292	30	45	180

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall	As per IMD Forecast, There is forecasting of no rainfall occurs during next five days. Sky will be remaining clear.
	Temperature	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 27 - 30°C and 16 - 18°C, respectively.
	RH (%)	The Relative Humidity is likely to be in the

	Wind Direction and Wind Speed	range of 35 – 69 %. Direction and speed of wind is to be NE & E and 8.8 – 13.5 km/h, respectively.
--	--------------------------------------	---

✚ **Standardized Precipitation Index:** - For the period of **14th October to 10th November, 2021** for GirSomnath district considered under the mildly wet condition.

✚ **AS per ERS products** Below Normal rainfall may occur in South Saurashtra region during 08th to 14th December, 2021.

✚ **MEGHDOOT Mobile Application:-** **Download** the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.

Click on the following link to download the MEGHDOOT application:

Android users: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

IOS users: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>


❖ **Due to pandemic of CORONA (COVID-19), Farmers should maintain social distancing and safety precaution while handling farm machines and labour in the field.**

❖ **Farmers are advised to prepare their field after harvesting of kharif crops for the sowing of rabi season crops timely.**

❖ **Interculturing and hand weeding should be carried out in rabi crops.**

To apply fertilizer and agrochemicals as per recommendation dose in rabi crops.

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 47
(19.11.2021 to 25.11.2021) over Agricultural region



Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

Crop	Variety/ Pest / Insect	Stage	Agro met Advisories
Wheat	Late Sowing:- GJW-173, Lok-1, GW- 11and MP - 3288	Sowing / Germination / vegetative	➤ Late sowing of wheat crop done during 26th Nov. to 10th December duration. ➤ To control Termite, Removal and destruction of preceding crop plant parts. ➤ Apply well decomposed FYM to soil. Use castor, neem or karanj cake as organic manure. ➤ Seed treatment with bifenthrin10 EC 200 ml or fipronil5 SC 600 ml or chlorpyriphos20 EC 400 ml in 5 litre of water for 100 kg of wheat seed. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Apply chlorpyriphos 20 EC 1.5 litre or fipronil 5 SC 1.6 litre in 100 kg of sand, mix it and spread it and give the light irrigation or through irrigation (chemigation). ➤ At 30-35 days after sowing spray 20 ml 2-4-D ethyleeaster or Metasulfuron 0.8 gm/10 liters of water to control broad leafy weeds in wheat crop. ➤ Hand weeding operation should be carry out.
Chickpea	Aphid	Germination / vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor aphid population.

			➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out.
Coriander	Aphid	Sowing	➤ Over irrigation should be avoided. ➤ Seed treatment of thiamethoxam 70 WS 4.2 gram/kg against aphid. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out.
Garlic	Thrips	Germination / vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ For management of thrips, apply schedule spraying of Beauveriabassiana 1.15 WP (min 2 x 10⁶ cfu/g), first spray at initiation of pest infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) spray at 10 days interval. ➤ To chemical control of thrips, spray Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water). ➤ Hand weeding operation should be carry out.
Pigeon pea	Sterility mosaic virus	Branching / Flowering	➤ To Spray Propergite 57 EC or Spiromesifen 22.9 SC 10 ml/10 l control of the sterility mosaic virus. ➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out. ➤ Apply irrigation to the crop at critical stage. ➤ For the control of sucking pest at 50 %

			flowering, spray 15 ml politrin OR 20 gmacephate OR 50 ml endoxacarb OR 25 ml profenophos in 10 liter of water.
Sugarcane	-	Vegetative	➤ To the spray of agrochemicals during this period. ➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out. ➤ Apply irrigation to the crop at critical stage.
Vegetable crops	-	Sowing/ Flowering/ Fruiting	➤ To the spray of agrochemicals during this period. ➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out. ➤ Apply irrigation to the crop at regular interval. ➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.
Livestock	-	-	➤ To provide adequate food& clean water for drinking and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly

			clean with zinc oxide or boric powder.
--	--	--	--

Technical Officer
Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
J.A.U., Junagadh

AMFU, JAU, Junagadh