



75
આઝાદી કા
અમૃત મહોત્સવ

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
કૃષિ હવામાન સેલ
કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
જૂનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ઈમેઈલ : - amfujnd@yhaoo.com ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯



G20
ભારત 2023 INDIA

હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં જૂનાગઢ જિલ્લા માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(કૃષિ હવામાન સેલ, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

વાર:- શુક્રવાર તારીખ:- ૦૪/૦૪/૨૦૨૫
હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૦૨ (૨૦૨૪-૨૫)

પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૩૦ માર્ચ થી ૦૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૫)					હવામાન પરિબલો	હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૦૫ થી ૦૯ એપ્રિલ, ૨૦૨૫) માન્ય ૦૯ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ સવારના ૮:૩૦ વાગ્યાં સુધી				
૩૦/૦૩	૩૧/૦૩	૦૧/૦૪	૦૨/૦૪	૦૩/૦૪	તારીખ	૦૫/૦૪	૦૬/૦૪	૦૭/૦૪	૦૮/૦૪	૦૯/૦૪
૦	૦	૦	૦	૦	વરસાદ(મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦
૩૭.૯	૩૯.૧	૩૯.૪	૪૦.૧	૪૦.૬	મહત્તમ તાપમાન (°સ.ગ્ર)	૪૨	૪૩	૪૩	૪૪	૪૪
૧૮.૦	૨૬.૦	૨૭.૧	૨૦.૩	૨૦.૫	લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ગ્ર)	૨૧	૨૨	૨૩	૨૩	૨૩
ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	વાદળની સ્થિતિ	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
૪૬	૩૨	૨૮	૪૦	૪૩	સવારના ભજના ટકા	૪૦	૪૦	૩૫	૩૫	૩૫
૧૧	૭	૧૦	૧૦	૧૧	બપોરબાદના ભજના ટકા	૧૫	૧૫	૧૫	૧૫	૧૫
૬.૭	૭.૩	૭.૧	૫.૫	૩.૮	પવનના ગતિ (કિમી/કલાક)	૬	૯	૧૦	૯	૧૦
૩૬૦	૩૪૦	૩૬૦	૩૪૦	૩૨૦	પવનની દિશા	૩૪૨	૩૪૦	૩૩૭	૩૩૬	૩૪૦

સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહિતી અનુસાર અત્રેનાં ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છેકે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના જૂનાગઢ જિલ્લામાં આગામી તારીખ ૦૫/૦૪/૨૦૨૫ થી ૦૯/૦૪/૨૦૨૫ દરમિયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં મુખ્યત્વે ચોખ્ખું રહેશે, જિલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નહિવત છે. પવનની ઝડપ ૦૬ થી ૧૦ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન ૪૨ થી ૪૪ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન ૨૧ થી ૨૩ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

✦ માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ જૂનાગઢ જિલ્લામાં ૨૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ થી ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫ નાં

સમયગાળા દરમિયાન હળવી સૂકી સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.

✦ સાપ્તાહિક હવામાન આગાહીની સૂચી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનાં વિસ્તારોમાં તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૫ થી તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૫ દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય થી ઉપર ૬ મહત્તમ તાપમાન અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતાઓ છે.


✦ મેઘદૂત એપ્લિકેશન:-કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારીમેળવવામાટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત એપ્લિકેશન કે જે ખેડૂતોને તેમનીસ્થાનિક ભાષામાંસ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.

મેઘદૂત એપ્લિકેશનનેડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

એન્ડ્રોઈડ(મોબાઈલ)ઉપયોગકર્તા:-<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

આઈ.ઓ.એસ.ઉપયોગકર્તા:-<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ શિયાળુ પાકોની કાપણી થઈ ગયા બાદ આખા ખેતરનુ અવલોકન કરી જમીનના નમુના લેવા અને પૃથ્થકરણ કરવા માટે લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવા.
- ❖ ઉનાળું ઋતુમાં જમીનમાં ઉંડી ખેડ કરવી જેથી રોગ અને કીટકોની જુદી જુદી અવસ્થાએ સુર્યતાપ સામે ખુલ્લી થતા નાશ પામે.
- ❖ સમયસર વાવેલ ઉનાળુ પાકોમાં આંતરખેડ અને નીંદણની કામગીરી કરવી.
- ❖ વર્તમાન ગરમ હવામાનને પગલે ઉનાળુ શાકભાજી, મગફળી, તલ અને ઘાસચારાના પાકોને સાંજના સમયે જરૂરિયાત મુજબ હળવું પીયત આપવું.



પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ / જીવાત / જાત	કૃષિ સલાહ
ઉનાળું મગફળી	ફૂલ	યૂસીયા જીવાત	❖ પાકને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી.

			❖ મગફળીમાં ચુસીયા, મોલોમશી, થ્રીપ્સ ના નિયંત્રણ માટે ફોસ્ફામીડોન ૩ મીલી દવા અથવા ડાયમીથોએટ ૧૫ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. મોલોમશી સાથે દાળીયા જીવાત જોવા મળે તો દાવાનો છંટકાવ મુલતવી રાખવો. મગફળીના પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણ કરવું.
ઉનાળું મગ	વૃદ્ધિ	ચૂસીયા જીવાત	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ ચૂસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાનું તેલ @૫ મિલી/ લીટર મુજબ છાંટવું. પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી.
ઉનાળું અડદ	વૃદ્ધિ	ચૂસીયા જીવાત	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ ચૂસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાનું તેલ @૫ મિલી/ લીટર મુજબ છાંટવું. પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી.
ઉનાળું તલ	વૃદ્ધિ	તડતડિયા / સફેદમાખી	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. પાકમાં તડતડિયા અને સફેદમાખીનાં નિયંત્રણ માટે ઓક્ઝીડીમેટોન - મિથાઇલ ૨૫ ઇ.સી.નો છંટકાવ કરવો. પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી.
આંબા	ફૂલ / ફળ અવસ્થા	મધીયા & ભુકીછારા	❖ આંબામાં મધીયાના નિયંત્રણમાટે ૫૦ % કાર્બારીલ ૪૦ ગ્રામ પાવડર અથવા ૩૬ % ઇ.સી. મોનોક્રોટોફોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લી.પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ આંબામાં ભુકીછારા ના નિયંત્રણ માટે ૧૦ લી. પાણીમાં ૩૦ ગ્રામ દ્રાવ્ય ગંધક + કેરેથોન ૪૮ % ઇ.સી. ૧૦ મીલી દવાનો છંટકાવ કરવો. ❖ આંબાને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. કેરી સોપારી જેવડા કદની થાય એટલે ૨૦ પી.પી.એમ. એન.એ.એ. અને ૨% ચુરીયા ના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવાથી કેરી ખરતી અટકે છે અને ફળના કદમાં વધારો થાય છે.
શાકભાજી	વૃદ્ધિ/ફૂલ/ ફળ	-	❖ શાકભાજીના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવું. શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા. ❖ પાકને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી.

			આગાહી સમયગાળા દરમિયાન ખેતર પરનાં બધાં ખેતકાર્યો કરવા.
પશુપાલન	-	-	❖ દિવસનું તાપમાન વધી રહ્યું હોવાથી, ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે જરૂરી પગલા લેવા અને પશુઓને ગરમીના તણાવથી બચાવવા. તેઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે બપોરનાસમય દરમિયાન જમીનની તૈયારી અને ખેડની કામગીરીને ટાળો અને બપોરથી સાંજ સુધી પ્રાણીઓને આરામ આપો. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો & પીવા માટે ચોખ્ખું પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા. ❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવું. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાંખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ. ❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો. ❖ પશુઓમાં ઇતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.



75
આઝાદી કા
અમૃત મહોત્સવ

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
કૃષિ હવામાન સેલ
કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
જૂનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ઈમેઈલ: - amfujnd@yahoo.com ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯



G20
ભારત 2023

હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં પોરબંદર જિલ્લા માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન (કૃષિ હવામાન સેલ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

વાર:- શુક્રવાર

તારીખ: ૦૪/૦૪/૨૦૨૫

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૦૨ (૨૦૨૪-૨૫)

પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૩૦ માર્ચ થી ૦૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૫)					હવામાન પરિબળો	હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૦૫ થી ૦૯ એપ્રિલ, ૨૦૨૫) માન્ય ૦૯ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ - સવારના ૮:૩૦ વાગ્યાં સુધી				
૩૦/૦૩	૩૧/૦૩	૦૧/૦૪	૦૨/૦૪	૦૩/૦૪	તારીખ	૦૫/૦૪	૦૬/૦૪	૦૭/૦૪	૦૮/૦૪	૦૯/૦૪

૦	૦	૦	૦	૦	વરસાદ (મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦
૩૮.૫	૩૯.૭	૪૦.૦	૩૯.૭	૪૦.૬	મહત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૩૭	૩૮	૩૯	૩૯	૩૯
૧૯.૨	૨૧.૨	૨૩.૦	૧૯.૬	૧૮.૮	લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૨૦	૨૦	૨૧	૨૧	૨૧
ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	વાદળની સ્થિતિ	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
૪૫	૪૭	૪૭	૩૭	૪૭	સવારના ભેજના ટકા	૬૦	૬૦	૬૦	૬૦	૬૦
૧૮	૧૬	૧૬	૩૬	૪૩	બપોરબાદના ભેજના ટકા	૫૦	૫૦	૫૦	૫૦	૫૦
-	૭.૪	૧૧.૧	૧૧.૧	-	પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૯	૧૨	૧૫	૧૫	૧૩
-	૩૬૦	૩૪૦	૩૬૦	-	પવનની દિશા	૩૩૫	૩૩૫	૩૩૧	૩૨૨	૩૨૬

સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છેકે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના પોરબંદર જીલ્લામાં આગામી તારીખ ૦૫/૦૪/૨૦૨૫ થી ૦૯/૦૪/૨૦૨૫ દરમિયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં મુખ્યત્વે ચોખ્ખું રહેશે, જીલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નહિવત છે. પવનની ઝડપ ૦૯ થી ૧૫ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન ૩૭ થી ૩૯ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન ૨૦ થી ૨૧ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.


- માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ પોરબંદર જીલ્લામાં ૨૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ થી ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫ નાં સમયગાળા દરમિયાન હળવી સૂકી સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.
- સાપ્તાહિક હવામાન આગાહીની સૂચી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનાં વિસ્તારોમાં તા.૦૯/૦૪/૨૦૨૫ થી તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૫ દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય થી ઉપર મહત્તમ તાપમાન અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતાઓ છે.
- મેઘદૂત એપ્લિકેશન:-કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારી મેળવવામાટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત એપ્લિકેશન કે જે ખેડૂતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.

મેઘદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

એન્ડ્રોઈડ(મોબાઈલ)ઉપયોગકર્તા:-<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

આઈ.ઓ.એસ.ઉપયોગકર્તા:-<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ શિયાળુ પાકોની કાપણી થઈ ગયા બાદ આખા ખેતરનુ અવલોકન કરી જમીનના નમુના લેવા અને પૃથ્થકરણ કરવા માટે લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવા.
- ❖ ઉનાળું ઋતુમાં જમીનમાં ઉંડી ખેડ કરવી જેથી રોગ અને કીટકોની જુદી જુદી અવસ્થાએ સુર્યતાપ સામે ખુલ્લી થતા નાશ પામે.
- ❖ સમયસર વાવેલ ઉનાળુ પાકોમાં આંતરખેડ અને નીંદણની કામગીરી કરવી.
- ❖ વર્તમાન ગરમ હવામાનને પગલે ઉનાળુ શાકભાજી, મગફળી, તલ અને ઘાસચારાના પાકોને સાંજના સમયે જરૂરિયાત મુજબ હળવું પીયત આપવું.



પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ / જીવાત / જાત	કૃષિ સલાહ
ઉનાળું મગફળી	ફૂલ	યૂસીયા જીવાત	❖ પાકને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ મગફળીમાં યુસીયા, મોલોમશી, થ્રીપ્સ ના નિયંત્રણ માટે ફોસ્ફામીડોન ૩ મીલી દવા અથવા ડાયમીથોએટ ૧૫ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. મોલોમશી સાથે દાળીયા જીવાત જોવા મળે તો દાવાનો છંટકાવ મુલતવી રાખવો. મગફળીના પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણ કરવું.
ઉનાળું મગ	વૃદ્ધિ	યૂસીયા જીવાત	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ યૂસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાનું તેલ @૫ મિલી/લીટર મુજબ છાંટવું. - પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી.
ઉનાળું અડદ	વૃદ્ધિ	યૂસીયા જીવાત	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી.

			❖ ચૂસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાનું તેલ @૫ મિલી/લીટર મુજબ છાંટવું. પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી.
ઉનાળું તલ	વૃદ્ધિ	તડતડિયા / સફેદમાખી	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. પાકમાં તડતડિયા અને સફેદમાખીનાં નિયંત્રણ માટે ઓક્ઝીડીમેટોન - મિથાઈલ ૨૫ ઇ.સી.નો છંટકાવ કરવો. પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી.
આંબા	ફૂલ / ફળ અવસ્થા	મધીયા & ભુકીછારા	❖ આંબામાં મધીયાના નિયંત્રણમાટે ૫૦ % કાર્બારીલ ૪૦ ગ્રામ પાવડર અથવા ૩૬ % ઇ.સી. મોનોક્રોટોફોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લી.પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ આંબામાં ભુકીછારા ના નિયંત્રણ માટે ૧૦ લી. પાણીમાં ૩૦ ગ્રામ દ્રાવ્ય ગંધક + કેરેથોન ૪૮ % ઇ.સી. ૧૦ મીલી દવાનો છંટકાવ કરવો. ❖ આંબાને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. કેરી સોપારી જેવડા કદની થાય એટલે ૨૦ પી.પી.એમ. એન.એ.એ. અને ૨% ચુરીયા ના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવાથી કેરી ખરતી અટકે છે અને ફળના કદમાં વધારો થાય છે.
શાકભાજી	વૃદ્ધી/ફૂલ/ ફળ	-	❖ શાકભાજીના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવું. શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા. ❖ પાકને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. આગાહી સમયગાળા દરમિયાન ખેતર પરનાં બધાં ખેતકાર્યો કરવા.
પશુપાલન	-	-	❖ દિવસનું તાપમાન વધી રહ્યું હોવાથી, ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે જરૂરી પગલા લેવા અને પશુઓને ગરમીના તણાવથી બચાવવા. તેઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે બપોરનાસમય દરમિયાન જમીનની તૈયારી અને ખેડની કામગીરીને ટાળો અને બપોરથી સાંજ સુધી પ્રાણીઓને આરામ આપો. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો & પીવા માટે યોગ્ય પાણી આપવું

		અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા. ❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવું. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાંખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ. ❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.
--	--	---



75
આઝાદી કા
અમૃત મહોત્સવ

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
કૃષિ હવામાન સેલ
કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ઈમેઈલ : - amfujnd@yahoo.com ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯



G20
ભારત 2023 INDIA

હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં ગીર સોમનાથ જીલ્લા માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(કૃષિ હવામાન સેલ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

વાર:- શુક્રવાર

તારીખ:-૦૪/૦૪/૨૦૨૫

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૦૨ (૨૦૨૫-૨૬)

પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૩૦ માર્ચ થી ૦૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૫)					હવામાન પરિબલો	હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૦૫ થી ૦૯ એપ્રિલ, ૨૦૨૫) માન્ય ૦૯ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ સવારના ૮:૩૦ વાગ્યાં સુધી				
૩૦/૦૩	૩૧/૦૩	૦૧/૦૪	૦૨/૦૪	૦૩/૦૪	તારીખ	૦૫/૦૪	૦૬/૦૪	૦૭/૦૪	૦૮/૦૪	૦૯/૦૪
૦	૦	૦	૦	૦	વરસાદ (મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦
૩૮.૨	૩૬.૪	૩૭.૮	૩૫.૮	૩૯.૨	મહત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૩૧	૩૨	૩૨	૩૨	૩૧
૨૦.૧	૨૩.૦	૨૪.૪	૨૪.૨	૨૨.૯	લઘુતમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૨૩	૨૪	૨૪	૨૪	૨૪
ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	વાદળની સ્થિતિ	મોટેભાગે ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
૭૫	૭૨	૭૦	૭૪	૭૬	સવારના ભેજના ટકા	૯૦	૮૫	૭૫	૭૫	૮૦
૨૫	૩૯	૩૫	૩૦	૭૨	બપોરબાદના ભેજના ટકા	૬૫	૬૦	૫૫	૫૫	૫૫
૩.૭	-	-	૧.૯	૩.૭	પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	૧૨	૧૬	૧૭	૧૮	૧૮
૯૯	-	-	૯૯	૯૯	પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૩૩૭	૩૪૧	૩૩૭	૩૩૫	૩૩૫

સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશ્રી ના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવેછે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના ગીર સોમનાથ જીલ્લામાં આગામી તારીખ ૦૫/૦૪/૨૦૨૫ થી ૦૬/૦૪/૨૦૨૫ દરમિયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી દિવસોમાં મુખ્યત્વે ચોખ્ખું થી મોટેભાગે ચોખ્ખું રહેશે, જીલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નહિવત છે. પવનની ઝડપ ૧૨ થી ૧૮ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતાઓ રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન ૩૧ થી ૩૨ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન ૨૩ થી ૨૪ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

✦ માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ ગીર સોમનાથ જીલ્લામાં ૨૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ થી ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫ નાં સમયગાળા દરમિયાન હળવી સૂકી સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.

✦ સાપ્તાહિક હવામાન આગાહીની સૂચી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનાં વિસ્તારોમાં તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૫ થી તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૫ દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય થી ઉપર ૬ મહત્તમ તાપમાન અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતાઓ છે.

✦ મેઘદૂતએપ્લિકેશન:-કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારીમેળવવામાટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત એપ્લિકેશન કે જે ખેડૂતોને તેમનીસ્થાનિક ભાષામાંસ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.

મેઘદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.



એન્ડ્રોઈડ(મોબાઈલ)ઉપયોગકર્તા:-<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

આઈ.ઓ.એસ.ઉપયોગકર્તા:-<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ શિયાળુ પાકોની કાપણી થઈ ગયા બાદ આખા ખેતરનું અવલોકન કરી જમીનના નમુના લેવા અને પૃથ્થકરણ કરવા માટે લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવા.
- ❖ ઉનાળું ઋતુમાં જમીનમાં ઉંડી ખેડ કરવી જેથી રોગ અને કીટકોની જુદી જુદી અવસ્થાએ સુર્યતાપ સામે ખુલ્લી થતા નાશ પામે.
- ❖ સમયસર વાવેલ ઉનાળુ પાકોમાં આંતરખેડ અને નીંદણની કામગીરી કરવી.
- ❖ વર્તમાન ગરમ હવામાનને પગલે ઉનાળુ શાકભાજી, મગફળી, તલ અને ઘાસચારાના પાકોને સાંજના સમયે જરૂરિયાત મુજબ હળવું પીયત આપવું.

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 13
(26.03.2025 to 01.04.2025) over Agricultural region

Gujarat



Agriculture vigour is good at isolated places of the eastern part of the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ / જીવાત / જાત	કૃષિ સલાહ
ઉનાળું મગફળી	ફૂલ	ચૂસીયા જીવાત	❖ પાકને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ મગફળીમાં ચુસીયા, મોલોમશી, થ્રીપ્સ ના નિયંત્રણ માટે ફોસ્ફામીડોન ૩ મીલી દવા અથવા ડાયમીથોએટ ૧૫ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. મોલોમશી સાથે દાળીયા જીવાત જોવા મળે તો દાવાનો છંટકાવ મુલતવી રાખવો. મગફળીના પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણ કરવું.
ઉનાળું મગ	વૃદ્ધિ	ચૂસીયા જીવાત	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ ચૂસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાનું તેલ @૫ મિલી/ લીટર મુજબ છાંટવું. - પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી.
ઉનાળું અડદ	વૃદ્ધિ	ચૂસીયા જીવાત	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ ચૂસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાનું તેલ @૫ મિલી/ લીટર મુજબ છાંટવું. - પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી.
ઉનાળું તલ	વૃદ્ધિ	તડતડિયા / સફેદમાખી	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. - પાકમાં તડતડિયા અને સફેદમાખીનાં નિયંત્રણ માટે ઓક્ઝીડીમેટોન - મિથાઈલ ૨૫ ઇ.સી.નો છંટકાવ કરવો. - પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી.
આંબા	ફળ અવસ્થા	મધીયા & ભુકીછારા	❖ આંબામાં મધીયાના નિયંત્રણ માટે ૫૦ % કાર્બારીલ ૪૦ ગ્રામ

			લી.પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ આબામાં ભુકીછારા ના નિયંત્રણ માટે ૧૦ લી. પાણીમાં ૩૦ ગ્રામ દ્રાવ્ય ગંધક + કેરેથોન ૪૮ % ઈ.સી. ૧૦ મીલી દવાનો છંટકાવ કરવો. ❖ આબાને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. કેરી સોપારી જેવડા કદની થાય એટલે ૨૦ પી.પી.એમ. એન.એ.એ. અને ૨% ચુરીયા ના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવાથી કેરી ખરતી અટકે છે અને ફળના કદમાં વધારો થાય છે.
શાકભાજી	વુધ્ધી/કુલ/ ફળ	-	❖ શાકભાજીના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવું. શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા. ❖ પાકને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. આગાહી સમયગાળા દરમિયાન ખેતર પરનાં બધાં ખેતકાર્યો કરવા.
પશુપાલન	-	-	❖ પશુઓને યોગ્ય આહારઆપવો & પીવા માટે ચોખ્ખું પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા. ❖ દિવસનું તાપમાન વધી રહ્યું હોવાથી, ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે જરૂરી પગલા લેવા અને પશુઓને ગરમીના તણાવથી બચાવવા. તેઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે બપોરનાસમય દરમિયાન જમીનની તૈયારી અને ખેડની કામગીરીને ટાળો અને બપોરથી સાંજ સુધી પ્રાણીઓને આરામ આપો. ❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવું. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાંખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ. ❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.

યાંત્રિક અધિકારી
ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
જ.કૃ.યુ.



Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139



Agromet Advisory Service Bulletin for Junagadh District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

Day:- Friday

Date: 04-04-2025

Agromet Advisory Service bulletin. No:- 002 (2025-26)

Observed Weather during last Five days (Dated 30 th March to 03 rd April, 2025)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 05 th to 09 th April, 2025) until 08:30 hrs of 09-04-2025				
30/03	31/03	01/04	02/04	03/04	Date	05/04	06/04	07/04	08/04	09/04
0	0	0	0	0	Rainfall(mm)	0	0	0	0	0
37.9	39.1	39.4	40.1	40.6	T _{max} (°C)	42	43	43	44	44
18.0	26.0	27.1	20.3	20.5	T _{min} (°C)	21	22	23	23	23
0	0	0	0	0	Cloud Cover	0	0	0	0	0
46	32	28	40	43	RH-I (%)	40	40	35	35	35
11	7	10	10	11	RH-II (%)	15	15	15	15	15
6.7	7.3	7.1	5.5	3.8	Wind speed (km/hr)	6	9	10	9	10
360	340	360	340	320	Wind direction	342	340	337	336	340

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall	As per IMD Forecast, There is forecasting of no rainfall occurs during next five days. Sky will be remaining clear.
	Temperature	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 42 - 44°C and 21 - 23°C , respectively.
	RH (%)	The Relative Humidity is likely to be in the range of 15 - 40 % .
	Wind Direction and Wind Speed	Direction and speed of wind is to be N & NW and around 06 to 10 km/h , respectively.

✚ **Standardized Precipitation Index:** - For the period of 26th December, 2024 to 22nd January, 2025. Junagadh district considered under the mildly dry condition.

✚ **As per ERFs products,** **above normal** rainfall and T_{max} & T_{min} **normal** may occur in Saurashtra & Kutch region during **09th to 15th April, 2025.**

✚ **MEGHDOOT Mobile Application:-** **Download** the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.

Click on the following link to download the MEGHDOOT application:

Android users: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>


IOS users: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

✚ **After harvesting of rabi crops, take the soil samples and send to the soil testing laboratory for the soil analysis.**

✚ **To cultivate deep in the soil summer season so that diseases and pests are destroyed at different stages by the direct sunlight.**

✚ **To carry out weeding and inter culturing operations in timely sown summer season crops.**

✚ **Due to prevailing hot weather irrigate summer vegetable and fodder crop during evening hours.**



Crop	Variety/ Pest/Insect	Stage	Agro met Advisories
Summer Groundnut	Sucking pest	Flowering	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ For the control of sucking pest (aphid, thrips

			Dimethoate in 10 litre of water. For ladybird beetle is observed with aphid then postpone the spraying operation. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in groundnut.
Summer Green gram	Sucking pest	Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. To spray neem oil @ 5 ml/l for the control of sucking pest. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop.
Summer Black gram	Sucking pest	Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To spray neem oil @ 5 ml/l for the control of sucking pest. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop.
Summer Sesame	Leafhopper / Whitefly	Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. To control of leafhopper and whitefly, Spray Oxydemeton-methyl 25 EC. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop.
Mango	Madhiya & Powdery mildew	Fruiting	➤ For the control of madhiya, spray 50 % WP carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of water. ➤ For the control of powdery mildew, spray 30 gm sulphur + 48 % EC carethon 10 ml in 10 liter of water. ➤ Apply irrigation to the mango at regular an

			interval. ➤ To Spray 20 PPM NAA and 2 % urea solution for the control of stops fruit break and increase the fruit size.
Vegetable crops	-	Sowing/ Flowering/ Fruiting	➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading. ➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To done all the activity of farm during forecast period.
Livestock	-	-	➤ As the day temperatures are increasing, farmers are advised to take necessary measures and protect livestock from heat stress. They are advised to avoid land preparation and draught operations during mid days and give rest for draught animals from noon to evening. ➤ To provide adequate food & clean water for drinking and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre

			of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.
--	--	--	---



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139



Agromet Advisory Service Bulletin for Porbandar District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

Day:- Friday

Date: 04-04-2025

Agromet Advisory Service bulletin. No:- 002 (2025-26)


Observed Weather during last Five days (Dated 30 th March to 03 rd April, 2025)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 05 th to 09 th April, 2025) until 08:30 hrs of 09-04-2025				
30/03	31/03	01/04	02/04	03/04	Date	05/04	06/04	07/04	08/04	09/04
0	0	0	0	0	Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
38.5	39.7	40.0	39.7	40.6	Tmax (°C)	37	38	39	39	39
19.2	21.2	23.0	19.6	18.8	Tmin (°C)	20	20	21	21	21
0	0	0	0	0	Cloud Cover	0	0	0	0	0
45	47	47	37	47	RH-I (%)	60	60	60	60	60
18	16	16	36	43	RH-II (%)	50	50	50	50	50
-	7.4	11.1	11.1	-	Wind speed (km/hr)	9	12	15	15	13
-	360	340	360	-	Wind direction	335	335	331	322	326

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall	As per IMD Forecast, There is forecasting of no rainfall occurs during next five days. Sky will be remaining clear.
	Temperature	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 37 - 39°C and 20 - 21°C , respectively.
	RH (%)	The Relative Humidity is likely to be in the

	Wind Direction and Wind Speed	range of 50 – 60 % . Direction and speed of wind is to be mostly NW and 09 - 15 km/h , respectively.
--	--	--

- ❖ **Standardized Precipitation Index**: - For the period **26th December, 2024 to 22nd January, 2025**. Porbandar district considered under the mildly dry condition.
- ❖ **As per ERFIS products**, **above normal** rainfall and T_{max} . & T_{min} **normal** may occur in Saurashtra & Kutch region during **09th to 15th April, 2025**.
- ❖ **MEGHDOOT Mobile Application**: **Download** the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.
Click on the following link to download the MEGHDOOT application:
Android users: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>
IOS users: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>
- ✚ **After harvesting of rabi crops, take the soil samples and send to the soil testing laboratory for the soil analysis.**
- ✚ **To cultivate deep in the soil summer season so that diseases and pests are destroyed at different stages by the direct sunlight.**
- ✚ **To carry out weeding and inter culturing operations in timely sown summer season crops.**
- ✚ **Due to prevailing hot weather irrigate summer vegetable and fodder crop during evening hours.**



Crop	Variety/ Pest / Insect	Stage	Agro met Advisories
Summer Groundnut	Sucking pest	Germination / Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval.

			➤ For the control of sucking pest (aphid, thrips jassid), spray 3 ml Phosphamidon OR 15 ml Dimethoate in 10 litre of water. For ladybird beetle is observed with aphid then postpone the spraying operation. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in groundnut.
Summer Green gram	Sucking pest	Germination / Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. To spray neem oil @ 5 ml/l for the control of sucking pest. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop.
Summer Black gram	Sucking pest	Germination / Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To spray neem oil @ 5 ml/l for the control of sucking pest. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop.
Summer Sesame	Leafhopper / Whitefly	Germination / Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. To control of leafhopper and whitefly, Spray Oxydemeton-methyl 25 EC. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop.
Mango	Madhiya & Powdery mildew	Fruiting	➤ For the control of madhiya, spray 50 % WP carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of water. ➤ For the control of powdery mildew, spray 30 gm sulphur + 48 % EC carethon 10 ml in

			10 liter of water. ➤ Apply irrigation to the mango at regular an interval. ➤ To Spray 20 PPM NAA and 2 % urea solution for the control of stops fruit break and increase the fruit size.
Vegetable crops	-	Sowing/ Flowering/ Fruiting	➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading. ➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To done all the activity of farm during forecast period.
Livestock	-	-	➤ As the day temperatures are increasing, farmers are advised to take necessary measures and protect livestock from heat stress. They are advised to avoid land preparation and draught operations during mid days and give rest for draught animals from noon to evening. ➤ To provide adequate food & clean water for drinking and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder.

		➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.
--	--	---

  आज़ादी का अमृत महोत्सव	Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS) Agrometeorological Cell Department of Agronomy Junagadh Agricultural University Junagadh-362001 E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139	
---	--	---

Agromet Advisory Service Bulletin for Gir Somnath District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

Day:- Friday

Date: 04-04-2025

Agromet Advisory Service Bulletin. No:-002 (2025-26)

Observed Weather during last Five days (Dated 30 th March to 03 rd April,2025)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 05 th to 09 th April,2025) until 08:30 hrs of 09-04-2025				
30/03	31/03	01/04	02/04	03/04	Date	05/04	06/04	07/04	08/04	09/04
0	0	0	0	0	Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
38.2	36.4	37.8	35.8	39.2	Tmax (°C)	31	32	32	32	31
20.1	23.0	24.4	24.2	22.9	Tmin (°C)	23	24	24	24	24
0	0	0	0	0	Cloud cover	2	0	0	0	0
75	72	70	74	76	RH-I (%)	90	85	75	75	80
25	39	35	30	72	RH-II (%)	65	60	55	55	55
3.7	-	-	1.9	3.7	Wind speed (km/hr)	12	16	17	18	18
99	-	-	99	99	Wind direction	337	341	337	335	335

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall	As per IMD Forecast, There is forecasting of no rainfall occurs during next five days. Sky will be remaining clear.
	Temperature	Maximum and minimum temperature likely to

		be in range of 31 - 32°C and 23 - 24°C , respectively.
	RH (%)	The Relative Humidity is likely to be in the range of 55 – 90 % .
	Wind Direction and Wind Speed	Direction and speed of wind is to be NW & N and around 12 – 18 km/h , respectively.

✚ **Standardized Precipitation Index:** - For the period **26th December, 2024 to 22nd January, 2025**. Gir Somnath district considered under the mildly dry condition.

✚ **As per ERFs products,** **above normal** rainfall and T_{max} & T_{min} **normal** may occur in Saurashtra & Kutch region during **09th to 15th April, 2025**.

✚ **MEGHDOOT Mobile Application:-Download** the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.

Click on the following link to download the MEGHDOOT application:

Android users: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>


IOS users: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

✚ **After harvesting of rabi crops, take the soil samples and send to the soil testing laboratory for the soil analysis.**

✚ **To cultivate deep in the soil summer season so that diseases and pests are destroyed at different stages by the direct sunlight.**

✚ **To carry out weeding and inter culturing operations in timely sown summer season crops.**

✚ **Due to prevailing hot weather irrigate summer vegetable and fodder crop during evening hours.**



Crop	Variety/ Pest / Insect	Stage	Agro met Advisories
Summer Groundnut	Sucking pest	Flowering	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ For the control of sucking pest (aphid, thrips jassid), spray 3 ml Phosphamidon OR 15 ml Dimethoate in 10 litre of water. For ladybird beetle is observed with aphid then postpone the spraying operation. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in groundnut.
Summer Green gram	Sucking pest	Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. - To spray neem oil @ 5 ml/l for the control of sucking pest. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop.
Summer Black gram	Sucking pest	Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To spray neem oil @ 5 ml/l for the control of sucking pest. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop.
Summer Sesame	Leafhopper / Whitefly	Vegetative	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. - To control of leafhopper and whitefly, Spray Oxydemeton-methyl 25 EC. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop.
Mango	Madhiya &	Fruiting	➤ For the control of madhiya, spray 50 % WP

	mildew		carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of water. ➤ For the control of powdery mildew, spray 30 gm sulphur + 48 % EC carethon 10 ml in 10 liter of water. ➤ Apply irrigation to the mango at regular an interval. ➤ To Spray 20 PPM NAA and 2 % urea solution for the control of stops fruit break and increase the fruit size.
Vegetable crops	-	Sowing/ Flowering/ Fruiting	➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading. ➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To done all the activity of farm during forecast period.
Livestock	-	-	➤ As the day temperatures are increasing, farmers are advised to take necessary measures and protect livestock from heat stress. They are advised to avoid land preparation and draught operations during mid days and give rest for draught animals from noon to evening. ➤ To provide adequate food & clean water for drinking and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture.

			Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.
--	--	--	--

Technical Officer
Gramin Krishi Mausam Seva (GKMS)
J.A.U., Junagadh