

પત્રક-અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુદેટીન

(સમય તા : ૦૬.૦૮.૧૪ થી તા : ૧૦.૦૯.૧૪)

પાછળા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાક્ય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	84.4
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગે.)	30.4
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	23.6
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	93-83
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	3.5

પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૧૦.૦૮.૧૪ સુધી)

હવામાન પરીબળોઅ	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૦૬.૮.૧૪	2	1
	૦૭.૮.૧૪	2	2
	૦૮.૮.૧૪	1	2
	૦૯.૮.૧૪	2	2
	૧૦.૮.૧૪	10	3
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૫.૮.૧૪	30	30
	૦૬.૮.૧૪	29	30
	૦૭.૮.૧૪	29	29
	૦૮.૮.૧૪	29	29
	૧૦.૮.૧૪	28	29
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૫.૮.૧૪	25	27
	૦૭.૮.૧૪	25	27
	૦૮.૮.૧૪	25	26
	૦૯.૮.૧૪	25	27
	૧૦.૮.૧૪	25	27
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો)	૦૬.૮.૧૪	મોટે ભાગે વાદળછાયુ	મોટે ભાગે વાદળછાયુ
	૦૭.૮.૧૪	મોટે ભાગે વાદળછાયુ	મોટે ભાગે વાદળછાયુ
	૦૮.૮.૧૪	મોટે ભાગે વાદળછાયુ	મોટે ભાગે વાદળછાયુ
	૦૯.૮.૧૪	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૧૦.૮.૧૪	મોટે ભાગે વાદળછાયુ	મોટે ભાગે વાદળછાયુ
મહત્વમાન ભેજ (%)	૦૬.૮.૧૪	86	86
	૦૭.૮.૧૪	87	87
	૦૮.૮.૧૪	86	86
	૦૯.૮.૧૪	87	87
	૧૦.૮.૧૪	87	87
લઘુત્વમાન ભેજ (%)	૦૬.૮.૧૪	79	79
	૦૭.૮.૧૪	77	78
	૦૮.૮.૧૪	76	78
	૦૯.૮.૧૪	78	76
	૧૦.૮.૧૪	79	78
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૦૬.૮.૧૪	026	024
	૦૭.૮.૧૪	021	019
	૦૮.૮.૧૪	021	019
	૦૯.૮.૧૪	023	020
	૧૦.૮.૧૪	025	023
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૦૬.૮.૧૪	250	250
	૦૭.૮.૧૪	260	250
	૦૮.૮.૧૪	260	260
	૦૯.૮.૧૪	260	260
	૧૦.૮.૧૪	260	260

પત્રક-૫

જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ આબોહવાક્ય વિસ્તાર બેત	<p>ચોમાસુ મગફળી</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ વાદળણાથા વાતાવરણના લીધે પાકમાં ઉગસુકનો રોગ જોવા મળે શકે છે તો તેના નિયંત્રણ માટે બીજ ને થાયરમ નો પટ આપવો અથવા જમીનમાં ૬ કીગ્રા/હે. ટ્રાઇકોડરમા પાવડરનો છંટકાવ કરવો. ❖ મગફળી પીળી પડી જાય તો ૧૦૦ ગ્રામ ફેરસ સલ્ફેટ અને ૧૦ ગ્રામ લીમ્બુના ફુલને ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળીને છંટકાવ કરવો. જરૂર પડે તો ૮ થી ૧૦ દિવસે ફરી છટકાવ કરવો. ❖ પાનના ટપકા (ટીકકા)નાં નિયંત્રણ માટે મગફળીના પાકમા કાર્બોનાઝિમ ૦.૦૨૫ (૫ ગ્રામ) અથવા મેન્કોઝેબ ૦.૨ % (૨૫ ગ્રામ) અથવા કરેથેલોનીલ ૦.૨ % (૨૫ ગ્રામ) ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી દવાનો છંટકાવ ૧૨ થી ૧૫ દિવસના અંતરે કરવો. ❖ અગામી પાચ દિવસમા મધ્યમ વરસાદની અગાહી હોવાથી આગામા દરમ્યાન પાકને રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ મુલતવી રાખવો. <p>કપાસ</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ વધારે પડતા વરસાદ ના કારણે કપાસના પાકમા પાણી ભરાઈ જતા પાક પીળો તેમજ સુકાઈ નહી તેના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઈડ ૩૦ ગ્રામ અને મેન્કોઝેબ ૨૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી ફ્રેચીંગ કરવુ. ❖ પાકમાં થીપ્સના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૧૦ મીલી અથવા થાઈમીથોકાઝમ ૮ ગ્રામ અને એસીફેટ ને ૨૦ ગ્રામ ને ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો. ❖ અગામી પાચ દિવસમા મધ્યમ વરસાદની અગાહી હોવાથી આગામા દરમ્યાન પાકને રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ મુલતવી રાખવો. ❖ ખુણીયા ટપકા રોગના નિયંત્રણ માટે સ્ટ્રીપ્ટોસાઇસ્લીન ૧ ગ્રામ અને કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઈડ ૩૫ થી ૪૦ ગ્રામ ને ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળીને છંટકાવ કરવો. <p>સોચાબીન</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ વાતાવરણમાં બેજ વધવાને કારણે લશકરી ઈયણનો ઉપદ્રવ ખુબ જોવા મળે છે. જેના નિયંત્રણ માટે સંકલીત જીવાત નિયંત્રણના પગલા લેવા. તેમજ ફેરેમેન ટ્રેપ, વર્ટીસેલીયમ લોહાટી કુગ વગેરેનો ઉપયોગ કરવો <p>શાકભાજુ</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ વાતાવરણમાં બેજ વધવાને કારણે કીટક અને રોગનું પ્રમાણ વધે નહી તેના માટે યોગ્ય કાળજી લેવી. <p>ટમેટા</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ સ્પોટેડ વીલ્ટ વાયરસના નિયંત્રણ માટે પાકની રોપણી પણી ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે ૫ ગ્રામ કાર્બોનાઝિમ (૫૦ % વે.પા.) ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી ને છાંટવુ જેથી રોગનું પ્રમાણ ઓછુ રહે છે અને ઉત્પાદન વધારે મળે છે.

	મરચા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ મરચામાં બુકીછારા માટે ૫ મીલી ટ્રાઇડીમોઝ (૮૦ % ઈ.સી.) ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી છંટકાવ કરવો અને જરૂર જણાય તો ફરીથી ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે બીજા છંટકાવ કરવા.
	પશુ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો. પશુઓને માખી અને મચ્છરથી બચાવવા માટે રહેવાની જગ્યા સ્વચ્છ કરવી તથા ચેપી રોગોથી પીડાતા પશુઓને જુદા બાંધવા તેમજ બીજા અન્ય રોગોથી જેવા કે કાળીયો તાવ, લેપટોસ્પાયરોસીસ અને દુધીયો તાવથી પીડાતા પશુઓને રક્ષણ મેળવવા માટે રોગ પ્રતિકારક રસીઓ સમયસર મુકાવવી

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date: 05-09-2014

(Period from 06 to 10 September -2014)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	84.4
Maximum temperature °C	28.0-32.2
Minimum temperature °C	23.2-24.2
RH % (Morning/Afternoon)	93-83
Wind speed (Kmph)	2.1-5.3
Cloud cover	5-8

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 10-09-2014

Parameters	Day-1 06-09-14	Day-2 07-09-14	Day-3 08-09-14	Day-4 09-09-14	Day-5 10-09-14
Rain fall (mm)	2	2	1	2	10
Maximum temperature °C	30	29	29	29	28
Minimum temperature °C	25	25	25	25	25
Cloud cover (Okta)	6	6	7	8	7
RH % (Morning/After noon)	86-79	87-77	86-76	87-78	87-79
Wind speed (Kmph)	026	021	021	023	025
Wind direction(Deg)	250	260	260	260	260

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Kharif Groundnut	Flowering /Pegging	<ul style="list-style-type: none"> • Due to cloudy whether condition, there is chance for the incidence of collar rot of groundnut, for the control of seed treatment and soil application with <i>Tricoderama</i> at 6 kg/ha. • For the control of yellowish of groundnut, spray 100 gm ferrous sulphate or 10 gm lemon flower in 10 liter of water at 8 to 10 days interval. • For the control of Tikka disease, spray Carbendenzim 0.025 (5ml) or Mencozeb 0.2 % (25gm) or Clorothelonil 0.2 % (25 gm) mix in 10 liter of water at spray 12 to 15 days interval. • Due to the forecasting of rainfall during next five days post pond the chemical application.
Cotton	Flowering/ Squaring	<ul style="list-style-type: none"> • For the control of thrips, Spray Imidacloprid 17.8 % 10 ml or Thiometoxam 8 gram or Acephate 20 gram in 10 liters of water. • For the control of angular leaf spot, spray Streptocyclin 1 gm and copper oxychloride 35 to 40 gmin 10 liter of water. • Due to the forecasting of rainfall during next five days post pond the chemical application.
Soybean	Flowering/ Podding	<ul style="list-style-type: none"> • Due to increase humidity condition there is a chance of heavy attack of <i>Helicoverpa armigera</i> sp. For the control of

		spray Dichlorvos 0.05 (5ml) or Fenitrothion 0.05 (10 ml) or Fozelon 0.07 (20 ml) in 10 liter of water at spray 15 days interval and Feromen trap or <i>Verticilium lacani</i> fungi use for the control of this pest.
Vegetable	Seedling/ Nursery	<ul style="list-style-type: none"> • There may be chances of pest/ disease infestation in vegetables due to increase in relative humidity so take appropriate precautions against them.
Tomato	Flowering	<ul style="list-style-type: none"> • Due to cloudy whether incidence of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.
Chilli	Flowering	<ul style="list-style-type: none"> • For the control of Altarnaria blight, spray spray Tridimorf (80 % EC) 5ml disolving in 10 liter of water.
Livestock	-	<ul style="list-style-type: none"> • Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. • Disease (like, Anthraces, milk fever and Brucellosis) infected animals to regular checkup and regular vaccination for the animal.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date : 05-09-2014

(Period from 06 to 10 September 2014)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 10-09-2014

Parameters	Day-1 06-09-14	Day-2 07-09-14	Day-3 08-09-14	Day-4 09-09-14	Day-5 10-09-14
Rain fall (mm)	1	2	2	2	3
Maximum temperature °C	30	30	29	29	29
Minimum temperature °C	27	27	26	27	27
Cloud cover (Okta)	5	7	7	8	7
RH % (Morning/After noon)	86-79	87-78	86-78	87-76	87-78
Wind speed (Kmph)	024	019	019	020	023
Wind direction(Deg)	250	250	260	260	260

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Kharif Groundnut	Flowering /Pegging	<ul style="list-style-type: none"> Due to cloudy whether condition, there is chance for the incidence of collar rot of groundnut, for the control of seed treatment and soil application with <i>Tricoderama</i> at 6 kg/ha. For the control of yellowish of groundnut, spray 100 gm ferrous sulphate or 10 gm lemon flower in 10 liter of water at 8 to 10 days interval. For the control of Tikka disease, spray Carbendenzim 0.025 (5ml) or Mencozeb 0.2 % (25gm) or Clorothelonil 0.2 % (25 gm) mix in 10 liter of water at spray 12 to 15 days interval. Due to the forecasting of rainfall during next five days post pond the chemical application.
Cotton	Flowering/ Squaring	<ul style="list-style-type: none"> For the control of thrips, Spray Imidacloprid 17.8 % 10 ml or Thiometoxam 8 gram or Acephate 20 gram in 10 liters of water. For the control of angular leaf spot, spray Streptocyclin 1 gm and copper oxychloride 35 to 40 gmin 10 liter of water. Due to the forecasting of rainfall during next five days post pond the chemical application.
Soybean	Flowering/ Podding	<ul style="list-style-type: none"> Due to increase humidity condition there is a chance of heavy attack of <i>Helicoverpa armigera</i> sp. For the control of spray Dichlorvos 0.05 (5ml) or Fenitrothion 0.05 (10 ml) or Fozelon 0.07 (20 ml) in 10 liter of water at spray 15 days interval and Feromen trap or <i>Verticillium lacani</i> fungi use for the control of this pest.
Vegetable	Seedling/ Nursery	<ul style="list-style-type: none"> There may be chances of pest/ disease infestation in vegetables due to increase in relative humidity so take appropriate precautions against them.

Tomato	Flowering	<ul style="list-style-type: none"> • Due to cloudy whether incidence of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.
Chilli	Flowering	<ul style="list-style-type: none"> • For the control of Altarnaria blight, spray spray Tridimorf (80 % EC) 5ml disolving in 10 liter of water.
Livestock	-	<ul style="list-style-type: none"> • Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. • Disease (like, Anthraces, milk fever and Brucellosis) infected animals to regular checkup and regular vaccination for the animal.