

**હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ  
તા. ૦૭-૦૨-૨૦૧૫ થી તા. ૧૧-૦૨-૨૦૧૫**

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

**હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૪**

**પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન**

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	૦૦.૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગે.)	૩૧.૭
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગે.)	૧૨.૮
ભેજ (%) (સવાર/ખપોરબાદ)	૭૫-૭૨
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૪.૭

**પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૧૧-૦૨-૧૫ સુધી)**

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૦૭.૦૨.૧૫	૦	૦
	૦૮.૦૨.૧૫	૦	૦
	૦૯.૦૨.૧૫	૦	૦
	૧૦.૦૨.૧૫	૦	૦
	૧૧.૦૨.૧૫	૦	૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૭.૦૨.૧૫	૩૧	૩૨
	૦૮.૦૨.૧૫	૩૧	૩૨
	૦૯.૦૨.૧૫	૩૨	૩૨
	૧૦.૦૨.૧૫	૩૨	૩૩
	૧૧.૦૨.૧૫	૩૨	૩૩
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૭.૦૨.૧૫	૧૮	૧૬
	૦૮.૦૨.૧૫	૧૮	૧૬
	૦૯.૦૨.૧૫	૧૮	૧૬
	૧૦.૦૨.૧૫	૧૯	૧૭
	૧૧.૦૨.૧૫	૧૯	૧૭
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો)	૦૭.૦૨.૧૫	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૦૮.૦૨.૧૫	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૦૯.૦૨.૧૫	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૧૦.૦૨.૧૫	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૧૧.૦૨.૧૫	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
મહત્વમાન લેજ (%)	૦૭.૦૨.૧૫	૪૧	૫૪
	૦૮.૦૨.૧૫	૭૦	૬૩
	૦૯.૦૨.૧૫	૪૭	૫૬
	૧૦.૦૨.૧૫	૪૭	૪૮
	૧૧.૦૨.૧૫	૪૨	૫૨
લઘુત્વમાન લેજ (%)	૦૭.૦૨.૧૫	૨૨	૪૦
	૦૮.૦૨.૧૫	૨૩	૩૮
	૦૯.૦૨.૧૫	૨૩	૩૫
	૧૦.૦૨.૧૫	૨૪	૩૮
	૧૧.૦૨.૧૫	૨૯	૪૧
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૦૭.૦૨.૧૫	૦૧૪	૦૧૭
	૦૮.૦૨.૧૫	૦૧૯	૦૨૫
	૦૯.૦૨.૧૫	૦૨૫	૦૩૦
	૧૦.૦૨.૧૫	૦૨૬	૦૨૮
	૧૧.૦૨.૧૫	૦૨૫	૦૨૮
પવનની દિશા (ડાયરી)	૦૭.૦૨.૧૫	૩૦૦	૩૩૦
	૦૮.૦૨.૧૫	૩૨૦	૩૫૦
	૦૯.૦૨.૧૫	૦૩૦	૦૩૦
	૧૦.૦૨.૧૫	૦૨૦	૦૫૦
	૧૧.૦૨.૧૫	૦૨૦	૦૫૦

## દક્ષિણ ખેત આબોહવાક્રિય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર ફૂષિ સલાહ)

પાકનું નામ	ફૂષિ સલાહ
ધર્મ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ધર્માં નિધલ અને પોક અવસ્થાએ અવશય પીયત આપવુ.</li> </ul>
ચણા	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ લીલી ઈયળ તથા લશકરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે એમામેક્ટીન બેંગોએટ ક.પ ગ્રામ અથવા ઇડોકાકાર્બ ૧૦ મીલી ૧૦ મીલી પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
લસણ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાન ની ટોચના સુકારા રોગના નિયંત્રણ માટે મેંકોજેબ દવા ૨૫ ગ્રામ ને ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ સમયસર નિદામણ કરવુ.</li> </ul>
ધાણા	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ સફેદમાખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળિનુ તેલ ૫૦ મીલી/ પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો જો વધારે ઉપદ્રવ જણાય તો એસીફેટ દવા ૧૫ ગ્રામ/૧૦ મીલી પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ પાકમાં ભુકીછારાના નિયંત્રણ માટે હેકાકોનાઝોલ ૧૫ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી લેળવીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ પાકમાં શ્રીપસના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ કપાસની છેલ્લી વીણી કરીને કરાઠીને કોઈ પણ સંજોગોમા સળગાવવી નહીં. કરાઠી ના રોટાવેટરની મદદથી નાના ટુકડા કરીને જમીનમા ભેળવી દેવા જેથી જમીનમા સેન્નીય તત્વોનો ઉમેરો થાય છે.</li> </ul>
જીરુ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ જીરુના પાકમાં ચરમીના રોગના નિયંત્રણ માટે મેંકોજેબ ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં લેળવી દર ૧૫ દિવસે ત્રણ છંટકાવ.</li> <li>❖ પાકમાં શ્રીપસના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ વાદળણાચા વાતાવરણમાં જીરુના પાકમાં ભુકીછારાના નિયંત્રણ માટે ૩૦૦ મેશ ગંધકની ભુકી હેક્ટરે ૧૫ કીલો પ્રમાણે બે છંટકાવ કરવા અથવા ૦.૦૦૫ % હેકાકોનાઝોલ ૧૦ ગ્રામ /૧૦ લિટર પાણીના દ્રાવણના ૨ થી ૩ છંટકાવ દાણા પરીપક્વ થાય ત્યા સુધી કરવા.</li> </ul>
રીંગણા	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાક એક થી દોઢ માસનો થાય ત્યારે ૫૦ % વે.પા. કાર્બોનાફીમ ૧૦ ગ્રામ અથવા ૭૫ % વે.પા. મેંકોજેબ ૨૫ ગ્રામ અથવા ૫૦ % તામ્બાયુક્ત દવા ૫૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી ત્રણ છંટકાવ કરવાથી પાનના ટપકા તથા ફળના સડાનો રોગનુ નિયંત્રણ કરી શકાય છે.</li> </ul>

<b>દિવેલા</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ઘોડીયા ઈચ્છળના નિયંત્રણ માટે કવીનાલફોસ ૨૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમા મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો</li> <li>❖ વધારે પડતા ભેજવાળા વાતાવરણના કારણે જોવા મળતા જીવાણું થી થતા પાનના ટપકા રોગના નિયંત્રણ માટે સ્ટ્રેટોમાઈસીન સલ્ફેટ ૧૦૦ મી.ગ્રા. અથવા પોષામાઈસીન ૨૫૦ મી.ગ્રા./ લીટર પાણીમાં લેળવી છોડ પર છંટકાવ કરવો. રોગની તીવ્રતા વધુ હોયતો બીજો છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
<b>ટમેટા</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ સ્પોટેડ વીલ્ટ વાયરસના નિયંત્રણ માટે પાકની રોપણી પછી ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે ૫ ગ્રામ કાર્બેન્ડાઝીમ (૫૦ % વે.પા.) ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી ને છાંટવું જેથી રોગનું પ્રમાણ ઓછું રહે છે અને ઉત્પાદન વધારે મળે છે.</li> </ul>
<b>આબો</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ મધ્યાના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાકલોપ્રીડ ૫ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી ૧૦ દીવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.</li> <li>❖ પાકમાં બુકીછારાના નિયંત્રણ માટે હેકાકોનાઓલ ૧૫ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી લેળવીને છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
<b>પશુ પાલન</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો.</li> <li>❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.</li> <li>❖ પશુઓને ઠંડી સામે રક્ષણ મેળવવા લીલા ધાસનું પ્રમાણ ઘટાડી સુકા ધાસનું પ્રમાણ વધારવું અને પશુઓને બંધ કોટમાં રાખવા.</li> </ul>

## JUNAGADH

**Phone: 0285-2670139**

**Date:- 06-02-2015**

**(Period from 07 to 11 February -2015)**

### **Significant weather for the preceding week**

<b>Rain fall (mm)</b>	000.0
<b>Maximum temperature °C</b>	30.4-33.2
<b>Minimum temperature °C</b>	10.6-14.0
<b>RH % (Morning/Afternoon)</b>	75-32
<b>Wind speed (Kmph)</b>	4.6-4.8
<b>Cloud cover</b>	0

### **Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 11-02-2015**

<b>Parameters</b>	<b>Day-1 07-02-15</b>	<b>Day-2 08-02-15</b>	<b>Day-3 09-02-15</b>	<b>Day-4 10-02-15</b>	<b>Day-5 11-02-15</b>
<b>Rain fall (mm)</b>	0	0	0	0	0
<b>Maximum temperature °C</b>	31	31	32	32	32
<b>Minimum temperature °C</b>	18	18	18	19	19
<b>Cloud cover (Okta)</b>	0	0	0	0	0
<b>RH % (Morning/After noon)</b>	41-22	70-23	47-23	47-26	42-29
<b>Wind speed (Kmph)</b>	014	019	025	026	025
<b>Wind direction(Deg)</b>	300	320	030	020	020

### **Agro meteorological Advisories**

<b>Crop</b>	<b>Stage</b>	<b>Agromet Advisories</b>
<b>Wheat</b>	<b>Grain filling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apply irrigation at critical stages of the crop.</li> </ul>
<b>Chickpea</b>	<b>Podding</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of pod borer spray Amamectin benzoate 6.5 gm or Indoxacarb 10 ml/10 liter of water.</li> </ul>
<b>Coriander</b>	<b>Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of white fly spray neem oil @ 50 ml/10 liter of water if infestation is more, spray acephate @ 15 gm/ 10 liter of water.</li> <li>For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol 15 ml in 10 liter of water.</li> </ul>
<b>Cumin</b>	<b>Growth/Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of blight, spray three spray of Mencozeb 27 gm/10 liter of water at 15 days interval.</li> <li>For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 liter of water.</li> <li>Due to cloudy weather condition during next three days, there is a chance of disease powdery mildew, two to three spray of Hexaconazol 0.005% (10 gm) in 10 liter of water.</li> </ul>

<b>Brinjal</b>	<b>Flowering/Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of fruit rot, three spray of 50 WP carbrndenzim 10 gm or 75 WP Mencozeb 25 gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.</li> </ul>
<b>Garlic</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Timely weeding operation should be carried out.</li> <li>For the control of white tip, spray Mencozeb 25 ml/10 liter of water.</li> <li>For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 liter of water.</li> </ul>
<b>Castor</b>	<b>Growth</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of semi lopper, spray quinalphos 20 ml in 10 liter of water.</li> <li>Due to highly humidity condition for the control of leaf spot, drenching of streptomycin sulphate 100 mg/liter water or poshamycin 250 mg/liter water for the plant.</li> </ul>
<b>Tomato</b>	<b>Flowering/Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes.</li> <li>Keep animals in shed to protect against cold.</li> </ul>

## PORBANDAR

**Phone : 0285-2670139**

**Date : 06-02-2015**

**(Period from 07 to 11 February -2015)**

**Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 11-02-2015**

Parameters	Day-1 07-02-15	Day-2 08-02-15	Day-3 09-02-15	Day-4 10-02-15	Day-5 11-02-15
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	32	32	32	33	33
Minimum temperature °C	16	16	16	17	17
Cloud cover (Okta)	0	0	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	54-40	63-38	56-35	48-38	52-41
Wind speed (Kmph)	017	025	035	028	028
Wind direction(Deg)	330	350	030	050	050

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
<b>Wheat</b>	<b>Grain filling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apply irrigation at critical stages of the crop.</li> </ul>
<b>Chickpea</b>	<b>Podding</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of pod borer spray Amamectin benzoate 6.5 gm or Indoxacarb 10 ml/10 liter of water.</li> </ul>
<b>Coriander</b>	<b>Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of white fly spray neem oil @ 50 ml/10 liter of water if infestation is more, spray acephate @ 15 gm/ 10 liter of water.</li> <li>For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol 15 ml in 10 liter of water.</li> </ul>
<b>Cumin</b>	<b>Growth/Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of blight, spray three spray of Mencozeb 27 gm/10 liter of water at 15 days interval.</li> <li>For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 liter of water.</li> <li>Due to cloudy weather condition during next three days, there is a chance of disease powdery mildew, two to three spray of Hexaconazol 0.005% (10 gm) in 10 liter of water.</li> </ul>
<b>Brinjal</b>	<b>Flowering/Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of fruit rot, three spray of 50 WP carbnendezim 10 gm or 75 WP Mencozeb 25 gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.</li> </ul>
<b>Garlic</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Timely weeding operation should be carried out.</li> <li>For the control of white tip, spray Mencozeb 25 ml/10 liter of water.</li> <li>For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 liter of water.</li> </ul>

<b>Castor</b>	<b>Growth</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of semi lopper, spray quinalphos 20 ml in 10 liter of water.</li> <li>Due to highly humidity condition for the control of leaf spot, drenching of streptomycin sulphate 100 mg/liter water or poshamycin 250 mg/liter water for the plant.</li> </ul>
<b>Tomato</b>	<b>Flowering/Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes.</li> <li>Keep animals in shed to protect against cold.</li> </ul>