



**ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા**  
**કૃષિ હવામાન સેલ, કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ**  
**જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી**  
**જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧**

ઈમેઇલ:-[amfujnd@yahoo.com](mailto:amfujnd@yahoo.com) ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૮



હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં જુનાગઢ જીલ્લા માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
(કૃષિ હવામાન સેલ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપદ્ધ)

(#આગાહી નો અમૃત મહોત્સવ#)

વાર:- મંગળવાર

તારીખ:- ૦૭/૦૨/૨૦૨૩

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૮૦ (૨૦૨૨-૨૩)

પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૦૨ થી ૦૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩)					હવામાન પરિબળો	હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૦૮ થી ૧૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩)				
૦૨/૦૨	૦૩/૦૨	૦૪/૦૨	૦૫/૦૨	૦૬/૦૨	તારીખ	૦૮/૦૨	૦૯/૦૨	૧૦/૦૨	૧૧/૦૨	૧૨/૦૨
૦	૦	૦	૦	૦	વરસાદ(મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦
૩૦.૫	૩૨.૮	૩૨.૦	૩૨.૨	૩૨.૮	મહત્વમાન (સે.ગ્રે)	૩૨	૩૪	૩૫	૩૫	૩૪
૧૨.૫	૧૨.૭	૧૧.૮	૧૧.૫	૧૭.૬	લઘુત્વમાન (સે.ગ્રે)	૨૦	૨૧	૨૦	૧૬	૨૦
ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	વાદળની સ્થિતિ	મોટેભાગે ચોખ્યું	મોટેભાગે ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું
૭૫	૭૪	૬૬	૭૦	૫૦	સવારના સેજના ટકા	૫૩	૨૯	૩૬	૫૬	૩૪
૨૬	૨૭	૨૩	૨૫	૩૪	બપોરબાદ ના સેજના ટકા	૨૩	૧૩	૧૨	૧૫	૨૦
૪.૪	૩.૫	૩.૨	૩.૪	૩.૭	પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૩.૬	૧૩.૦	૧૨.૫	૧૫.૬	૧૭.૩
૩૨૦	૩૪૦	૩૬૦	૩૪૦	૩૬૦	પવનની દિશા	૬૩	૨૬	૩૨૪	૩૧૫	૨૬૭

### સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં જુનાગઢ જીલ્લામાં આગામી તારીખ ૦૮/૦૨/૨૦૨૩ થી ૧૨/૦૨/૨૦૨૩ દરમયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં ચોખ્યું થી મોટેભાગે ચોખ્યું રહેશે, જીલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમયાન વરસાદની શક્યતાઓ નથી. પવનની ઝડપ ૧૨.૫ થી ૧૭.૩ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૩૨ થી ૩૫ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્વમાન ૧૬ થી ૨૧ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

- માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ જુનાગઢ જીવલામાં ૦૫ જાન્યુઆરી થી ૦૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩ નાં સમયગાળા દરમિયાન હળવી સૂકી સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.
- સાપ્તાહિક હવામાન આગાહીની સૂચી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનાં વિસ્તારોમાં તા. ૧૨/૦૨/૨૦૨૩ થી તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૩ દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય થી ઓછો અને મહત્વમાન & લધુતમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતાઓ છે.
- મેધદૂત એપ્લીકેશન:- કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારી મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો મેધદૂત એપ્લીકેશન કે જે ખેડૂતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.

મેધદૂત એપ્લીકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.



એન્ડ્રોઇડ(મોબાઈલ)ઉપયોગકર્તા: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

આઈ.ઓ.એસ.ઉપયોગકર્તા: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- શિયાળુ પાકોમાં નિયમિત સમયગાળે પાકમાં પિયત આપવું.
- આગોતું વાવેતર કરેલ શિયાળુંપાકોમાં દેહધાર્મિક પરિપક્વ અવસ્થાએ પાકની કાપણીની કામગીરી કરવી.
- ઉનાળું ઝતુમાં વાવેતર માટે ખેડૂતોને સારી ગુણવત્તા અને વધારે ઉત્પાદન આપતી જાતોનાં પ્રમાણિત ઉનાળું પાકોનાં બીજની પસંદગી કરીને મેળવી લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
- ખેડૂતમિત્રોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે આગામી ઉનાળું પાકોનાં વાવેતર માટે ખેતરમાં ખેડ કરીને વાવેતર માટે તૈયાર કરવું.
- આગામી ઉનાળું પાકોનાં વાવેતર માટે સારી ગુણવત્તા અને વધારે ઉત્પાદન આપતી જાતોના પ્રમાણિત બીજ, દવા અને ખાતરની પસંદગી કરીને મેળવી લેવું.

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 04  
(22.01.2023 to 28.01.2023) over Agricultural region

Gujarat



Bare soil, rocks clouds, rain, snow, etc.

Moderate

Good

Very good

Agriculture vigour is good over few places of the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/ જાત	કૃષિ સલાહ
ઉનાળું મગફળી	જમીન તૈયારી / વાવેતર	જીજુ-૨, જીજુ-૩૧, ટીજુ-૩૭, ટીએજુ- ૨૪	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ઉનાળું મગફળીના પાકને હેકટરે ૨૫ કિ.ગ્રા નાઇટ્રોજન અને ૫૦ કિ.ગ્રા ફોસ્ફરસ ખાતર તરીકે વાવણી વખતે ચાસમાં ઓરીને આપવા.</li> <li>❖ પાકનાં વાવેતર માટે દિવસ અને રાત્રિનાં તાપમાનમાં તફાવત ૨૨: થી ૨૫: સેલ્બ્સિયસ થાય ત્યારે કરવું.</li> <li>❖ મગફળીના પાકમાં રાસાયણિક નિદામણનાશક ૦.૬ કી.ગ્રા./હે. પેન્ડીમીથેલીન ૫૦૦ લીટર પાણીમાં લેળવી વાવેતર બાદ તુરેતજ છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
ઘઉં	કૃષિયા દાણા અવસ્થા	ઉધઈ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ઘઉંના ઉભા પાકમાં ઉધઈનો ઉપક્રમ શરૂ થતો જણાય તો તુરત જ એક હેકટર પાકના વિસ્તાર માટે ફીપ્રોનિલ ૫ એસસી ૧.૬ લિટર અથવા કલોરપાયરીઝોસ ૨૦ ઈસી ૧.૫ લિટર ૧૦૦ કિ.ગ્રા. રેતી સાથે બરાબર લેળવી માવજત આપેલ રેતી ઘઉનાં ઉભા પાકમાં પૂરવી અને ત્યારબાદ પાકને હળવું પિયત આપવું.</li> <li>❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ પાકની પરિપક્વ અવસ્થાએ પિયત મોક્કફ રાખવું. વધારે પિયત આપવાથી દાણાની ગુણવત્તા ઓછી થાય છે.</li> </ul>
ચણા	દાણા અવસ્થા	શીંગ ખાનાર ઈચ્છા, પાનનો સુકારો	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ શીંગ કોરી ખાનાર ઈચ્છાની પાકનાં સમયગાળા દરમિયાન સમયસર મોજણી કરવી.</li> <li>❖ ચણાનાં ઉભા પાકમાં પાનનાં સુકારાનાં નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ ચણાનાં પાકમાં લીલી અને લશકરી ઈચ્છાનાં નિયંત્રણ માટે ૬ ગ્રામ એમામેકટીન બેન્ઝોયેટ અથવા ૨૦ મીલી ક્વીનાલઝોસ ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવાથી સારુ પરીણામ મળે છે.</li> </ul>
ધાણા	દાણા બંધાવા	મોલો	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ મોલોનાં પરિક્ષણ માટે પીળા ચીકણા પીંજર પ્રતિ હેકટેરે ૧૦ પ્રમાણે ગોઠવવા.</li> <li>❖ દાળિયા, સીરફીડ માખીના કીડા અને કાયસોપલી નામના પરલક્ષી કીટકો કુદરતી રીતે મોલોનું લક્ષણ કરતા હોય છે આથી આવા ઉપયોગી પરલક્ષીઓની વસ્તી વધારે હોય ત્યારે ઊરી દવાઓના છંટકાવ ટાળવા જોઈએ.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ મોલોના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીંબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્ક નું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને એસીફેટ ૧૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ ધાણામાં ભુકીછારાનાં નિયંત્રણ માટે ૧૫ મીલી હેકાકોનાઝોલ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી ૧૦-૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા.</li> </ul>
લસણ	ગાંધીયા વિકાસ	ચુસીયા જીવાત	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એક્સરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ ચુસીયા જીવાતના અસરકારક નિયંત્રણ માટે બ્યુવેરીયા બાઝીયાના ૧.૧૫ વે.પા. નો પ્રથમ છંટકાવ જીવાત દેખાય ત્યારે ૦.૦૦૩૫% (૩૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં), બીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) અને ત્રીજો ૦.૦૦૯ ટકા (૮૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) ૧૦ દિવસના અંતરે કરવા.</li> <li>❖ ચુસીયા જીવાતના રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૩૦ ઇ.સી. ૧૦ મિ.લી. અથવા કવીનાલ્ફોસ ૨૫ ઇ.સી. ૨૦ મિ.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી દવાની અસરકારકતા વધારવા તેમાં સ્ટીકર ઉમેરી દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
૪૩	દાણા અવસ્થા	ચુસીયા જીવાત	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એક્સરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ શ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે બ્યુવેરીયા બાસીયાના ૧.૧૫ વે.પા. (ન્યુનતમ ૨ થી ૧૦૬ સીએફ્યું/ગ્રામ) ૦.૦૦૭% (૬૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી)નો છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
તુવેર	શિંગ વિકાસ / પરિપક્વતા	શિંગકોરી ખાનાર ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું.</li> <li>❖ પાકમાં શિંગો કોરી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૪૫ એસ.એલ સ્પિનોસાડ ૩ મીલી અથવા કલોરાન્ડ્રાનિલીપોલ ૩ મીલી અથવા ફલુબેન્ડીયામાઈડ ૨ મીલી દવા ને ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી બે છંટકાવ કરવા.</li> <li>❖ તુવેરના પાકમાં દેહધાર્મિક પરિપક્વ અવસ્થાએ પાકની કાપણી કરવી.</li> </ul>
એરંડા	ગળ વિકાસ	ઘોડિયા ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું.</li> <li>❖ એરંડામાં ઘોડિયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૨૦ મીલી કવીનાલ્ફોસ (૧.૫ % ભુકી) અથવા ૪૦ ગ્રામ કાર્બોરીલ ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
આંબા	ફૂલ / ફળ અવસ્થા	મધીયા, ભુકીછારા	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ આબાંમાં મધીયાનાં નિયંત્રણ માટે ૫૦ % કાર્બોરીલ ૪૦ ગ્રામ પાવડર અથવા ૩૬ % ઇ.સી. મોનોકોટોફોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લી.પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>આબાંમાં ભુકીછારાનાં નિયંત્રણ માટે ૧૦ લી. પાણીમાં ૩૦ ગ્રામ ક્રાવ્ય ગંધક + કેરેથોન ૪૮ % ઈ.સી. ૧૦ મીલી દવાનો છંટકાવ કરવો.</li> <li>કેરી સોપારી જેવડા કદની થાય એટલે ૨૦ પી.પી.ઓ.મ. એન.એ.ઓ. અને ૨% યુરીયા ના ક્રાવણાનો છંટકાવ કરવાથી કેરી ખરતી અટકે છે અને ફળના કદમાં વધારો થાય છે.</li> </ul>
શાકભાજુ	વૃદ્ધી / કુલ / ફળ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>આ સમયગાળા દરમિયાન દવા છંટકાવની કામગીરી કરવી.</li> <li>પાકમાં હાથથી નિદામણ અને આંતરખેડની કામગીરી કરવી.</li> <li>શાકભાજુ પાકોને સમયસર પીયત આપવુ.</li> <li>શાકભાજુના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવુ અને નિયમીત પિયત આપવુ. શાકભાજુ ને સમયસર ઉતારી ગેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા.</li> </ul>
પશુપાલન	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો &amp; પીવા માટે ચોખ્યું હુંફાળું ગરમ પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્યા રાખવા.</li> <li>માખી મર્યાદથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવુ.</li> <li>પશુઓને યોગ્ય આહારમાં ખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ.</li> <li>ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો.</li> <li>પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.</li> <li>ફુંધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઇડ અથલા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.</li> </ul>



**ગ્રામીણકૃષિ મૌસમ સેવા**  
**કૃષિ હવામાન સેલ, કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ**  
**જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી**  
**જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧**

ઈમેઇલ:- [amfujind@yahoo.com](mailto:amfujind@yahoo.com) ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૮



હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં પોરબંદર જીલ્લા માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
(કૃષિ હવામાન સેલ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપદ)

(#આજાદી નોઅમૃત મહોત્સવ#)

વાર:- મંગળવાર

તારીખ: ૦૭/૦૨/૨૦૨૩

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૬૦ (૨૦૨૨-૨૩)

<b>પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન</b> (તારીખ:- ૦૨ થી ૦૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩)	<b>હવામાન પરિબળો</b>	<b>હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે</b> (તારીખ:- ૦૮ થી ૧૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩) માન્ય ૧૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩. સવારના ૮:૩૦ વાગ્યા સુધી
--	----------------------	---


૦૨/૦૨	૦૩/૦૨	૦૪/૦૨	૦૫/૦૨	૦૬/૦૨	તારીખ	૦૮/૦૨	૦૯/૦૨	૧૦/૦૨	૧૧/૦૨	૧૨/૦૨
૦	૦	૦	૦	૦	વરસાદ(મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦
૩૦.૦	૨૮.૬	૩૨.૫	૩૨.૪	૩૨.૨	મહત્વમાન તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૩૨	૩૪	૩૪	૩૨	૩૨
૧૮.૦	૧૩.૪	-	૧૨.૨	૧૬.૦	લઘુત્વમાન (°સે.ગ્રે)	૧૬	૧૭	૧૫	૧૫	૧૭
ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	વાદળની સ્થિતિ	મોટેભાગે ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું
૩૨	૭૦	-	૬૮	૬૪	સવારના લેજના ટકા	૪૬	૩૨	૫૬	૭૫	૪૮
૨૨	૪૦	૩૩	૩૩	૩૫	અપોરબાદ ના લેજના ટકા	૩૨	૨૨	૨૨	૩૨	૩૩
૧૪.૮	-	૧૮.૫	-	-	પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૩.૬	૧૩.૦	૧૨.૫	૧૫.૬	૧૭.૩
૭૦	-	૨૬	-	-	પવનની દિશા	૬૩	૨૬	૩૨૪	૩૧૫	૨૯૭

## સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર પેત આબોહવાકીય વિસ્તારના પોરબંદર જીવલામાં આગામી તારીખ ૦૮/૦૨/૨૦૨૩ થી ૧૨/૦૨/૨૦૨૩ દરમયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં ચોખ્યું થી મોટેભાગે ચોખ્યું રહેશે, જીવલામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નથી. પવનની ઝડપ ૧૨.૫ થી ૧૭.૩ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૩૨ થી ૩૪ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્વમાન ૧૫ થી ૧૭ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

- + માન્ય વરસાદની સૂરી મુજબ પોરબંદર જીવલામાં ૦૫ જાન્યુઆરી થી ૦૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩ નાં સમયગાળા દરમિયાન હળવી સૂકી સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.
- + સાપ્તાહિક હવામાન આગાહીની સૂરી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનાં વિસ્તારોમાં તા. ૧૨/૦૨/૨૦૨૩ થી તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૩ દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય થી ઓછો અને મહત્વમાન તાપમાન & લઘુત્વમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતાઓ છે.
- + **મેધ્દૂત એપ્લીકેશન:** કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારી મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો મેધ્દૂત એપ્લીકેશન કે જે એફોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.  
મેધ્દૂત એપ્લીકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.  
એન્ડ્રોઇડ(મોબાઇલ)ઉપયોગકર્તા: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>  
આઈ.ઓ.એસ.ઉપયોગકર્તા: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ શિયાળુ પાકોમાં નિયમિત સમયગાળે પાકમાં પિયત આપવું.
- ❖ આગોતરું વાવેતર કરેલ શિયાળુંપાકોમાં દેહધાર્મિક પરિપક્વ અવસ્થાએ પાકની કાપણીની કામગીરી કરવી.
- ❖ ઉનાળું ઋતુમાં વાવેતર માટે જેડુતોને સારી ગુણવત્તા અને વધારે ઉત્પાદન આપતી જતોનાં પ્રમાણિત ઉનાળું પાકોનાં બીજની પસંદગી કરીને મેળવી લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
- ❖ આગામી ઉનાળું પાકોનાં વાવેતર માટે સારી ગુણવત્તા અને વધારે ઉત્પાદન આપતી જતોના પ્રમાણિત બીજ,
- દવા અને ખાતરની પસંદગી કરીને મેળવી લેવું.
- ❖ ઝેડુતમિત્રોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે આગામી ઉનાળું પાકોનાં વાવેતર માટે ઝેતરમાં ઝેડ કરીને વાવેતર માટે તૈયાર કરવું.



પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/ જાત	કૃષિ સલાહ
ઉનાળું મગફળી	જમીન તૈયારી / વાવેતર	જુજુ-૨, જુજેજુ- ૩૧, ટીજુ-૩૭, ટીચેજુ-૨૪	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ઉનાળું મગફળીના પાકને હેક્ટરે ૨૫ કિ.ગ્રા નાઇટ્રોજન અને ૫૦ કિ.ગ્રા ફોસ્ફરસ ખાતર તરીકે વાવણી વખતે ચાસમાં ઓરીને આપવા.</li> <li>❖ પાકનાં વાવેતર માટે દિવસ અને રાત્રિનાં તાપમાનમાં તફાવત ૨૨: થી ૨૫: સેલ્બિયસ થાય ત્યારે કરવું.</li> <li>❖ મગફળીના પાકમાં રાસાયણિક નિદામણનાશક ૦.૬ કી.ગ્રા./હે. પેનીમીથેલીન ૫૦૦ લીટર પાણીમાં લેળવી વાવેતર બાદ તુરંતજ છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
ઘઉં	કુદિયા દાણા અવસ્થા	ઉઘઈ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ઘઉંના ઉભા પાકમાં ઉધઈનો ઉપક્રમ શરૂ થતો જણાય તો તુરત ૪ એક હેક્ટર પાકના વિસ્તાર માટે ફીપ્રોનિલ ૫ એસસી ૧.૬ લિટર અથવા કલોરપાયરીફ્લોસ ૨૦ ઇસી ૧.૫ લિટર ૧૦૦ કિ.ગ્રા.રેતી સાથે</li> </ul>

			<p>બરાબર લેળવી માવજત આપેલ રેતી ઘઉનાં ઉભા પાકમાં પૂરવી અને ત્યારબાદ પાકને હળવું પિયત આપવું.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ પાકની પરિપક્વ અવસ્થાએ પિયત મોક્ક રાખવું. વધારે પિયત આપવાથી દાણાની ગુણવત્તા ઓછી થાય છે.</li> </ul>
ચણા	દાણા અવસ્થા	શીંગ ખાનાર ઈયળ, પાનનો સુકારો	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળની પાકનાં સમયગાળા દરમિયાન સમયસર મોજણી કરવી.</li> <li>❖ ચણાનાં ઉભા પાકમાં પાનનાં સુકારાનાં નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ ચણાના પાકમાં લીલી અને લશકરી ઈયળના નિયત્રણ માટે ૬ ગ્રામ એમામેક્ટીન બેન્જોયેટ અથવા ૨૦ મીલી કવીનાલફોસ ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવાથી સારુ પરીણામ મળે છે.</li> </ul>
ધાણા	દાણા બંધાવા	મોલો	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ મોલોનાં પરિક્ષણ માટે પીળા ચીકણા પીંજર પ્રતિ ફેક્ટરે ૧૦ પ્રમાણે ગોઠવવા.</li> <li>❖ દાળિયા, સીરફીડ માખીના કીડા અને કાયસોપલ્લા નામના પરભક્ષી કીટકો કુદરતી રીતે મોલોનું ભક્ષણ કરતા હોય છે આથી આવા ઉપયોગી પરભક્ષીઓની વસ્તી વધારે હોય ત્યારે ઝેરી દવાઓના છંટકાવ ટાળવા જોઈએ.</li> <li>❖ મોલોના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીંબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્ક નું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને એસીફેટ ૧૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ ધાણામાં ભુકીછારાનાં નિયંત્રણ માટે ૧૫ મીલી ફેક્ઝાકોનાઝોલ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી ૧૦-૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા.</li> </ul>
લસણ	ગાંઢીયા વિકાસ	ચુસીયા જીવાત	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ ચુસીયા જીવાતના અસરકારક નિયંત્રણ માટે બ્યુવેરીયા બાઝીયાના ૧.૧૫ વે.પા. નો પ્રથમ છંટકાવ જીવાત દેખાય ત્યારે ૦.૦૦૩૫% (૩૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં), બીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) અને ત્રીજો ૦.૦૦૯ ટકા (૮૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) ૧૦ દિવસના અંતરે કરવા.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ચુસીયા જીવાતના રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ 30 ઇ.સી. 10 મિ.લી. અથવા કવીનાલફોસ 25 ઇ.સી. 20 મિ.લી. દવા 10 લીટર પાણીમાં ભેળવી દવાની અસરકારકતા વધારવા તેમાં સ્ટીકર ઉમેરી દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
જીરુ	દાણા અવસ્થા	ચુસીયા જીવાત	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ શ્રીપસના નિયંત્રણ માટે બ્યુવેરીયા બાસીયાના ૧.૧૫ વે.પા. (ન્યુનતમ ૨ ૧ ૧૦૬ સીએફ્ક્યું/ગ્રામ) ૦.૦૦૭% (૬૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી)નો છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
તુવેર	શિંગ વિકાસ / પરિપક્વતા	શિંગકોરી ખાનાર ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું.</li> <li>❖ પાકમાં શિંગો કોરી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૪૫ એસ.એલ સ્પિનોસાડ ૩ મીલી અથવા કલોરાન્ડાનિલીપોલ ૩ મીલી અથવા ફલુબેન્ડીયામાઇડ ૨ મીલી દવા ને ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી બે છંટકાવ કરવા.</li> <li>❖ તુવેરના પાકમાં દેહધાર્મિક પરિપક્વ અવસ્થાએ પાકની કાપણી કરવી.</li> </ul>
એરેંડા	ગળ વિકાસ	ઘોડિયા ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું.</li> <li>❖ એરેંડામાં ઘોડીયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૨૦ મીલી કવીનાલફોસ (૧.૫% બુકી) અથવા ૪૦ ગ્રામ કાર્બોરીલ ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
આંબા	ફૂલ / ફળ અવસ્થા	મધીયા, લુકીધારા	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ આબાંમાં મધીયાનાં નિયંત્રણ માટે ૫૦ % કાર્બોરીલ ૪૦ ગ્રામ પાવડર અથવા ૩૬ % ઇ.સી. મોનોક્રોટોફોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લી.પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ આબાંમાં લુકીધારાનાં નિયંત્રણ માટે ૧૦ લી. પાણીમાં ૩૦ ગ્રામ ક્રાંત્ય ગંધક + કેરેથોન ૪૮ % ઇ.સી. ૧૦ મીલી દવાનો છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ કેરી સોપારી જીવદા કદની થાય એટલે ૨૦ પી.પી.એમ. એન.એ.એ. અને ૨% યુરીયા ના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવાથી કેરી ખરતી અટકે છે અને ફળના કદમાં વધારો થાય છે.</li> </ul>

શાકભાજુ	વૃધ્ધી / કુલ / ફળ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>આ સમયગાળા દરમિયાન દવા છંટકાવની કામગીરી કરવી.</li> <li>પાકમાં હાથથી નિદામણ અને આંતરએડની કામગીરી કરવી.</li> <li>શાકભાજુ પાકોને સમયસર પીયત આપવુ.</li> <li>શાકભાજુના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવુ અને નિયમીત પિયત આપવુ. શાકભાજુ ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડિંગ કરી બજારમાં મુકવા.</li> </ul>
પશુપાલન	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો &amp; પીવા માટે ચોખ્યું હુંકારું ગરમ પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્યા રાખવા.</li> <li>માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવુ.</li> <li>પશુઓને યોગ્ય આહારમાંખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ.</li> <li>ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો.</li> <li>પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.</li> <li>દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઇડ અથલા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.</li> </ul>



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસુમ સેવા  
કૃષિ હવામાન સેલ, કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ  
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી  
જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ઈમેઇલ:- [amfujnd@yahoo.com](mailto:amfujnd@yahoo.com) ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૮



હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં ગીર સોમનાથ જીલ્લા માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન

(કૃષિ હવામાન સેલ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપદન)

(#આગાહી નોંધમૂત મહોત્સવ#)

વાર:- મંગળવાર

તારીખ:- ૦૭/૦૨/૨૦૨૩

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૬૦ (૨૦૨૨-૨૩)

પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૦૨ થી ૦૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩)					હવામાન પરિબળો		હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૦૮ થી ૧૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩)				
૦૨/૦૨	૦૩/૦૨	૦૪/૦૨	૦૫/૦૨	૦૬/૦૨	તારીખ	૦૮/૦૨	૦૯/૦૨	૧૦/૦૨	૧૧/૦૨	૧૨/૦૨	
૦	૦	૦	૦	૦	વરસાદ(મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦	
૩૧.૪	૩૨.૬	૩૨.૭	૩૧.૬	૩૨.૨	મહત્વમાન તાપમાન (°સે.ગ્રે.)	૩૦	૩૨	૩૨	૩૧	૩૧	


૧૯.૪	૧૯.૧	-	૧૫.૨	૧૮.૨	લઘુતમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૧૮	૧૯	૧૮	૧૭	૧૮
ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	વાદળની સ્થિતિ	મોટેબાગે ચોખ્યું	મોટેબાગે ચોખ્યું	મોટેબાગે ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું
૪૪	૭૦	-	૬૭	૬૬	સવારના લેજના ટકા	૭૧	૪૦	૩૮	૫૫	૫૧
૩૧	૪૨	૬૬	૬૫	૬૪	બપોરબાદ ના લેજના ટકા	૩૧	૧૬	૧૬	૨૨	૨૬
૫.૬	૩.૭	૩.૭	-	-	પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૨.૪	૧૦.૭	૧૨.૨	૧૫.૧	૧૬.૨
૨૦	૪૦	૨૦	-	-	પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૨૨	૩૦	૩૦૦	૩૦૪	૨૨

## સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના ગીર સોમનાથ જીલ્લામાં આગામી તારીખ ૦૮/૦૨/૨૦૨૩ થી ૧૨/૦૨/૨૦૨૩ દરમયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં ચોખ્યું થી મોટેબાગે ચોખ્યું રહેશે, જીલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમયાન વરસાદ ની શક્યતાઓ નથી. પવનની ઝડપ ૧૦.૭ થી ૧૬.૨ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૩૦ થી ૩૨ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુતમ તાપમાન ૧૭ થી ૧૯ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

- + માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ ગીર સોમનાથ જીલ્લામાં ૦૫ જાન્યુઆરી થી ૦૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩ નાં સમયગાળા દરમયાન હળવી સૂકી સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.
  - + સાપ્તાહિક હવામાન આગાહીની સૂચી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં તા. ૧૨/૦૨/૨૦૨૩ થી તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૩ દરમયાન વરસાદ સામાન્ય થી ઓછો અને મહત્વમાન તાપમાન & લઘુતમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતાઓ છે.
  - + મેધ્દૂત એપ્લીકેશન:- કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારી મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો મેધ્દૂત એપ્લીકેશન કે જે ખેડૂતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.
- મેધ્દૂત એપ્લીકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.
- એન્ડ્રોઇડ(મોબાઈલ)ઉપયોગકર્તા: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>
- આઈ.ઓ.એસ.ઉપયોગકર્તા: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ શિયાળુ પાકોમાં નિયમિત સમયગાળે પાકમાં પિયત આપવું.
- ❖ આગોતરું વાવેતર કરેલ શિયાળુપાકોમાં દેહધાર્મિક પરિપક્વ અવસ્થાએ પાકની કાપણીની કામગીરી કરવી.
- ❖ ઉનાળું ઋતુમાં વાવેતર માટે જેડુતોને સારી ગુણવત્તા અને વધારે ઉત્પાદન આપતી જાતોનાં પ્રમાણિત ઉનાળું પાકોનાં બીજની પસંદગી કરીને મેળવી લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
- ❖ આગામી ઉનાળું પાકોનાં વાવેતર માટે સારી ગુણવત્તા અને વધારે ઉત્પાદન આપતી જાતોના પ્રમાણિત બીજ, દવા અને ખાતરની પસંદગી કરીને મેળવી લેવું.
- ❖ ઝેદૂતમિત્રોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે આગામી ઉનાળું પાકોનાં વાવેતર માટે જેતરમાં ઝેડ કરીને વાવેતર માટે તૈયાર કરવું.



પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ/ઝીવાત/જાત	કૃષિ સલાહ
ઉનાળું મગફળી	જમીન તૈયારી / વાવેતર	જીજુ-૨, જીજુ-૩૧, ટીજી-૩૭, ટીએજી-૨૪	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ઉનાળું મગફળીના પાકને હેકટરે ૨૫ ક્રિ.ગ્રા નાઇટ્રોજન અને ૫૦ ક્રિ.ગ્રા ફોસ્ફરસ ખાતર તરીકે વાવણી વખતે ચાસમાં ઓરીને આપવા.</li> <li>❖ પાકનાં વાવેતર માટે દિવસ અને રાત્રિનાં તાપમાનમાં તફાવત ૨૧: થી ૨૫: સેલ્સિયસ થાય ત્યારે કરવું.</li> <li>❖ મગફળીના પાકમાં રાસાયણિક નિદામણનાશક ૦.૬ ક્રિ.ગ્રા./હે. પેન્ડીમીથેલીન ૫૦૦ લીટર પાણીમાં લેળવી વાવેતર બાદ તુરેતજ છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
ઘઉં	કૃષિયા દાણા અવસ્થા	ઉધઈ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ઘઉંના ઊભા પાકમાં ઉધઈનો ઉપક્રમ શરૂ થતો જણાય તો તુરત ૪ એક હેકટર પાકના વિસ્તાર માટે ફીપ્રોનિલ ૫ એસસી ૧.૬ લિટર અથવા કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૧.૫ લિટર ૧૦૦ ક્રિ.ગ્રા. રેતી સાથે</li> </ul>

			<p>બરાબર લેળવી માવજત આપેલ રેતી ઘઉનાં ઉભા પાકમાં પૂરવી અને ત્યારબાદ પાકને હળવું પિયત આપવું.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ પાકની પરિપક્વ અવસ્થાએ પિયત મોક્ક રાખવું. વધારે પિયત આપવાથી દાણાની ગુણવત્તા ઓછી થાય છે.</li> </ul>
ચણા	દાણા અવસ્થા	શીંગ ખાનાર ઈયળ, પાનનો સુકારો	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળની પાકનાં સમયગાળા દરમિયાન સમયસર મોજણી કરવી.</li> <li>❖ ચણાનાં ઉભા પાકમાં પાનનાં સુકારાનાં નિયંત્રણ માટે મેન્ડોઝેબ ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ ચણાના પાકમાં લીલી અને લશકરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૬ ગ્રામ એમારેક્ટીન બેન્ડોયેટ અથવા ૨૦ મીલી ક્વીનાલફોસ ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવાથી સારુ પરીણામ મળે છે.</li> </ul>
ધાણા	દાણા બંધાવા	મોલો	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ મોલોનાં પરિક્ષણ માટે પીળા ચીકણા પીંજર પ્રતિ હેકટેરે ૧૦ પ્રમાણે ગોઠવવા.</li> <li>❖ દાળિયા, સીરફીડ માખીના કીડા અને કાયસોપલરી નામના પરબક્ષી કીટકો કુદરતી રીતે મોલોનું ભક્ષણ કરતા હોય છે આથી આવા ઉપયોગી પરબક્ષીઓની વસ્તી વધારે હોય ત્યારે ઝેરી દવાઓના છંટકાવ ટાજવા જોઈએ.</li> <li>❖ મોલોના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્ક નું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને એસીફેટ ૧૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ ધાણામાં બુકીછારાનાં નિયંત્રણ માટે ૧૫ મીલી હેકાકોનાઝોલ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી ૧૦-૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા.</li> </ul>
લસણ	ગાંઢીયા વિકાસ	ચુસીયા જીવાત	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને એકસરખાં સમયગાળામાં પીયત આપવું.</li> <li>❖ ચુસીયા જીવાતના અસરકારક નિયંત્રણ માટે બ્યુવેરીયા બાઝીયાના ૧.૧૫ વે.પા. નો પ્રથમ છંટકાવ જીવાત દેખાય ત્યારે ૦.૦૦૩૫% (૩૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં), બીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) અને ત્રીજો ૦.૦૦૯ ટકા (૮૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) ૧૦ દિવસના અંતરે કરવા.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ચુસીયા જીવાતના રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ 30 ઈ.સી. 10 મિ.લી. અથવા કવીનાલફોસ 25 ઈ.સી. 20 મિ.લી. દવા 10 લીટર પાણીમાં ભેળવી દવાની અસરકારકતા વધારવા તેમાં સ્ટીકર ઉમેરી દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
તુવેર	શિંગ વિકાસ / પરિપક્વતા	શિંગકોરી ખાનાર ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું.</li> <li>❖ પાકમાં શિંગો કોરી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે 45 એસ.એલ સ્પિનોસાડ 3 મીલી અથવા કલોરાન્ડાનિલીપોલ 3 મીલી અથવા ફલુબેન્ડીયામાઈડ 2 મીલી દવા ને 10 લીટર પાણીમાં ભેળવી બે છંટકાવ કરવા.</li> <li>❖ તુવેરના પાકમાં દેહધાર્મિક પરિપક્વ અવસ્થાએ પાકની કાપણી કરવી.</li> </ul>
એરંડા	ગળ વિકાસ	ચુસીયા જીવાત, ઘોડિયા ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું.</li> <li>❖ એરંડામાં ઘોડીયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે 20 મીલી કવીનાલફોસ ( 1.5 % બુકી) અથવા 40 ગ્રામ કાર્બોરીલ 10 લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
આંબા	કૂલ / ફળ અવસ્થા	મધીયા, બુકીધારા	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ આબાંમાં મધીયાનાં નિયંત્રણ માટે 40 % કાર્બોરીલ 40 ગ્રામ પાવડર અથવા 35 % ઈ.સી. મોનોકોટોફોસ 10 મીલી દવા 10 લી.પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ આબાંમાં બુકીધારાનાં નિયંત્રણ માટે 10 લી. પાણીમાં 30 ગ્રામ દ્રાવ્ય ગંધક + કેરેથોન 48 % ઈ.સી. 10 મીલી દવાનો છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ કેરી સોપારી જેવડા કદની થાય એટલે 20 પી.પી.એમ. એન.એ.એ. અને 2% ચુસીયા ના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવાથી કેરી ભરતી અટકે છે અને ફળના કદમાં વધારો થાય છે.</li> </ul>
શાકભાજુ	વૃદ્ધી / કૂલ / ફળ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ આ સમયગાળા દરમિયાન દવા છંટકાવની કામગીરી કરવી.</li> <li>❖ પાકમાં હાથથી નિંદામણની કામગીરી કરવી.</li> <li>❖ શાકભાજુ પાકોને સમયસર પીયત આપવું.</li> <li>❖ શાકભાજુના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવું અને નિયમીત પિયત આપવું. શાકભાજુ ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડિંગ કરી બજારમાં મુકવા.</li> </ul>
પશુપાલન	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો &amp; પીવા માટે ચોખ્યું હુંકારું ગરમ પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્યા રાખવા.</li> <li>❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવું.</li> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાં ખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગૃહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગૃહિત કરવો જોઈએ.</li> </ul>

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો.</li> <li>❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઇ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.</li> <li>❖ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથલા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.</li> </ul> |
|--|--|--|--|

યાંત્રિક અધિકારી  
ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા  
જુ.કૃ.યુ.

**Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)**  
**Agro meteorological Cell**  
**Department of Agronomy**  
**Junagadh Agricultural University**  
**Junagadh-362001**

E-mail: [amfujind@yahoo.com](mailto:amfujind@yahoo.com) Phone: 0285-2670139



Agromet Advisory Service Bulletin for Junagadh District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone

(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

(#AZADI KA AMRIT MAHOTSAV#)

Day:- Tuesday

Date: 07-02-2023

Agromet Advisory Service bulletin. No:- 090 (2022-23)

Observed Weather during last Five days (Dated 02 <sup>nd</sup> to 06 <sup>th</sup> February, 2023)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 08 <sup>th</sup> to 12 <sup>th</sup> February, 2023) until 08:30 hrs of 12-02-2023				
02/02	03/02	04/02	05/02	06/02	Date	08/02	09/02	10/02	11/02	12/02
0	0	0	0	0	Rainfall(mm)	0	0	0	0	0
30.5	32.8	32.0	32.2	32.8	T <sub>max</sub> (°C)	32	34	35	35	34
12.5	12.7	11.8	11.5	17.6	T <sub>min</sub> (°C)	20	21	20	19	20
0	0	0	0	0	Cloud Cover	1	1	0	0	0
75	74	69	70	50	RH-I (%)	53	29	36	59	34
26	27	23	25	34	RH-II (%)	23	13	12	15	20
4.4	3.5	3.2	3.4	3.7	Wind speed (km/hr)	10.9	9.3	9.9	13.3	15.2
320	340	360	340	360	Wind direction	27	56	251	324	15

### Agro meteorological Advisories

<b>General Advice</b>	<b>Rain fall</b>	As per IMD Forecast, There is forecasting of <b>no rainfall</b> occurs during next five days. Sky will be remaining clear to mainly clear.
	<b>Temperature</b>	Maximum and minimum temperature likely to be in range of <b>32 - 35°C</b> and <b>19 - 21°C</b> , respectively.
	<b>RH (%)</b>	The Relative Humidity is likely to be in the range of <b>12 – 59 %</b> .
	<b>Wind Direction and Wind Speed</b>	Direction and speed of wind is to be <b>NE, W, NW &amp; N</b> and <b>9.3 – 15.2 km/h</b> , respectively.


- + **Standardized Precipitation Index:** - For the period of **05<sup>th</sup> January to 01<sup>st</sup> February, 2023** for Junagadh district considered under the mildly dry condition.
- + **As per ERFS products, below normal rainfall and normal T<sub>max.</sub> & T<sub>min.</sub> may occur in Saurashtra & Kutch region during 12<sup>th</sup> to 18<sup>th</sup> February, 2023.**
- + **MEGHDOOT Mobile Application**:- **Download** the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.

***Click on the following link to download the MEGHDOOT application:***

**Android users:** <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

**IOS users:** <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ **To apply of irrigation in the *rabi* crops during at regular interval.**
- ❖ **Harvesting operation should be carried out at physiological maturity stage of early sown *rabi* crops.**
- ❖ **Farmers are advised to procure good quality and select the certified seed with high yielding variety of *summer* crops for sowing.**
- ❖ **Farmers are advised to prepare their field by ploughing and harrowing for sowing of upcoming summer season crops.**
- ❖ **To get the supply of seeds, fertilizers and insecticide, pesticide and fungicide according to planning the farm for the next summer season crops.**



Agriculture vigour is good over few places of the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

Crop	Variety/ Pest/Insect	Stage	Agro met Advisories
<b>Summer Groundnut</b>	<b>GG-2, GJG- 31, TG-37, TAG-24</b>	<b>Field preparation / Sowing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In summer groundnut apply 25 kg N/ha and 50 kg P/ha at the time of sowing.</li> <li>Carry out sowing of summer groundnut as range of temperature rises to 22-25° C.</li> <li>To spray weedicide 0.9 kg/ha pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing.</li> </ul>
<b>Wheat</b>	<b>Termite</b>	<b>Milking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>If a termite infestation is observed in the standing crop of wheat, immediately apply Fipronil 5 SC @ 1.6 litres or Chlorpyrifos 20 EC @ 1.5 litres with 100 kg of sand or soil/ha then lightly irrigate the crop.</li> <li>Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>Postpone the irrigation to the crop at the time of maturity. Due to excess irrigation the quality of seed is deteriorate.</li> </ul>
<b>Chickpea</b>	<b>Pod borer, Blight</b>	<b>Pod development</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>Regular monitoring of gram pod borer during entire crop season.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Also to prevent blight disease infestation spray Mencozeb 27 gm in 10 liters of water at 10 days interval as precautionary measure.</li> <li>➤ For the control of Prodenia and Heliothis at ETL, spray 20 ml quinalphos in 10 litre of water.</li> </ul>
<b>Coriander</b>	<b>Aphid</b>	<b>Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>➤ Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor aphid population.</li> <li>➤ Avoid to spray pesticides whenever predators like ladibird beetle, syrphid fly and chrysopa are present in the field which are preying the aphids.</li> <li>➤ For control sucking pest in coriander, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and Acepahte 15 gm in 10 litres of water.</li> <li>➤ Also to prevent blight disease infestation spray Mencozeb 27 gm in 10 liters of water at 10 days interval as precautionary measure.</li> </ul>
<b>Garlic</b>	<b>Thrips</b>	<b>Bulb development</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>➤ For management of thrips, apply schedule spraying of Beauveria bassiana 1.15 WP (min 2 x 10<sup>6</sup> cfu/g), first spray at initiation of pest infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) spray at 10 days interval.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For control of Thrips, To Spray Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water).</li> </ul>
Cumin	Thrips	Flowering	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>➤ To spray Beauveria bassiana 1.15 WP (Min. 2x10<sup>6</sup> cfu/g) 0.007 % (60 g/10 l of water) for management of thrips.</li> </ul>
Pigeon pea	Pod borer	Pod development / Maturity	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval stage.</li> <li>➤ For the control of pod borer, spray spinosad 5 ml OR clorantrinilipol 3 ml OR flubendimide 2 ml in 10 liter of water.</li> <li>➤ Harvesting operation should be carried out at physiological maturity stage.</li> </ul>
Castor	Semi looper	Capsule development	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval stage.</li> <li>➤ For the control of castor semi looper, spray 20 ml quinalphos (1.5 % powder) OR 40 gm carbaryl in 10 liter of water.</li> </ul>
Mango	Madhiya , Powdery mildew	Flowering / Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of madhiya, spray 50 % WP carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of water.</li> <li>➤ For the control of powdery mildew, spray 30 gm sulphur + 48 % EC carethon 10 ml in 10 liter of water.</li> <li>➤ To Spray 20 PPM NAA and 2 % urea solution for the control of stops fruit break and increase the fruit size.</li> </ul>

<b>Vegetable crops</b>	-	<b>Sowing/ Flowering/ Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To the spray of agrochemicals during this period.</li> <li>➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out.</li> <li>➤ To apply irrigation to the crop at regular interval.</li> <li>➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To provide adequate food &amp; clean warm water for drinking and keep the animals clean shed.</li> <li>➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.</li> <li>➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place.</li> <li>➤ Use chaff cutter for fodder.</li> <li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.</li> <li>➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.</li> </ul>

	<p style="text-align: center;"><b>Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Agro meteorological Cell</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Department of Agronomy</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Junagadh Agricultural University</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Junagadh-362001</b></p> <p style="text-align: center;"><b>E-mail: <a href="mailto:amfujnd@yahoo.com">amfujnd@yahoo.com</a> Phone: 0285-2670139</b></p>	
---	--	---

**Agromet Advisory Service Bulletin for Porbandar District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone**  
**(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)**

**(#AZADI KA AMRIT MAHOTSAV#)**

Day:- Tuesday

Date: 07-02-2023

### Agromet Advisory Service bulletin. No:- 090 (2022-23)

Observed Weather during last Five days (Dated 02 <sup>nd</sup> to 06 <sup>th</sup> February, 2023)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 08 <sup>th</sup> to 12 <sup>th</sup> February, 2023) <u>until 08:30 hrs of 12-02-2023</u>				
02/02	03/02	04/02	05/02	06/02	Date	08/02	09/02	10/02	11/02	12/02
0	0	0	0	0	Rainfall(mm)	0	0	0	0	0
30.0	29.9	32.5	32.4	32.2	Tmax (°C)	32	34	34	32	32
18.0	13.4	-	12.2	16.0	Tmin (°C)	16	17	15	15	17
0	0	0	0	0	Cloud Cover	1	0	0	0	0
32	70	-	68	94	RH-I (%)	46	32	56	75	48
22	40	33	33	35	RH-II (%)	32	22	22	32	33
14.8	-	18.5	-	-	Wind speed (km/hr)	13.9	13.0	12.5	15.6	17.3
70	-	290	-	-	Wind direction	63	26	324	315	297


#### Agro meteorological Advisories

<b>General Advice</b>	<b>Rain fall</b>	As per IMD Forecast, There is forecasting of <b>no rainfall</b> occurs during next five days. Sky will be remaining clear to mainly clear.
	<b>Temperature</b>	Maximum and minimum temperature likely to be in range of <b>32 – 34°C</b> and <b>14 - 17°C</b> , respectively.
	<b>RH (%)</b>	The Relative Humidity is likely to be in the range of <b>22 – 75 %</b> .
	<b>Wind Direction and Wind Speed</b>	Direction and speed of wind is to be <b>NE &amp; NW</b> and <b>12.5 – 17.3 km/h</b> , respectively.

- ❖ **Standardized Precipitation Index:** - For the period **05<sup>th</sup> January to 01<sup>st</sup> February,2023** for Porbandar district considered under the mildly dry condition.
- ❖ **As per ERFS products, below normal rainfall and normal T<sub>max.</sub> & T<sub>min.</sub> may occur in Saurashtra & Kutch region during 12<sup>th</sup> to 18<sup>th</sup> February, 2023.**
- ❖ **MEGHDOOTMobile Application:**-Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.  
**Click on the following link to download the MEGHDOOT application:**  
**Android users:**<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>  
**IOS users:**<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>
- ❖ **To apply of irrigation in the rabi crops during at regular interval.**

- ❖ Harvesting operation should be carried out at physiological maturity stage of early sown rabi crops.
- ❖ Farmers are advised to procure good quality and select the certified seed with high yielding variety of summer crops for sowing.
- ❖ To get the supply of seeds, fertilizers and insecticide, pesticide and fungicide according to planning the farm for the next summer season crops.
- ❖ Farmers are advised to prepare their field by ploughing and harrowing for sowing of upcoming summer season crops.

**NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 04  
(22.01.2023 to 28.01.2023) over Agricultural region**



Agriculture vigour is good over few places of the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

Crop	Variety/ Pest / Insect	Stage	Agro met Advisories
<b>Summer Groundnut</b>	<b>GG-2, GJG- 31, TG-37, TAG-24</b>	<b>Field preparation / Sowing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In summer groundnut apply 25 kg N/ha and 50 kg P/ha at the time of sowing.</li> <li>➤ Carry out sowing of summer groundnut as range of temperature rises to 22-25° C.</li> <li>➤ To spray weedicide 0.9 kg/ha pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing.</li> </ul>
<b>Wheat</b>	<b>Termite</b>	<b>Milking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ If a termite infestation is observed in the standing crop of wheat, immediately apply Fipronil 5 SC @ 1.6 litres or Chlorpyrifos 20 EC @ 1.5 litres with 100 kg of sand or soil/ha then lightly irrigate the crop.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>➤ Postpone the irrigation to the crop at the time of maturity. Due to excess irrigation the quality of seed is deteriorate.</li> </ul>
<b>Chickpea</b>	<b>Pod borer, Blight</b>	<b>Pod development</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>➤ Regular monitoring of gram pod borer during entire crop season.</li> <li>➤ Also to prevent blight disease infestation spray Mencozeb 27 gm in 10 liters of water at 10 days interval as precautionary measure.</li> <li>➤ For the control of Prodenia and Heliothis at ETL, spray 20 ml quinalphos in 10 litre of water.</li> </ul>
<b>Coriander</b>	<b>Aphid</b>	<b>Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>➤ Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor aphid population.</li> <li>➤ Avoid to spray pesticides whenever predators like ladibird beetle, syrphid fly and chrysopa are present in the field which are predating the aphids.</li> <li>➤ For control sucking pest in coriander, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and Acepahte 15 gm in 10 litres of water.</li> <li>➤ Also to prevent blight disease infestation spray Mencozeb 27 gm in 10 liters of water at 10 days interval as precautionary measure.</li> </ul>

<b>Garlic</b>	<b>Thrips</b>	<b>Bulb development</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>➤ For management of thrips, apply schedule spraying of Beauveria bassiana 1.15 WP (min 2 x 106 cfu/g), first spray at initiation of pest infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) spray at 10 days interval.</li> <li>➤ For control of thrips, to Spray Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water).</li> </ul>
<b>Cumin</b>	<b>Thrips</b>	<b>Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>➤ To spray Beauveria bassiana 1.15 WP (Min. 2x106 cfu/g) 0.007 % (60 g/10 l of water) for management of thrips.</li> </ul>
<b>Pigeon pea</b>	<b>Pod borer</b>	<b>Pod development / Maturity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval stage.</li> <li>➤ For the control of pod borer, spray spinosad 5 ml OR clorantrinilipol 3 ml OR flubendimide 2 ml in 10 liter of water.</li> <li>➤ Harvesting operation should be carried out at physiological maturity stage.</li> </ul>
<b>Castor</b>	<b>Semi looper</b>	<b>Capsule development</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval stage.</li> <li>➤ For the control of castor semi looper, spray 20 ml quinalphos (1.5 % powder) OR 40 gm carbaryl in 10 liter of water.</li> </ul>

<b>Mango</b>	<b>Madhiya , Powdery mildew</b>	<b>Flowering / Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of madhiya, spray 50 % WP carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of water.</li> <li>➤ For the control of powdery mildew, spray 30 gm sulphur + 48 % EC carethon 10 ml in 10 liter of water.</li> <li>➤ To Spray 20 PPM NAA and 2 % urea solution for the control of stops fruit break and increase the fruit size.</li> </ul>
<b>Vegetable crops</b>	-	<b>Sowing/ Flowering/ Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To the spray of agrochemicals during this period.</li> <li>➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out.</li> <li>➤ To apply irrigation to the crop at regular interval.</li> <li>➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To provide adequate food &amp; clean cool water for drinking and keep the animals clean shed.</li> <li>➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.</li> <li>➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place.</li> <li>➤ Feed silage &amp; hay material along with concentrate feed.</li> <li>➤ Use chaff cutter for fodder.</li> <li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.</li> </ul>

			➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.
--	--	--	--

 <p><b>Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)</b>  <b>Agrometeorological Cell</b>  <b>Department of Agronomy</b>  <b>Junagadh Agricultural University</b>  <b>Junagadh-362001</b>  <b>E-mail: <a href="mailto:amfujnd@yahoo.com">amfujnd@yahoo.com</a> Phone: 0285-2670139</b></p>	 <p><b>॥ ग्रामीणम् ज्ञान सर्वस् ॥</b></p>
---	--

**Agromet Advisory Service Bulletin for Gir Somnath District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone**  
**(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)**

**(#AZADI KA AMRIT MAHOTSAV#)**

**Day:- Tuesday**

**Date: 07-02-2023**

**Agromet Advisory Service bulletin. No:- 090 (2022-23)**

Observed Weather during last Five days (Dated 02 <sup>nd</sup> to 06 <sup>th</sup> February, 2023)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 08 <sup>th</sup> to 12 <sup>th</sup> February, 2023) until 08:30 hrs of 12-02-2023				
02/02	03/02	04/02	05/02	06/02	Date	08/02	09/02	10/02	11/02	12/02
0	0	0	0	0	Rainfall(mm)	0	0	0	0	0
31.4	32.6	32.7	31.6	32.2	Tmax (°C)	30	32	32	31	31
19.4	19.1	-	15.2	18.2	Tmin (°C)	18	19	18	17	18
0	0	0	0	0	Cloud cover	1	2	1	0	0
44	70	-	67	66	RH-I (%)	71	40	38	55	51
31	42	66	65	64	RH-II (%)	31	19	19	22	29
5.6	3.7	3.7	-	-	Wind speed (km/hr)	12.4	10.7	12.2	15.1	16.2
20	50	250	-	-	Wind direction	22	30	300	301	22

#### Agro meteorological Advisories

<b>General Advice</b>	<b>Rain fall</b>	As per IMD Forecast, There is forecasting of <b>no rainfall</b> occurs during next five days. Sky will be remaining clear to mainly clear.
	<b>Temperature</b>	Maximum and minimum temperature likely to be in range of <b>30 - 32°C</b> and <b>17 - 19°C</b> , respectively.
	<b>RH (%)</b>	The Relative Humidity is likely to be in the range of <b>19 – 71 %</b> .

	<b>Wind Direction and Wind Speed</b>	Direction and speed of wind is to be <b>N, NE &amp; NW</b> and <b>10.7 – 16.2 km/h</b> , respectively.
--	--------------------------------------	--

❖ **Standardized Precipitation Index:** - For the period of **05<sup>th</sup> January to 01<sup>st</sup> February, 2023** for Gir Somnath district considered under the mildly dry condition.

❖ **As per ERFS products, below normal rainfall and normal T<sub>max.</sub> & T<sub>min.</sub> may occur in Saurashtra & Kutch region during 12<sup>th</sup> to 18<sup>th</sup> February, 2023.**

❖ **MEGHDOOT Mobile Application:** -Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.


**Click on the following link to download the MEGHDOOT application:**

**Android users:** <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

**IOS users:** <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ **To apply of irrigation in the *rabi* crops during at regular interval.**
- ❖ **Harvesting operation should be carried out at physiological maturity stage of early sown *rabi* crops.**
- ❖ **Farmers are advised to procure good quality and select the certified seed with high yielding variety of *summer* crops for sowing.**
- ❖ **To get the supply of seeds, fertilizers and insecticide, pesticide and fungicide according to planning the farm for the next summer season crops.**
- ❖ **Farmers are advised to prepare their field by ploughing and harrowing for sowing of upcoming summer season crops.**

NOAA/VIIRS/BLENDED NDVI Composite ending on Week no 04  
(22.01.2023 to 28.01.2023) over Agricultural region



Agriculture vigour is good over few places of the state.

Source: <https://www.star.nesdis.noaa.gov>

Crop	Variety/ Pest / Insect	Stage	Agro met Advisories
------	---------------------------	-------	---------------------

<b>Summer Groundnut</b>	<b>GG-2, GJG-31, TG-37, TAG-24</b>	<b>Field preparation / Sowing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In summer groundnut apply 25 kg N/ha and 50 kg P/ha at the time of sowing.</li> <li>➤ Carry out sowing of summer groundnut as range of temperature rises to 22-25° C.</li> <li>➤ To spray weedicide 0.9 kg/ha pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing.</li> </ul>
<b>Wheat</b>	<b>Termite</b>	<b>Milking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ If a termite infestation is observed in the standing crop of wheat, immediately apply Fipronil 5 SC @ 1.6 litres or Chlorpyrifos 20 EC @ 1.5 litres with 100 kg of sand or soil/ha then lightly irrigate the crop.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>➤ Postpone the irrigation to the crop at the time of maturity. Due to excess irrigation the quality of seed is deteriorate.</li> </ul>
<b>Chickpea</b>	<b>Pod borer, Blight</b>	<b>Pod development</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>➤ Regular monitoring of gram pod borer during entire crop season.</li> <li>➤ Also to prevent blight disease infestation spray Mencozeb 27 gm in 10 liters of water at 10 days interval as precautionary measure.</li> <li>➤ For the control of Prodenia and Heliothis at ETL, spray 20 ml quinalphos in 10 litre of water.</li> </ul>
<b>Coriander</b>	<b>Aphid</b>	<b>Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor aphid population.</li> <li>➤ Avoid to spray pesticides whenever predators like ladibird beetle, syrphid fly and chrysopa are present in the field which are predating the aphids.</li> <li>➤ For control sucking pest in coriander, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and Acepahte 15 gm in 10 litres of water.</li> <li>➤ Also to prevent blight disease infestation spray Mencozeb 27 gm in 10 liters of water at 10 days interval as precautionary measure.</li> </ul>
<b>Garlic</b>	<b>Thrips</b>	<b>Bulb development</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the regular interval.</li> <li>➤ For management of thrips, apply schedule spraying of Beauveria bassiana 1.15 WP (min 2 x 106 cfu/g), first spray at initiation of pest infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) spray at 10 days interval.</li> <li>➤ For control of thrips, to Spray Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water).</li> </ul>
<b>Pigeon pea</b>	<b>Pod borer</b>	<b>Pod development / Maturity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval stage.</li> <li>➤ For the control of pod borer, spray spinosad 5 ml OR clorantrinilipol 3 ml OR flubendimide 2 ml in 10 liter of water.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Harvesting operation should be carried out at physiological maturity stage.</li> </ul>
<b>Castor</b>	<b>Semi looper</b>	<b>Capsule development</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</li> <li>➤ For the control of castor semi looper, spray 20 ml quinalphos (1.5 % powder) OR 40 gm carbaryl in 10 liter of water.</li> </ul>
<b>Mango</b>	<b>Madhiya , Powdery mildew</b>	<b>Flowering / Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of madhiya, spray 50 % WP carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of water.</li> <li>➤ For the control of powdery mildew, spray 30 gm sulphur + 48 % EC carethon 10 ml in 10 liter of water.</li> <li>➤ To Spray 20 PPM NAA and 2 % urea solution for the control of stops fruit break and increase the fruit size.</li> </ul>
<b>Vegetable crops</b>	-	<b>Sowing/ Flowering/ Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To the spray of agrochemicals during this period.</li> <li>➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out.</li> <li>➤ To apply irrigation to the crop at regular interval.</li> <li>➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To provide adequate food &amp; clean warm water for drinking and keep the animals clean shed.</li> <li>➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.</li> </ul>

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Give stored fodder with mineral mixture.<br/>Fodder should be stored at safe place.</li><li>➤ Feed silage &amp; hay material along with concentrate feed.</li><li>➤ Use chaff cutter for fodder.</li><li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitzaz 2 ml in 1 litre of water.</li><li>➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.</li></ul> |
|--|--|--|---|

**Technical Officer**

**Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)**

**J.A.U., Junagadh**