

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાક્રીય વિભાગ  
તા. ૦૯-૦૩-૨૦૧૬ થી તા. ૧૩-૦૩-૨૦૧૬

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૬

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાક્રીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	0.00
મહત્વમાન (સે.ગે.)	34.5
લઘુત્વમાન (સે.ગે.)	18.5
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	77-31
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	5.4

## પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૧૩-૦૩-૧૬ સુધી)

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

૧. જૂનાગઢ:- જુલ્લામા આગામી તારીખ ૦૬/૦૩/૨૦૧૬ થી ૧૩/૦૩/૨૦૧૬ દરમ્યાન આકાશ મુખ્યત્વે મોટેભાગે ચોખ્યુ રહેશે, વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેશે નહિ અને પવનની ઝડપ ૧૬ થી ૧૮ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૩૩ થી ૩૫ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્વમાન ૨૨ થી ૨૩ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

૨. પોરબંદર:- જુલ્લામા આગામી તારીખ ૦૬/૦૩/૨૦૧૬ થી ૧૩/૦૩/૨૦૧૬ આકાશ મુખ્યત્વે મોટેભાગે ચોખ્યુ રહેશે, વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેશે નહિ અને પવનની ઝડપ ૧૫ થી ૧૭ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૩૪ થી ૩૬ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્વમાન ૨૧ થી ૨૨ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

### જૂનાગઢ

હવામાન પરીબળો / તારીખ	દિવસ-૧ ૦૬.૦૩.૧૬	દિવસ-૨ ૧૦.૦૩.૧૬	દિવસ-૩ ૧૧.૦૩.૧૬	દિવસ-૪ ૧૨.૦૩.૧૬	દિવસ-૫ ૧૩.૦૩.૧૬
વરસાદ (મી.મી)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.શે)	33	34	35	35	35
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.શે)	22	23	23	23	23
વાદળની સ્થિતિ	મોટેભાગે ચોખ્યુ	ચોખ્યુ	મોટેભાગે ચોખ્યુ	મોટેભાગે ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
સવારના ભેજના ટકા	58	64	58	63	74
બપોર બાદ ભેજના ટકા	47	51	51	50	58
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	019	017	016	017	015
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	335	4	24	252	307

### પોરબંદર

વરસાદ (મી.મી)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.શે)	34	35	36	35	34
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.શે)	21	21	21	21	22
વાદળની સ્થિતિ	મોટેભાગે ચોખ્યુ	ચોખ્યુ	મોટેભાગે ચોખ્યુ	મોટેભાગે ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
સવારના ભેજના ટકા	58	62	56	62	78
બપોર બાદ ભેજના ટકા	45	48	47	46	59
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	017	015	015	017	015
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	343	47	48	308	311

## દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાક્ય વિભાગ

પાકનું નામ	રોગ/જીવાત/ જાત	કૃષિ સલાહ
મગા	જીવાત-૨,૩,૪	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ મગના પાકમાં પ્રતિ હેક્ટરે ૨૦ કી.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૪૦ ફોસ્ફરસ આપવાથી પાકનું વધુ ઉત્પાદન આવક મળે છે.</li> <li>❖ ઉનાળું મગના બીજને ૧ કી.ગ્રા/૩ ગ્રામ થાઈરમ અથવા મેન્કોઝેબનો પટ આપીને વાવેતર કરવું.</li> </ul>
અડદ	ગુજ.-૧, ટી-૮	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ અડદના પાકમાં પ્રતિ હેક્ટરે ૨૦ કી.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૪૦ ફોસ્ફરસ આપવાથી પાકનું સારુ ઉત્પાદન આવક મળે છે.</li> <li>❖ ઉનાળું અડદ ના બીજને ૧ કી.ગ્રા/૩ ગ્રામ મેન્કોઝેબનો પટ આપીને વાવેતર કરવું.</li> </ul>
ઉનાળું મગફળી	ગજ.- ૨,૬, ટીજી-૨૬, ટીપીજી-૪૧	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ મગફળીમાં પ્રતિ હેક્ટરે ૨૫ કી.ગ્રા. નાઈટ્રોજન, ૫૦ કી.ગ્રા. પોટાશીયમ, ૫૦ કી.ગ્રા. ફોસ્ફરસ અને ૪૦ કી.ગ્રા. સલ્ફર (૨૨૫ કી.ગ્રા. જીપ્સમ) આપવાથી મગફળીનું વધુ ઉત્પાદન અને ચોખ્યા આવક મળે છે.</li> <li>❖ મગફળીમાં ચુસીયા, મોલોમશી, થ્રીપ્સ ના નિયંત્રણ માટે ફોસ્ફામીડોન ૩ મીલી દવા અથવા ડાયમિથોયેટ ૧૫ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો. મોલોમશી સાથે દાળીયા જીવાત જોવા મળે તો દાવાનો છંટકાવ મુલતવી રાખવો.</li> </ul>
ઉનાળું તલ	ગુજ.-૨,૩	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ તલના પાકમાં પ્રતિ હેક્ટરે ૧૨.૫ કી.ગ્રા. નાઈટ્રોજન, અને ૧૨.૫ કી.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવાથી તલનું વધુ ઉત્પાદન મળે છે.</li> </ul>
ઘઉં	પરીપકવ અવસ્થા	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને મુકુટમૂળ અવસ્થાએ ૧૩૦ કિલો યુરીયા/હેક. અને કુલ અને દાણાની અવસ્થાએ સમયસર પિયત આપવું.</li> <li>❖ ઘઉના પાકને પરીપકવ અવસ્થાએ પીયત આપવાનું બંધ કરવું. વધુ પડતું પીયત આપવાથી દાણા પોટીયા થઈ જાય છે અને દાણાની ગુણવત્તામાં ઘટાડો થાય છે.</li> </ul>
લસણ	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>ઉગસુકુ</span> <span style="margin: 0 10px;">થ્રીપ્સ</span> <span>પરીપકવ અવસ્થા</span> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ઉગસુકુનોરોગ સફેદ કૂગના કારણે હોવાથી ટેબયકોનાઓલ ૧૦ મીલી દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરીને ડેનચીંગ કરવું.</li> <li>❖ લસણમાં થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ફોસ્ફામીડોન ૩ મીલી અથવા ડાયમિથોયેટ ૧૦ મીલી અથવા મીથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૧૦ મીલી ના પ્રવાહીને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા.</li> <li>❖ લસણના પાકને ગાઈયાના વિકાસ સમયે પીયત આપવું. કળી પાકતી વખતે જરૂરીયાત મુજબ પીયત આપવું. વધુ પડતું પીયત આપવાથી</li> </ul>

		કળીઓ ફાટી જાય છે.
જૃ	શ્રીપસ અને મોલોમસી	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ જુરુના પાકમાં શ્રીપસ અને મોલોમસીના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોક્ક્રમ ૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી છાંટવી. તેમજ ચરમીનો રોગ ના થાય તે માટે ૨૫ ગ્રામ ડાયથેન એમ-૪૫ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૧૦ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા.</li> <li>❖ જુરુમા ચરમીના ઉપદ્રવના નિયંત્રણ માટે ડાયથેન એમ-૪૫, ૧૫ મીલી હેક્કાકોનાઝોલ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા.</li> <li>❖ પાકમાં સુકારાના નિયંત્રણ માટે પિયત આપવાનું રાળવું.</li> <li>❖ જુરુના પાક પરીપક્વ થાય એટલે તરતજ કાપણી કરી લેવી અને જમીન ઘેડી નાખવી.</li> </ul>
કુંગળી	પરપલ બ્લોચ શ્રીપસ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ કુગળીમાં જાંબલી રેગના ધાબાના રોગના નિયંત્રણ માટે ૨૫ ગ્રામ મેન્જોઝેબ અથવા ૧૫ મીલી ક્વિનાલફોસ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ૧૦ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ કુંગળીમાં શ્રીપસના નિયંત્રણ માટે ફોસ્ફામીડોન ૩ મીલી અથવા ડાયમિથોએટ ૧૦ મીલી અથવા મીથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૧૦ મીલી ના પ્રવાહીને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા.</li> </ul>
શાકભાજી	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ચુસીયા પ્રકારની જુવાતના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનું મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૪૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. અથવા દ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ ફળ અને ડોકાની ઈથળનો ઉપદ્રવ વધુ હોયતો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં ડાટી દેવા અથવા ૩ મીલી રીનાક્ષીપાયર દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ પાકમાં કથીરીના નિયંત્રણ માટે પ્રોપરગાઈટ ૧૦ મીલી/૧૦ લીટર પાણી મિશ્રણ કરી છાંટવી.</li> </ul>
પશુ પાલન	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો.</li> <li>❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઇ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.</li> <li>❖ પશુઓને ખરવા-મોવાસા રોગની રસીનો પ્રથમ ડોઝ ૪ માસની ઉમરે, બીજો ડોઝ ૬ માસની ઉમરે અને ત્યાર બાદ ૬૨ ૬ માસે આપવો.</li> </ul>

## JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 08-03-2016

**(Period from 09 to 13 March -2016)**

### **Significant weather for the preceding week**

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	33.5-35.4
Minimum temperature °C	17.5-19.6
RH % (Morning/Afternoon)	77-31
Wind speed (Kmph)	4.5-6.9
Cloud cover	0-4

### **Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 13-03-2016**

Parameters	Day-1 05-03-16	Day-2 06-03-16	Day-3 07-03-16	Day-4 08-03-16	Day-5 09-03-16
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	33	34	35	35	35
Minimum temperature °C	22	23	23	23	23
Cloud cover (Okta)	2	0	1	1	0
RH I % (Morning)	58	64	58	63	74
RH II % (After noon)	47	51	51	50	58
Wind speed (Kmph)	019	017	016	017	015
Wind direction(Deg)	335	4	24	252	307

### **Agro meteorological Advisories**

<b>General Advice</b>	<b>Rain fall Temperature</b>	There is no forecasting of rainfall during next five days. Maximum and minimum temperature likely to be in range of 33-35°C and 22-23 °C, respectively.	
	<b>RH (%)</b> <b>Wind Direction and Speed</b>	The Relative Humidity is likely to be in the range of 74-47 %. Direction and speed of wind is likely to be NE and 16-19 km/h, respectively.	
<b>Crop</b>	<b>Stage</b>	<b>Insect/Pest/Variety</b>	<b>Agromet Advisories</b>
<b>Green gram</b>	<b>Sowing</b>	<b>GM-2,3, GM-4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply 20 kg nitrogen, 40 kg phosphorus per ha and give irrigation to the crop.</li> <li>➤ Before sowing the seeds should be treated with 3 gm thiram or mencozeb per 1 kg of seed.</li> </ul>
<b>Black gram</b>	<b>Sowing</b>	<b>Guj-1, T-9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply 20 kg nitrogen, 40 kg phosphorus per ha and give irrigation to the crop.</li> <li>➤ Before sowing the seeds should be treated with 3 gm mencozeb per 1 kg of seed.</li> </ul>

<b>Summer Groundnut</b>	<b>Sowing</b>	<b>GG-2,6, Tg-26, TPG-41</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply 25 kg nitrogen, 50 kg phosphorus and 40 kg sulphur (225 kg gypsum) and 50 kg potassium per ha and give irrigation to the crop.</li> <li>➤ For the control of sucking pest, aphid, thrips, spray 3 ml Phosphamidon OR 15 ml Dimethoate in 10 litre of water. For ladybird beetle is observed with aphid then postpone the spraying operation.</li> </ul>
<b>Summer Sesame</b>	<b>Sowing</b>	<b>Guj-2,3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply 12.5 kg nitrogen, 12.5 kg phosphorus per ha and give irrigation to the crop.</li> </ul>
<b>Wheat</b>	<b>Booting</b>	<b>GW-366, Lok-1, GW-190</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply 130kg Urea as top dressing per ha. and give irrigation at critical stages to the crop.</li> <li>➤ Postpone the irrigation to the crop at the time of maturity. Due to excess irrigation the quality of seed is deteriorate.</li> </ul>
<b>Garlic</b>	<b>Bulb formation</b>	<b>Guj. Garlic-3 &amp;4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Yellowing of leaves due to stem (clove) rot, Drenching of Tebuconazole 10 ml/10 litre of water.</li> </ul>
		<b>Thrips</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the attack of thrips, spray Phosphamidon 3.0 ml or Dimethoate 10 ml or Methay-O-Demeton 10 ml in 10 liter of water at 10-12 days interval.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the bulb development stage.</li> </ul>
<b>Cumin</b>	<b>Seed formation</b>	<b>Guj. Cumin-2 &amp;4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the attack of aphid and thrips, spray Thiomethoxam 5 gm/ 10 liters of water.</li> <li>➤ Also to prevent blight disease infestation spray Mencozeb 27 gm in 10 liters of water at 10 days interval as precautionary measure.</li> <li>➤ For the control of blight and powdery mildew, spray <b>Hexaconazole</b> 15 ml/10 liters of water.</li> <li>➤ Stop irrigation to prevent further infection in standing crop.</li> </ul>
<b>Onion</b>	<b>Bulb formation</b>	<b>Nasik-53, JND Local, Talaja Red, Pusa Red</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of purple blotch, spray 25 gm Mencozeb and 15 ml hexaconazole in 10 litres of water at 10-15 days interval.</li> <li>➤ For the control of thrips, spray Phosphamidon 3.0 ml or Dimethoate 10 ml or Methay-O-Demeton 10 ml in 10 liter of water at 10-12 days interval.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the bulb development stage.</li> </ul>
<b>Vegetable crops</b>	<b>Flowering/ fruiting</b>	<b>Thrips and White Fly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).</li> </ul>

		<b>Shoot fruit borer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</li> <li>➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil and spray 3 ml renaxypyre in 10 litre of water.</li> <li>➤ For the control of severe attack of thrips, Spray 3 ml <b>spinosad</b> in 10 litres of water.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases.</li> <li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.</li> </ul>

## PORBANDAR

**Phone : 0285-2670139**

**Date : 08-03-2016**

**(Period from 09 to 13 March -2016)**

**Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 13-03-2016**

Parameters	Day-1 05-03-16	Day-2 06-03-16	Day-3 07-03-16	Day-4 08-03-16	Day-5 09-03-16
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	34	35	36	35	34
Minimum temperature °C	21	21	21	21	22
Cloud cover (Okta)	2	0	1	1	0
RH I % (Morning)	58	62	56	62	78
RH II % (After noon)	45	48	47	46	59
Wind speed (Kmph)	017	015	015	017	015
Wind direction(Deg)	343	47	48	308	311

### **Agro meteorological Advisories**

<b>General Advice</b>	<b>Rain fall</b>	There is no forecasting of rainfall during next five days.		
	<b>Temperature</b>	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 34-36°C and 21-22 °C, respectively.		
	<b>RH (%)</b>	The Relative Humidity is likely to be in the range of 78-45 %.		
	<b>Wind Direction and Speed</b>	Direction and speed of wind is likely to be NE and 15-17 km/h, respectively.		
<b>Crop</b>	<b>Stage</b>	<b>Insect/Pest/Variety</b>	<b>Agromet Advisories</b>	
<b>Green gram</b>	<b>Sowing</b>	<b>GM-2,3, GM-4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply 20 kg nitrogen, 40 kg phosphorus per ha and give irrigation to the crop.</li> <li>➤ Before sowing the seeds should be treated with 3 gm thiram or mencozeb per 1 kg of seed.</li> </ul>	
<b>Black gram</b>	<b>Sowing</b>	<b>Guj-1, T-9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply 20 kg nitrogen, 40 kg phosphorus per ha and give irrigation to the crop.</li> <li>➤ Before sowing the seeds should be treated with 3 gm mencozeb per 1 kg of seed.</li> </ul>	
<b>Summer Groundnut</b>	<b>Sowing</b>	<b>GG-2,6, Tg-26, TPG-41</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply 25 kg nitrogen, 50 kg phosphorus and 40 kg sulphur (225 kg gypsum) and 50 kg potassium per ha and give irrigation to the crop.</li> <li>➤ For the control of sucking pest, aphid, thrips, spray 3 ml Phosphamidon OR 15 ml Dimethoate in 10 litre of water. For ladybird beetle is observed with aphid then postpone the spraying operation.</li> </ul>	
<b>Summer Sesame</b>	<b>Sowing</b>	<b>Guj-2,3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply 12.5 kg nitrogen, 12.5 kg phosphorus per ha and give irrigation to the crop.</li> </ul>	

<b>Wheat</b>	<b>Bootling</b>	<b>GW-366, Lok-1, GW- 190</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply 130kg Urea as top dressing per ha. and give irrigation at critical stages to the crop.</li> <li>➤ Postpone the irrigation to the crop at the time of maturity. Due to excess irrigation the quality of seed is deteriorate.</li> </ul>
<b>Garlic</b>	<b>Bulb formation</b>	<b>Guj. Garlic-3 &amp;4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Yellowing of leaves due to stem (clove) rot, Drenching of Tebuconazole 10 ml/10 litre of water.</li> </ul>
		<b>Thrips</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the attack of thrips, spray Phosphamidon 3.0 ml or Dimethoate 10 ml or Methay-O-Demeton 10 ml in 10 liter of water at 10-12 days interval.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the bulb development stage.</li> </ul>
<b>Cumin</b>	<b>Seed formation</b>	<b>Guj. Cumin- 2 &amp;4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the attack of aphid and thrips, spray Thiomethoxam 5 gm/ 10 liters of water.</li> <li>➤ Also to prevent blight disease infestation spray Mencozeb 27 gm in 10 liters of water at 10 days interval as precautionary measure.</li> <li>➤ For the control of blight and powdery mildew, spray <b>Hexaconazole</b> 15 ml/10 liters of water.</li> <li>➤ Stop irrigation to prevent further infection in standing crop.</li> </ul>
<b>Onion</b>	<b>Bulb formation</b>	<b>Nasik-53, JND Local, Talaja Red, Pusa Red</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of purple blotch, spray 25 gm Mencozeb and 15 ml hexaconazole in 10 litres of water at 10-15 days interval.</li> <li>➤ For the control of thrips, spray Phosphamidon 3.0 ml or Dimethoate 10 ml or Methay-O-Demeton 10 ml in 10 liter of water at 10-12 days interval.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at the bulb development stage.</li> </ul>
<b>Vegetable crops</b>	<b>Flowering/ fruiting</b>	<b>Thrips and White Fly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).</li> </ul>
		<b>Shoot and fruit borer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</li> <li>➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil and spray 3 ml renaxypyre in 10 litre of water.</li> <li>➤ For the control of severe attack of thrips, Spray 3 ml <b>spinosad</b> in 10 litres of water.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases.</li> <li>➤ For the control of tick and other parasites,</li> </ul>

			spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.
--	--	--	--