

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન

(સમય તા : ૧૦.૦૬.૧૪ થી તા : ૧૪.૦૬.૧૪)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાક્ય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	00.0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગે.)	39.6
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	25.9
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	81-43
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	9.6

પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૧૪.૦૬.૧૪ સુધી)

હવામાન પરીબળોઅ	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૧૦.૬.૧૪	૦	૦
	૧૧.૬.૧૪	૧૦	૫
	૧૨.૬.૧૪	૭	૭
	૧૩.૬.૧૪	૪	૦
	૧૪.૬.૧૪	૧૬	૧૬
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૦.૬.૧૪	૩૬	૩૪
	૧૧.૬.૧૪	૩૬	૩૪
	૧૨.૬.૧૪	૩૫	૩૩
	૧૩.૬.૧૪	૩૫	૩૩
	૧૪.૬.૧૪	૩૫	૩૩
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૦.૬.૧૪	૨૯	૨૮
	૧૧.૬.૧૪	૨૯	૨૮
	૧૨.૬.૧૪	૨૮	૨૭
	૧૩.૬.૧૪	૨૯	૨૭
	૧૪.૬.૧૪	૨૯	૨૭
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો)	૧૦.૬.૧૪	મોટેભાગે ચોખ્યુ	મોટેભાગે ચોખ્યુ
	૧૧.૬.૧૪	અંશતઃ વાદળધાર્ય	અંશતઃ વાદળધાર્ય
	૧૨.૬.૧૪	મોટેભાગે ચોખ્યુ	મોટેભાગે ચોખ્યુ
	૧૩.૬.૧૪	મોટેભાગે ચોખ્યુ	મોટેભાગે ચોખ્યુ
	૧૪.૬.૧૪	મોટેભાગે ચોખ્યુ	મોટેભાગે ચોખ્યુ
મહત્વમાન ભેજ (%)	૧૦.૬.૧૪	૮૨	૭૯
	૧૧.૬.૧૪	૭૬	૭૪
	૧૨.૬.૧૪	૭૮	૭૬
	૧૩.૬.૧૪	૭૮	૭૭
	૧૪.૬.૧૪	૭૮	૭૬
લઘુત્વમાન ભેજ (%)	૧૦.૬.૧૪	૭૦	૬૫
	૧૧.૬.૧૪	૭૦	૬૫
	૧૨.૬.૧૪	૬૯	૬૬
	૧૩.૬.૧૪	૭૦	૬૭
	૧૪.૬.૧૪	૬૮	૬૫
પવનની ગતિ (કિગ્રી/કલાક)	૧૦.૬.૧૪	૦૨૭	૦૨૫
	૧૧.૬.૧૪	૦૩૦	૦૩૦
	૧૨.૬.૧૪	૦૨૫	૦૨૬
	૧૩.૬.૧૪	૦૨૦	૦૧૯
	૧૪.૬.૧૪	૦૨૩	૦૨૨
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૧૦.૬.૧૪	૧૪૦	૧૫૦
	૧૧.૬.૧૪	૧૬૦	૧૬૦
	૧૨.૬.૧૪	૧૮૦	૧૮૦
	૧૩.૬.૧૪	૨૩૦	૨૨૦
	૧૪.૬.૧૪	૨૩૦	૨૨૦

પત્રક-૬

જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

દક્ષિણ ભેત આભોહવાક્ય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
	લીંગો	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ડુખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ નીયંત્રણ માટે લીભોળી ના બીજનો અર્ક ૫૦૦ મીલી અથવા લીભોળી નુ તેલ ૫૦ મીલી ૧૦ લિટર પાણી મા ઓગાળી ૧૫ દિવસ ના અંતરે ૪ છંટકાવ કરવો અથવા ડિડીવીપી ૫ મીલી અથવા ઈન્ફોકાકાર્બ ૨ મીલી અથવા સ્પિનોસાડ ૨ ગ્રામ/ ૧૦ લિટર પાણી મા ઓગાળી છંટકાવ કરવો ➢ પાકમાં માઈટના નિયંત્રણ માટે ઈથિઓન દવાનો ૨૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો
	રીંગણા અને ટ્રેમેટા	<ul style="list-style-type: none"> ➢ પાકમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે ડાઇમીથોયેટ ૦.૦૩ % અથવા મીથાઈલ ઓ ડેમેટોન ૦.૦૨૫ % અથવા ટ્રાઈઝોફોસ ૦.૦૪ % અથવા એસીફેટ ૦.૧ ટકા ૧૦ લિટર પાણીમાં પ્રવાહી મીશ્રણનો છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમા ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે બગડી ગયેલા ફળને જમીનમાં દાટી દેવા. અને માખી નો વધુ પડતો ઉપક્રમ હોયતો સ્પીનોસેડ દવાનો ૪૮ ઈ.સી. @ ૧ મીલી/ ૪ લિટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.
	મરચા	<ul style="list-style-type: none"> ✓ મરચીના પાકમા કાલવ્રણ રોગના નિયંત્રણ માટે ફેરરોપણી બાદ મેન્કોઝેબ ૭૫ % વે.પા. ૪૦ ગ્રામ અથવા ૧૦ ગ્રામ કાર્બોનાઈમ ૫૦ % વે.પા ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી ૧૨ થી ૧૫ દિવસના અંતરે ૩ છંટકાવ કરવા.
	ઉનાળુ મગફળી	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ઉનાળુ મગફળીમાં મુળનો સડો રોગ ના નિયંત્રણ માટે ઉનાળામાં ઊંડી ઘેડ કરવી, પુરતા પ્રમાણમા ખાતર, પિયતપાક સરક્ષણના પગલાઓથી અને ,કાપણી સમયે ડોડ્વાઓને ઈજા ન થાય તેનુ ધ્યાન રાખી રોગની માત્રા ઘટાડી શકાય છે.
	દાડમ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ દાડમ મા રસ ચુસનાર ફુદા ના નિયંત્રણ માટે કંરજ તેલ, નેપાળો(રતન જ્યોત) તેલ અથવા લીભોળી નુ તેલ ૪૦ મીલી/ ૧૦ લિટર લિટર પાણી મા ઓગાળી છંટકાવ કરવો . ✓ પાકમાં શ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે મોનોકોટોફોસ ૧૦ મીલી અથવા મીથાઈલ ઓ ડેમેટોન ૧૦ મીલી અથવા એસીફેટ ૧૫ ગ્રામ અથવા ટ્રાઈઝોફોસ ૧૫ મીલી અથવા લીભોળીનુ તેલ ૪ મીલી / ૧૦ લિટર પાણીમાં લેળવી આડના થડ અને ડાળી ભીજાય તેમ છંટકાવ કરવો.

	આંબો	<ul style="list-style-type: none"> ❖ આંબામા ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે ફેન્સીઓન ૫૦ % ઈ.સી. ૧૦ મીલી અને મીથાઇલ ચુજુનોલ ૧૦ મીલીનુ મિશ્રણ કરી બાર ઝડ વચ્ચે આવેલ એક ઝડ પર બાકીના ઝડ પર ફક્ત ફેન્સીઓન ૫૦ % ઈ.સી. ૧૦ મીલી દવા પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	પશુપાલન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ દવા ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ પશુઓને ઠડી થી રક્ષણ આપવા સુકાચારા નુ પ્રમાણ વધારવુ અને તેઓને શેડ મા રાખવા

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:09-06-2014

(Period to 10 to 14 June -2014)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	00.0
Maximum temperature °C	39.5-39.8
Minimum temperature °C	25.5-26.2
RH % (Morning/Afternoon)	81-43
Wind speed (Kmph)	8.3-11.3
Cloud cover	0-7

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 14-06-2014

Parameters	Day-1 10-06-14	Day-2 11-06-14	Day-3 12-06-14	Day-4 13-06-14	Day-5 14-06-14
Rain fall (mm)	0	10	7	4	16
Maximum temperature °C	36	36	35	35	35
Minimum temperature °C	29	29	28	29	29
Cloud cover (Okta)	2	4	2	1	2
RH % (Morning/After noon)	82-70	76-70	78-69	78-70	78-68
Wind speed (Kmph)	027	030	025	020	023
Wind direction(Deg)	140	160	180	230	230

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Peanut	Harvesting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of root rot, deep ploughing during summer, timely irrigation, fertilizers and integrated management for the minimizing the disease.
Ladies Finger	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of Shoot and fruit borer, spray neem seed extract 500ml or neem seed oil 50 ml/10 liter of water at 15 days interval (total 4 spray). Or DDVP 5ml or Indoxacarb 2 ml or Spinosad 2 gm/ 10 liter of water. ❖ For the control of mite, spray Ethion 20 ml/10 liter of water.
Chili	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of the disease <i>Colletotrichum capsici</i>, 3 spray of Mencozeb 75 % WP 40 gm and 10 gm Carbendenzim 50 %WP in 10 lit of water at 12 to 15 days interval.
Brinjal & Tomato	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For control of white fly, spray Dimethoate 0.03 % or Trozophos 0.04 % or Methyl-O-Demeton 0.025% or Aciphate 0.1% (10 ml/10lit water). ❖ For control of shoot and fruit borer, infested fruits and shoots should be collected and buried inside the soil. If pest population is high, spraying of spinosad 48 EC@1 ml/4 liter of water.
Pomegranate	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of fruit sucking moth, spray neem oil 40ml/10 lit. of water. ❖ For the control of thrips, Monocrotophos 10 ml or Methyl o demeton 10 ml or Acifet 15 gm or Trizophos 15 ml ot Neem oil 40 ml in 10 liter of water at the base of plant.

Mango	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of fruit fly, spray mixing of Fenthion 50 % E.C and Methyl euginol 10 ml in 10 liter of water.
Live stocks	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of tick, spray Deltamathrin or Amitaz 20 ml/10 liter of water. ➤ Increase the quantity of dry fodder.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date : 09-06-2014

(Period to 10 to 14 June -2014)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 14-06-2014

Parameters	Day-1 10-06-14	Day-2 11-06-14	Day-3 12-06-14	Day-4 13-06-14	Day-5 14-06-14
Rain fall (mm)	0	5	7	0	16
Maximum temperature °C	34	34	33	33	33
Minimum temperature °C	28	28	27	27	27
Cloud cover (Okta)	2	4	2	1	2
RH % (Morning/After noon)	79-65	74-65	76-66	77-67	76-65
Wind speed (Kmph)	025	030	026	019	022
Wind direction(Deg)	150	160	180	220	220

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Peanut	Harvesting	<ul style="list-style-type: none"> • For the control of root rot, deep ploughing during summer, timely irrigation, fertilizers and integrated management for the minimizing the disease.
Ladies Finger	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of Shoot and fruit borer, spray neem seed extract 500ml or neem seed oil 50 ml/10 liter of water at 15 days interval (total 4 spray). Or DDVP 5ml or Indoxacarb 2 ml or Spinosad 2 gm/ 10 liter of water. ❖ For the control of mite, spray Ethion 20 ml/10 liter of water.
Chili	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of the disease <i>Colletotrichum capsici</i>, 3 spray of Mencozeb 75 % WP 40 gm and 10 gm Carbendenzim 50 %WP in 10 lit of water at 12 to 15 days interval.
Brinjal & Tomato	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For control of white fly, spray Dimethoate 0.03 % or Trozophos 0.04 % or Methyl-O-Demeton 0.025% or Aciphate 0.1% (10 ml/10lit water). ❖ For control of shoot and fruit borer, infested fruits and shoots should be collected and buried inside the soil. If pest population is high, spraying of spinosad 48 EC@1 ml/4 liter of water.
Pomegranate	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of fruit sucking moth, spray neem oil 40ml/10 lit. of water. ❖ For the control of thrips, Monocrotophos 10 ml or Methyl o demeton 10 ml or Acifet 15 gm or Trizophos 15 ml or Neem oil 40 ml in 10 liter of water at the base of plant.
Mango	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ❖ For the control of fruit fly, spray mixing of Fenthion 50 % E.C and Methyl euginol 10 ml in 10 liter of water.
Live stocks	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of tick, spray Deltamathrin or Amitaz 20 ml/10 liter of water. ➤ Increase the quantity of dry fodder.