

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
તા. ૧૧-૦૧-૨૦૧૭ થી તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૭

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૬-૧૭

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	0.00
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગે.)	27.9
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	14.3
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	69-35
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	3.9

પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૭ સુધી)

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનુસાર અતેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસૂમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર પેટ આબોહવાકીય વિસ્તારના ૧૦

૧. જૂનાગઢ:- જુલ્લામા આગામી તારીખ ૧૧/૦૧/૨૦૧૭ થી ૧૫/૦૧/૨૦૧૭ દરમ્યાન આકાશ મુખ્યત્વે ચોખ્યુ રહેશે, આગામી પાચ દિવસ દરમ્યાન વરસાદ પડવાની શક્યતા નહિંવત છે. પવનની ઝડપ ૧૮ થી ૨૮ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૨૭ થી ૨૮ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન ૧૨ થી ૧૨ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

૨. પોરબંદર:- જુલ્લામા આગામી તારીખ ૧૧/૦૧/૨૦૧૭ થી ૧૫/૦૧/૨૦૧૭ દરમ્યાન આકાશ મુખ્યત્વે ચોખ્યુ રહેશે, આગામી પાચ દિવસ દરમ્યાન વરસાદ પડવાની શક્યતા નહિંવત છે. પવનની ઝડપ ૧૮ થી ૨૮ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૨૬ થી ૨૭ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન ૧૧ થી ૧૩ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

જૂનાગઢ

હવામાન પરીબળો / તારીખ	દિવસ-૧ ૧૧.૦૧.૧૭	દિવસ-૨ ૧૨.૦૧.૧૭	દિવસ-૩ ૧૩.૦૧.૧૭	દિવસ-૪ ૧૪.૦૧.૧૭	દિવસ-૫ ૧૫.૦૧.૧૭
વરસાદ (મી.મી)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.શે)	27	27	27	28	28
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.શે)	12	12	10	11	11
વાદળની સ્થિતિ	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
સવારના ભેજના ટકા	51	42	39	40	46
બપોર બાદ ભેજના ટકા	39	33	25	27	31
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	28	22	19	19	26
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	20	26	27	51	19

પોરબંદર

વરસાદ (મી.મી)	0	0	0	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.શે)	27	27	26	26	27
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.શે)	11	11	12	12	13
વાદળની સ્થિતિ	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
સવારના ભેજના ટકા	49	39	39	41	46
બપોર બાદ ભેજના ટકા	38	30	24	28	29
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	28	20	18	19	27
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	22	28	35	43	20

દક્ષિણસૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાક્ય વિભાગ

પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/ જાત	કુષિ સલાહ
ઘઉ	કુટ / ગાભ અવસ્થા	જીડબલ્યુ-૧૮૦, ૪૬૬, ૩૬૬, ૧૭૩, લોક-૧,	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ઘઉમાં ઉધયના નિયંત્રણ માટે વાવતા પહેલા કલોરોપાયરીફોસ ૨૦ ઈ.સી. ૪૦૦ મીલી દવા ૫ લીટર પાણીમાં લેળવી ૧૦૦ કી.ગ્રા બિજ દીઠ માવજત આપવી. ❖ વાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ દિવસે નિદામણ નિયંત્રણ માટે ૨૦ મીલી ૨,૪ ડી. અથવા મેટસલ્ફ્યુરન મિથાઈલ ૦.૮ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ ઘઉમાં બુખરા ચુસીયા નો ઉપદ્રવ જણાય તો ૧૦ મીલી ડાયમીથોએટ અથવા ૫ મીલી ઈમીડાકલોપ્રાઇડ અથવા ૩ મીલી એસીટામીપ્રીડ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ ઘઉના પાકને કટોકટીની અવસ્થાએ એટલેકે વાવેતર બાદ તંતુમુળ કુટતી અવસ્થાએ અને કુટ અવસ્થાએ અને ગાભ અવસ્થાએ પીયત આપવું અને પીયત આપ્યા બાદ બાકીનો પુર્તી ખાતરનો જશ્શો આપવો.
ચણા	કુલ/વિકાસ અવસ્થા	ગુ.ચ.-૧,૨,૩, ઈ દાહોદ પીળા, ચાંદ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ચણાના પાકમાં લીલી ઈયળના નિયત્રણ માટે કવીનાલફોસ ૨૦ મીલી અથવા ડી.ડી.વી.પી. ૧૦ મીલી. ૧૦ લીટર પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. ❖ સમયસર વાવેલ ચણાના પાકમાં આંતરખેડ અને નીંદણની કામગીરી કરવી. ❖ મર્યાદિત પિયત અવસ્થા હોય તો પાકને કટોકટીની અવસ્થા જેવીકે ડાળો કુટવી, કુલ અવસ્થા તથા દાણા વિકાસની અવસ્થાએ પિયત આપવું.
લસણ	વિકાસ અવસ્થા	ગુ.લ.-૨,૩,૪, જી- ૪૧,૫૦,૨૮૨	<ul style="list-style-type: none"> ❖ લસણના પાકમાં ચુસીયા પ્રકારની જીવાત નિયત્રણ માટે ૫૦ મીલી ઈમીડાકલોપ્રાઇડ અથવા ૧૫ મીલી મિથાઈલ ઓ ડેમેટોન અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. ❖ લસણના પાકમાં સુકારો રોગના નિયત્રણ માટે ૨૫ ગ્રામ મેન્કોઝેબ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ લસણના પાકમાં આંતરખેડ અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી. ❖ લસણના પાકમાં વાયરવોર્મ ઈયળનો ઉપદ્રવ શરૂઆતમાં

			જોવા મળે તો ફોરેટ ૨૦ કી.ગ્રા.હે. આપી હળવુ પીયત આપવુ.
ધાણા	વિકાસ અવસ્થા	ગુ.ધાણા-૧, ૨	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ધાણાના પાકમાં બુકીછારાના નિયત્રણ માટે ડીનોકેપ ૧૦ મીલી અથવા ૮૦ % દ્રાવ્ય ગંધક ૩૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ૩૦૦ મેશ ગંધક ૨૦ થી ૨૫ કી.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર ઇસ્ટીંગ કરવુ. ❖ ધાણાના પાકમાં આંતરખેડ અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી.
જીરુના	વિકાસ અવસ્થા	ગુ. જીરુના- ૧,૨,૩,૪	<ul style="list-style-type: none"> ❖ જીરુના પાકમાં ચમ્ભી રોગના નિયત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૫ ગ્રામ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો ❖ જીરુના પાકમાં બુકીછારાના નિયત્રણ માટે ડીનોકેપ ૧૦ મીલી અથવા ૮૦ % દ્રાવ્ય ગંધક ૩૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ૩૦૦ મેશ ગંધક ૨૦ થી ૨૫ કી.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર ઇસ્ટીંગ કરવુ. ❖ જીરુના પાકમાં આંતરખેડ અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી. ❖ જીરુના પાકને જરૂરીયાત મુજબ પીયત આપવુ. ક્યારાને છેડ પાણી ભરાઈના રહે તે ખાસ ધ્યાન રાખવુ.
કપાસ	કુલ અવસ્થા/જીરુના અવસ્થા	બોલગાઈ-૧॥ જુસીએચ-૫, ૮,૧૨, જ્ય બીટા, સોલાર- ૬૬,૭૬, સરજુ, મલીકા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ કપાસના પાકમાં થ્રીપ્સ અને લીલા તડતડીયાના નિયત્રણ માટે ૩.૦ મીલી ફોસ્ફામીડોન અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ અથવા ૧૫ મીલી મીથાઇલ-ઓ-ડેમેટોન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ કપાસના પાકને એકાત્મરે પીયત આપવુ. કપાસ જેમ જેમ પાકતો જાય તેમ તેમ વીણી કરવી અને વીણી સવારના સમયે કરવી.
તુવેર	કુલ અને શીંગ અવસ્થા	બીડીએન-૨, વૈશાલી, જુટીએચ-૧,૨	<ul style="list-style-type: none"> ❖ તુવેરના પાકમાં ૫૦ % કુલ બેસવાની અવસ્થાએ ચુસીયા જીવાતના નિયત્રણ માટે ૧૫ મીલી પોલીટ્રીન અથવા ૨૦ ગ્રામ એસીફેટ અથવા ૫ મીલી ઇન્ડોક્ષાકાર્બ અથવા ૨૫ મીલી પ્રોફેનોફોસ દવાને ૧૦લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
એરંડા	પરીપક્વ અવસ્થા	જુએયુસીએચ- ૧, જુસીએચ- ૪,૫,૬,૭	<ul style="list-style-type: none"> ❖ એરંડાના પાકમાં થ્રીપ્સ, સફેદ માખી અને લીલા તડતડીયાના નિયત્રણ માટે ૩૦ મીલી દ્રાઇઝોફેસ અથવા ૩.૦ મીલી ફોસ્ફામીડોન અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ અથવા ૧૫ મીલી મીથાઇલ-ઓ-ડેમેટોન દવા ૧૦ લીટર

			<p>પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ દિવેલાના પાકમાં માળો (લુમો) પરીપકવ થયે કાળજી પુર્વક ઉતારી લેવા. દિવેલાના પાકમાં કાપણી માટે માળ પીડા પડે અને ૭૫ % સુકાય જાય ત્યારે કરવી અને આરીતે ૩ વખત કાપણી કરી માળ તડકામાં સુકવી શ્રેસ્ટિંગ કરવુ જેથી ખરવાનો પ્રક્રિયા ન રહે.
શાકભાજુ	વૃદ્ધી/કુલા/ફળ	-	<ul style="list-style-type: none"> ❖ વેલાવાળા શાકભાજુના પાકમાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ ટાજવા માટે મુખ્ય પાકની ફરતે દિવેલા તથા ગલગોટાનું વાવેતર કરવાથી તેનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે જો ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે તો ૧૦ મીલી મીથાઈલ ઓ ડેમેટોન (૨૫ ઈસી) અથવા ૧૦ મીલી ડાયમીથોએટ (૩૦ ઈસી) ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો ત્યાર બાદ પછીથી બિજો છંટકાવ ૧૫ દિવસ પછી કરવો. ❖ શાકભાજુના પાકમાં ચુસીયા પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનું મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્પ્રાઇડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. અથવા દ્રાવણોઝેસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી.પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. ❖ મરચીના પાકમાં થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ૧૦ મીલી દ્રાવણોઝેસ (૪૦ ઈસી) અથવા ૩ મીલી ઈમીડાકલોપ્રાઇડ (૧૭.૮ એસએલ) તથા પાનકથીરીના નિયંત્રણ માટે ૧૦ મીલી ફેનાક્ઝાક્વીન (૧૦ ઈસી) અથવા ૧૦ મીલી પ્રોપરગાઈટ અથવા ૨૦ ગ્રામ વેટેબલ સલ્ફર ૧૦ લીટર પાણી મિશ્રણ કરી છાંટવી. ❖ શાકભાજુના પાકની રોપણી બાદ ચુસીયા પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ માટે દાણાદાર ઝોરેટ ૧૦ જી છોડ દીઠ ૨ ગ્રામ મુજબ આપીને પીયત આપવુ. ❖ મરચીના પાકમાં વાઈરસના કારણે પીળા થઈ ફુકડાઈ ગયેલ છોડ ઉપાડી જમીનમાં દાટી નાશ કરવો અને ૫ મીલી ઈમીડાકલોપ્રાઇડ ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ શાકભાજુના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવુ અને નિયમીત પીયત આપવુ. શાકભાજુ ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડિંગ કરી

			બજારમાં મુકવા.
પશુપાલન		-	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો અને પશુઓના રહેઠાણા ચોખ્યા રાખવા અને માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવુ. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. ❖ શિયાળા ત્રૂતુમાં અતિશય ઠંડા સીધા પવનથી રક્ષણ માટે પશુઓને શેડમાં બાંધવા અને કંતાન કોથળાનો ઉપયોગ કરવો.

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 10-01-2016

(Period from 11 to 15 January -2017)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	0.00
Maximum temperature °C	27.0-29.1
Minimum temperature °C	12.4-15.4
RH % (Morning/Afternoon)	69-35
Wind speed (Kmph)	2.8-5.7
Cloud cover	0-3

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 15-01-2017

Parameters	Day-2 11-01-17	Day-3 12-01-17	Day-4 13-01-17	Day-4 14-01-17	Day-5 15-01-17
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	27	27	27	28	28
Minimum temperature °C	12	12	10	11	11
Cloud cover (Okta)	0	0	0	0	0
RH I % (Morning)	51	42	39	40	46
RH II % (After noon)	39	33	25	27	31
Wind speed (Km/h)	28	22	19	19	26
Wind direction(Deg)	20	26	27	51	19

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall Temperature RH (%) Wind Direction and Wind Speed	There is no forecasting of rainfall during next five days. Maximum and minimum temperature likely to be in range of 27-28°C and 10-12°C, respectively. The Relative Humidity is likely to be in the range of 51-25%. Direction and speed of wind is likely to be NNE and 19-28 km/h, respectively.		
Crop	Variety/ pest/insect	Stage	Agro met Advisories	
Wheat	GW- 190,496,366,173 , Lok-1	Tillering/ Booting	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of termite, seed should be treated with 5 liter chloropyriphos (20 EC) in 100 kg of seeds before sowing. ➤ At 30-35 days after sowing spray 20 ml 2-4-D ethyle easter or Metasulfuron 0.8 gm/10 liters of water to control broad leafy weeds in wheat crop. ➤ For the control of brown hopper, spray 10 ml Dimethoate Or 5 ml Imidaclopride Or 3 ml 	

			<p>Acetamipride mix in 10 liter of water.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apply irrigation at CRI (Crown Root Initiation), Tillering and Booting stage and after apply split application of N fertilizer.
Chickpea	GC-1, 2, 3, Dahod yellow, Chaffa	Vegetative /Flowering	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of <i>Helicoverpa armigera</i>, spray quinalphos 20 ml Or DDVP 10 ml in 10 liter of water. ➤ Carry out weeding and inter culturing operations in timely sown chickpea. ➤ Under limited water condition chickpea should be irrigated during vegetative, flowering and pod formation stage without fail.
Garlic	GG- 2,3,4, G-41,50, 282	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of sucking pest, spray 5 ml Imidaclopride OR 15 ml methyl-O-demeton Or 15 ml diamethoate in 10 liter of water. ➤ For the control of wilt, spray 25 gm Mencozeb in 10 liter of water. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in garlic. ➤ For the control of wire worm, soil application of phorate (10 G) 20 kg/ha and after apply irrigation.
Coriander	Guj. Coriander 1,2	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of powdery mildew, spray dinocap 10 ml Or 80 % wettable sulphur 30 gm mix with 10 liter of water. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in coriander.
Cumin	GC-1,2,3,4	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> ➤ During warm humid weather condition incidence of alternaria blight, spray 25 gm mencozeb mix in 10 liter of water. ➤ For the control of powdery mildew, spray dinocap 10 ml Or 80 % wettable sulphur 30 gm mix with 10 liter of water. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in cumin. ➤ Apply irrigation to the crop at the development stage. Due to excess irrigation the crop suffer

			disease.
Cotton	Bg-II GCH-8, 12 Jay Bt, Solar-66, 76, Sarju, Bg- II GCH-6, Mallika	Ball formation	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Picking of cotton should be carried out during morning hours.
Pigeon pea	BDN-2, Vaishali, GTH-1	Flowering/ Pod formation	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of sucking pest at 50 % flowering, spray 15 ml politrin OR 20 gm acephate OR 50 ml endoxacarb OR 25 ml profenophos in 10 liter of water.
Castor	GAUCH-1, GCH-4,5,6,7, GC-2,3	Capsule formation/ maturing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of Thrips, white fly and Jassid, spray 30 ml Trizophos OR 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water. ➤ The matured clusters should be picked in time.
Vegetable crops	-	Flowering/ fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of leaf webber in fruit leafy vegetable, sowing of trap crop (castor and galgota) around the vegetable crop. For the heavy incidence spray 10 ml methyl O demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 10 liter of water. ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ For the control of attack of thrips in chilli, spray 10 ml trizophos Or 3 ml imidaclopride (17.8 SL) AND for the control of kathiri, spray 10 ml propergauid (10 EC) Or 20 gm wettable sulphur in 10 litres of water. ➤ After transplanting of capsicum for the incidence of sucking pest, for the control 10 G granule phorate 2 gm per plant at apply with irrigation. ➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of

			<p>water at 15 days interval.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rouging of viral infested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of 5 m Imidacloprid l per 10 litre of water is advised for control the vector, when sky remains clear. ➤ Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the flowering and fruiting stage. ➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.
Livestock		-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To provide adequate food and keep the animals clean shed. Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitzaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Protection of animal due to the cold winter season cattle transfer to the shed.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date:- 10-01-2017

(Period from 11 to 15 January -2017)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 15-01-2017

Parameters	Day-2 11-01-17	Day-3 12-01-17	Day-4 13-01-17	Day-4 14-01-17	Day-5 15-01-17
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	27	27	26	26	27
Minimum temperature °C	11	11	12	12	13
Cloud cover (Okta)	0	0	0	0	0
RH I % (Morning)	49	39	39	41	46
RH II % (After noon)	38	30	24	28	29
Wind speed (Km/h)	28	20	18	19	27
Wind direction(Deg)	22	28	35	43	20

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall	There is no forecasting of rainfall during next five days.		
	Temperature	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 26-27°C and 11-13°C, respectively.		
	RH (%)	The Relative Humidity is likely to be in the range of 49-24 %.		
	Wind Direction and Wind Speed	Direction and speed of wind is likely to be NNE and 18-28 km/h, respectively.		
Crop	Variety/ pest/insect	Stage	Agro met Advisories	
Wheat	GW- 190,496,366,173 , Lok-1	Tillering/ Booting	<ul style="list-style-type: none"> ➢ For the control of termite, seed should be treated with 5 liter chloropyriphos (20 EC) in 100 kg of seeds before sowing. ➢ At 30-35 days after sowing spray 20 ml 2-4-D ethyle easter or Metasulfuron 0.8 gm/10 liters of water to control broad leafy weeds in wheat crop. ➢ For the control of brown hopper, spray 10 ml Dimethoate Or 5 ml Imidaclopride Or 3 ml Acetamiprid mix in 10 liter of water. ➢ Apply irrigation at CRI (Crown Root Initiation), Tillering and Booting stage and after apply split application of N fertilizer. 	
Chickpea	GC-1, 2, 3, Dahod yellow, Chaffa	Vegetative /Flowering	<ul style="list-style-type: none"> ➢ For the control of <i>Helicoverpa armigera</i>, spray quinalphos 20 ml Or DDVP 10 ml in 10 liter of water. 	

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carry out weeding and inter culturing operations in timely sown chickpea. ➤ Under limited water condition chickpea should be irrigated during vegetative, flowering and pod formation stage without fail.
Garlic	GG- 2,3,4, G-41,50, 282	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of sucking pest, spray 5 ml Imidaclopride OR 15 ml methyl-O-demeton Or 15 ml diamethoate in 10 liter of water. ➤ For the control of wilt, spray 25 gm Mencozeb in 10 liter of water. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in garlic. ➤ For the control of wire worm, soil application of phorate (10 G) 20 kg/ha and after apply irrigation.
Coriander	Guj. Coriander 1,2	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of powdery mildew, spray dinocap 10 ml Or 80 % wettable sulphur 30 gm mix with 10 liter of water. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in coriander.
Cumin	GC-1,2,3,4	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> ➤ During warm humid weather condition incidence of alternaria blight, spray 25 gm mencozeb mix in 10 liter of water. ➤ For the control of powdery mildew, spray dinocap 10 ml Or 80 % wettable sulphur 30 gm mix with 10 liter of water. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in cumin. ➤ Apply irrigation to the crop at the development stage. Due to excess irrigation the crop suffer disease.
Cotton	Bg-II GCH-8, 12 Jay Bt, Solar- 66, 76, Sarju, Bg- II GCH-6, Mallika	Ball formation	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Picking of cotton should be carried out during morning hours.

Pigeon pea	BDN-2, Vaishali, GTH-1	Flowering/ Pod formation	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of sucking pest at 50 % flowering, spray 15 ml politrin OR 20 gm acephate OR 50 ml endoxacarb OR 25 ml profenophos in 10 liter of water.
Castor	GAUCH-1, GCH-4,5,6,7, GC-2,3	Capsule formation/ maturing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of Thrips, white fly and Jassid, spray 30 ml Trizophos OR 3 ml phosphamidon OR 15 ml dimethoate OR 15 ml methyl-O-demeton mix in 10 liter of water. ➤ The matured clusters should be picked in time.
Vegetable crops	-	Flowering/ fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of leaf webber in fruit leafy vegetable, sowing of trap crop (castor and galgota) around the vegetable crop. For the heavy incidence spray 10 ml methyl O demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 10 liter of water. ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ For the control of attack of thrips in chilli, spray 10 ml trizophos Or 3 ml imidaclopride (17.8 SL) AND for the control of kathiri, spray 10 ml propergauid (10 EC) Or 20 gm wettable sulphur in 10 litres of water. ➤ After transplanting of capsicum for the incidence of sucking pest, for the control 10 G granule phorate 2 gm per plant at apply with irrigation. ➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Rouging of viral infested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of 5 m Imidacloprid I per 10 litre of water is advised for control the vector, when sky remains clear.

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the flowering and fruiting stage. ➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.
Livestock		-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To provide adequate food and keep the animals clean shed. Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Protection of animal due to the cold winter season cattle transfer to the shed.