



75
આજાદીકા
અમૃત મહોત્સવ

ગ્રામીણકૃષિ મૌસમ સેવા
કૃષિ હવામાન સેલ
કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
જૂનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ઈમેઈલ:-amfujnd@yahoo.com ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯



G20
ભારત 2023 INDIA

હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં જૂનાગઢ જીલ્લા માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(કૃષિ હવામાન સેલ, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

વાર:- શુક્રવાર

તારીખ:-૧૧/૦૪/૨૦૨૫

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૦૪(૨૦૨૪-૨૫)

પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૦૫ થી ૦૯ એપ્રિલ, ૨૦૨૫)					હવામાન પરિબલો	હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૧૨ થી ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૫) માન્ય ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૫. સવારના ૮:૩૦ વાગ્યાં સુધી				
૦૫/૦૪	૦૬/૦૪	૦૭/૦૪	૦૮/૦૪	૦૯/૦૪	તારીખ	૧૨/૦૪	૧૩/૦૪	૧૪/૦૪	૧૫/૦૪	૧૬/૦૪
૦	૦	૦	૦	૦	વરસાદ(મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦
૪૧.૦	૪૧.૩	૪૨.૦	૪૨.૨	૪૨.૫	મહત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૪૦	૪૦	૪૦	૪૧	૪૩
૨૦.૨	૨૫.૮	૨૬.૬	૨૩.૮	૨૪.૦	લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૨૩	૨૪	૨૫	૨૫	૨૫
ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	વાદળની સ્થિતિ	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
૭૨	૪૪	૪૨	૩૯	૨૯	સવારના ભેજના ટકા	૭૦	૭૦	૬૦	૬૦	૬૦
૧૧	૧૨	૧૨	૧૩	૧૧	બપોરબાદના ભેજના ટકા	૨૫	૩૦	૨૫	૨૫	૨૫
૪.૨	૫.૨	૫.૯	૬.૩	૫.૩	પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૧	૧૨	૯	૯	૧૦
૩૨૦	૩૪૦	૩૨૦	૦૭	૨૩૦	પવનની દિશા	૩૩૭	૩૨૮	૨૯૭	૨૭૫	૨૬૮

સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહિતી અનુસાર અત્રેનાં ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છેકે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના જૂનાગઢ જીલ્લામાં આગામી તારીખ ૧૨/૦૪/૨૦૨૫ થી ૧૬/૦૪/૨૦૨૫ દરમિયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં મુખ્યત્વે ચોખ્ખું થી મોટેભાગે ચોખ્ખું રહેશે, જીલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નહિવત છે. પવનની ઝડપ ૦૯ થી ૧૨ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન ૪૦ થી ૪૩ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન ૨૩ થી ૨૫ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

✦ માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ જુનાગઢ જિલ્લામાં ૨૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ થી ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫ નાં સમયગાળા દરમિયાન હળવી સૂકી સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.

✦ સાપ્તાહિક હવામાન આગાહીની સૂચી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનાં વિસ્તારોમાં તા.૧૬/૦૪/૨૦૨૫ થી તા. ૨૨/૦૪/૨૦૨૫ દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય થી ઉપર & મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય થી નીચે અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતાઓ છે.

✦ મેઘદૂત એપ્લિકેશન:-કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારીમેળવવામાટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત એપ્લિકેશન કે જે ખેડૂતોને તેમનીસ્થાનિક ભાષામાંસ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.

મેઘદૂત એપ્લિકેશનનેડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

એન્ડ્રોઈડ(મોબાઈલ)ઉપયોગકર્તા:<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>


આઈ.ઓ.એસ.ઉપયોગકર્તા:<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

❖ શિયાળુ પાકોની કાપણી થઈ ગયા બાદ આખા ખેતરનુ અવલોકન કરી જમીનના નમુના લેવા અને પૃથ્થકરણ કરવા માટે લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવા.

❖ ઉનાળું ઋતુમાં જમીનમાં ઉંડી ખેડ કરવી જેથી રોગ અને કીટકોની જુદી જુદી અવસ્થાએ સુર્યતાપ સામે ખુલ્લી થતા નાશ પામે.

❖ સમયસર વાવેલ ઉનાળુ પાકોમાં આંતરખેડ અને નીંદણની કામગીરી કરવી.

❖ વર્તમાન ગરમ હવામાનને પગલે ઉનાળુ શાકભાજી, મગફળી, તલ અને ઘાસચારાના પાકોને સાંજના સમયે જરૂરિયાત મુજબ હળવું પીયત આપવું.



પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ / જીવાત / જાત	કૃષિ સલાહ
---------------	---------------	----------------------	-----------

ઉનાળું મગફળી	ફૂલ / સૂયા / ડોડવા	ચૂસીયા જીવાત / લશ્કરી ઈયળ અને લીલી ઈયળ	❖ પાકને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ મગફળીમાં ચુસીયા, મોલોમશી, થ્રીપ્સ ના નિયંત્રણ માટે ફોસ્ફામીડોન ૩ મીલી દવા અથવા ડાયમીથોએટ ૧૫ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. મોલોમશી સાથે દાળીયા જીવાત જોવા મળે તો દાવાનો છંટકાવ મુલતવી રાખવો. ❖ મગફળીના પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણ કરવું. ❖ લશ્કરી ઈયળ અને લીલી ઈયળના નિયંત્રણ માટે ક્વીનાલફોસ ૨૫ ઇસી અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી અથવા ફ્લુબેન્ડીયામાઈડ ૨૦ ડબલ્યુ.જી. અથવા નોવાલ્યુરોન ૫.૨૫+ ઇન્ડોક્ઝાકાર્બ ૪.૫૦ એસ.સી. મુજબ છંટકાવ કરવો. ❖ ચુસીયા જીવાતો માટે લેમડા-સાયહેલોથ્રીન ૫ ઇ.સી. અથવા ઈમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ.એલ. અથવા થાયામીથોક્ઝામ ૧૨.૬૦ + લેમડા-સાયહેલોથ્રીન ૯.૫૦ ઝેડ.સી. નો છંટકાવ કરવો.
ઉનાળું મગ	વૃદ્ધિ / ફૂલ	ચૂસીયા જીવાત / પાનનાં ટપકા / પંચ રંગિયો	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ ચૂસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાનું તેલ @૫ મિલી/ લીટર મુજબ છાંટવું. ❖ પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી. ❖ પાનનાં ટપકા નાં રોગની શરૂઆત થયે મેટીરામ ૫૫% + પાયરેકલોસ્ટ્રોબીન ૫% ડબલ્યુજી ૩૦ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા ટેબ્યુકોનાઝોલ ૨૫.૯ ટકા અથવા હેકઝાકોનાઝોલ ૫ ટકા ૧૦ મિલી/૧૦ લિટર મુજબ છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં પંચ રંગિયાના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથીઓટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિલી/૧૦લી નો છંટકાવ કરવો.
ઉનાળું અડદ	વૃદ્ધિ / ફૂલ	ચૂસીયા જીવાત / પાનનાં ટપકા / પંચ રંગિયો	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ ચૂસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાનું તેલ @૫ મિલી/ લીટર મુજબ છાંટવું. ❖ પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી. ❖ પાનનાં ટપકા નાં રોગની શરૂઆત થયે મેટીરામ ૫૫% + પાયરેકલોસ્ટ્રોબીન ૫% ડબલ્યુજી ૩૦ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા ટેબ્યુકોનાઝોલ ૨૫.૯ ટકા અથવા હેકઝાકોનાઝોલ ૫ ટકા ૧૦

			મિલી/૧૦ લિટર મુજબ છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં પંચ રંગિયાના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથીઓટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિલી/૧૦લી નો છંટકાવ કરવો.
ઉનાળું તલ	વૃદ્ધિ / ફૂલ	તડતડિયા / સફેદમાખી / પાન વાળનારી ઇયળ	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ પાકમાં તડતડિયા અને સફેદમાખીનાં નિયંત્રણ માટે ઓક્ઝીડીમેટોન - મિથાઈલ ૨૫ ઇ.સી.નો છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી. ❖ લીમડાની લીમ્બોડીના મીંજનો ભૂકો ૩% (૩૦૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી)ના બે છંટકાવ પાન વાળનારી ઇયળના નિયંત્રણ માટે કરવા.
આંબા	ફૂલ / ફળ અવસ્થા	મધીયા & ભુકીછારા	❖ આંબામાં મધીયાના નિયંત્રણમાટે ૫૦ % કાર્બારીલ ૪૦ ગ્રામ પાવડર અથવા ૩૬ % ઇ.સી. મોનોક્રોટોફોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લી.પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ આંબામાં ભુકીછારા ના નિયંત્રણ માટે ૧૦ લી. પાણીમાં ૩૦ ગ્રામ દ્રાવ્ય ગંધક + કેરેથોન ૪૮ % ઇ.સી. ૧૦ મીલી દવાનો છંટકાવ કરવો. ❖ આંબાને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી.
શાકભાજી	વૃદ્ધી/ફુલ/ ફળ	-	❖ શાકભાજીના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવું. શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા. ❖ પાકને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ આગાહી સમયગાળા દરમિયાન ખેતર પરનાં બધાં ખેતકાર્યો કરવા.
પશુપાલન	-	-	❖ દિવસનું તાપમાન વધી રહ્યું હોવાથી, ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે જરૂરી પગલા લેવા અને પશુઓને ગરમીના તણાવથી બચાવવા. તેઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે બપોરનાસમય દરમિયાન જમીનની તૈયારી અને ખેડની કામગીરીને ટાળો અને બપોરથી સાંજ સુધી પ્રાણીઓને આરામ આપો. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો & પીવા માટે ચોખ્ખું પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા. ❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવું. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાંખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો.❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.❖ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા. |
|--|--|--|--|

યાંત્રિક અધિકારી
ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
જી.કૃ.યુ. જુનાગઢ

AMFU, JAU, Junagadh



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
કૃષિ હવામાન સેલ
કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
જૂનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ઈમેઈલ:-amfujnd@yhaoo.com ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯



હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં પોરબંદર જીલ્લા માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(કૃષિ હવામાન સેલ, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

વાર:- શુક્રવાર

તારીખ: ૧૧/૦૪/૨૦૨૫

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૦૪ (૨૦૨૪-૨૫)

પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૦૬ થી ૧૦ એપ્રિલ, ૨૦૨૫)					હવામાન પરિબળો	હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૧૨ થી ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૫) માન્ય ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૫. સવારના ૮:૩૦ વાગ્યાં સુધી				
૦૬/૦૪	૦૭/૦૪	૦૮/૦૪	૦૯/૦૪	૧૦/૦૪	તારીખ	૧૨/૦૪	૧૩/૦૪	૧૪/૦૪	૧૫/૦૪	૧૬/૦૪
૦	૦	૦	૦	૦	વરસાદ(મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦
૪૦.૦	૩૭.૭	૩૮.૦	૩૯.૪	૪૩.૦	મહત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૩૭	૩૮	૩૮	૩૯	૩૯
૨૨.૮	૨૩.૮	૨૨.૮	૨૧.૬	-	લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૨૬	૨૬	૨૬	૨૭	૨૭
ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	વાદળની સ્થિતિ	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
૪૬	૫૪	૮૭	૭૪	-	સવારના ભેજના ટકા	૮૦	૮૦	૮૦	૭૫	૭૫
૩૯	૪૭	૨૪	૨૫	૬૨	બપોરબાદના ભેજના ટકા	૭૫	૭૫	૭૦	૬૦	૬૦
૧૪.૮	૨૨.૨	૧૧.૧	૭.૪	૧૮.૫	પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	૧૪	૧૭	૧૨	૧૨	૧૫
૩૪૦	૩૪૦	૩૨૦	૩૪૦	૨૭૦	પવનની દિશા	૩૩૨	૩૧૯	૨૯૦	૨૭૪	૨૬૬

સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના પોરબંદર જીલ્લામાં આગામી તારીખ ૧૨/૦૪/૨૦૨૫ થી ૧૬/૦૪/૨૦૨૫ દરમિયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં મુખ્યત્વે ચોખ્ખું થી મોટેભાગે ચોખ્ખું રહેશે, જીલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નહિવત છે. પવનની ઝડપ ૧૨ થી ૧૭ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન ૩૭ થી ૩૯ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન ૨૬ થી ૨૭ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

✚ માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ પોરબંદર જિલ્લામાં ૨૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ થી ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫ નાં સમયગાળા દરમિયાન હળવી સૂકી સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.

✚ સાપ્તાહિક હવામાન આગાહીની સૂચી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનાં વિસ્તારોમાં તા.૧૬/૦૪/૨૦૨૫ થી તા. ૨૨/૦૪/૨૦૨૫ દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય થી ઉપર & મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય થી નીચે અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતાઓ છે.

✚ મેઘદૂત એપ્લિકેશન:-કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારી મેળવવામાટે **ડાઉનલોડ** કરો મેઘદૂત એપ્લિકેશન કે જે ખેડૂતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.

મેઘદૂત એપ્લિકેશનને **ડાઉનલોડ** કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

એન્ડ્રોઈડ(મોબાઈલ)ઉપયોગકર્તા:-<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>


આઈ.ઓ.એસ.ઉપયોગકર્તા:-<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

❖ શિયાળુ પાકોની કાપણી થઈ ગયા બાદ આખા ખેતરનુ અવલોકન કરી જમીનના નમુના લેવા અને પૃથ્થકરણ કરવા માટે લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવા.

❖ ઉનાળું ઋતુમાં જમીનમાં ઉંડી ખેડ કરવી જેથી રોગ અને કીટકોની જુદી જુદી અવસ્થાએ સુર્યતાપ સામે ખુલ્લી થતા નાશ પામે.

❖ સમયસર વાવેલ ઉનાળુ પાકોમાં આંતરખેડ અને નીંદણની કામગીરી કરવી.

❖ વર્તમાન ગરમ હવામાનને પગલે ઉનાળુ શાકભાજી, મગફળી, તલ અને ઘાસચારાના પાકોને સાંજના સમયે જરૂરિયાત મુજબ હળવું પીયત આપવું.



પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ / જીવાત / જાત	કૃષિ સલાહ
ઉનાળું મગફળી	ફૂલ / સૂચા / ડોડવા	યૂસીયા જીવાત / લશ્કરી ઈયળ	❖ પાકને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી.

		અને લીલી ઈંચળ	❖ મગફળીમાં ચુસીયા, મોલોમશી, થ્રીપ્સ ના નિયંત્રણ માટે ફોસ્ફામીડોન ૩ મીલી દવા અથવા ડાયમીથોએટ ૧૫ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. મોલોમશી સાથે દાળીયા જીવાત જોવા મળે તો દાવાનો છંટકાવ મુલતવી રાખવો. ❖ મગફળીના પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણ કરવું. ❖ લશ્કરી ઈંચળ અને લીલી ઈંચળના નિયંત્રણ માટે કવીનાલફોસ ૨૫ ઇસી અથવા કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી અથવા ફ્લુબેન્ડીયામાઈડ ૨૦ ડબલ્યુ.જી. અથવા નોવાલ્યુરોન ૫.૨૫+ ઇન્ડોકઝાકાર્બ ૪.૫૦ એસ.સી. મુજબ છંટકાવ કરવો. ❖ ચુસીયા જીવાતો માટે લેમડા-સાયહેલોથ્રીન ૫ ઇ.સી. અથવા ઈમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ.એલ. અથવા થાયામીથોક્ઝામ ૧૨.૬૦ + લેમડા-સાયહેલોથ્રીન ૯.૫૦ ઝેડ.સી. નો છંટકાવ કરવો.
ઉનાળું મગ	વૃદ્ધિ / ફૂલ	ચૂસીયા જીવાત / પાનનાં ટપકા / પંચ રંગિયો	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ ચૂસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાનું તેલ @૫ મિલી/ લીટર મુજબ છાંટવું. ❖ પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી. ❖ પાનનાં ટપકા નાં રોગની શરૂઆત થયે મેટીરામ ૫૫% + પાયરેકલોસ્ટ્રોબીન ૫% ડબલ્યુજી ૩૦ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા ટેબ્યુંકોનાઝોલ ૨૫.૯ ટકા અથવા હેકઝાકોનાઝોલ ૫ ટકા ૧૦ મિલી/૧૦ લિટર મુજબ છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં પંચ રંગિયાના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથીઓટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિલી/૧૦લી નો છંટકાવ કરવો.
ઉનાળું અડદ	વૃદ્ધિ / ફૂલ	ચૂસીયા જીવાત / પાનનાં ટપકા / પંચ રંગિયો	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ ચૂસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાનું તેલ @૫ મિલી/ લીટર મુજબ છાંટવું. ❖ પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી. ❖ પાનનાં ટપકા નાં રોગની શરૂઆત થયે મેટીરામ ૫૫% + પાયરેકલોસ્ટ્રોબીન ૫% ડબલ્યુજી ૩૦ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા ટેબ્યુંકોનાઝોલ ૨૫.૯ ટકા અથવા હેકઝાકોનાઝોલ ૫ ટકા ૧૦

			મિલી/૧૦ લિટર મુજબ ઇંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં પંચ રંગિયાના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથીઓટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિલી/૧૦લી નો ઇંટકાવ કરવો.
ઉનાળું તલ	વૃદ્ધિ / ફૂલ	તડતડિયા / સફેદમાખી / પાન વાળનારી ઇયળ	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ પાકમાં તડતડિયા અને સફેદમાખીનાં નિયંત્રણ માટે ઓક્ઝીડીમેટોન - મિથાઈલ ૨૫ ઇ.સી.નો ઇંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી. ❖ લીમડાની લીમ્બોડીના મીંજનો ભૂકો ૩% (૩૦૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી)ના બે ઇંટકાવ પાન વાળનારી ઇયળના નિયંત્રણ માટે કરવા.
આંબા	ફૂલ / ફળ અવસ્થા	મધીયા & ભુકીછારા	❖ આંબામાં મધીયાના નિયંત્રણમાટે ૫૦ % કાર્બારીલ ૪૦ ગ્રામ પાવડર અથવા ૩૬ % ઇ.સી. મોનોક્રોટોફોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લી.પાણીમાં ભેળવી ઇંટકાવ કરવો. ❖ આંબામાં ભુકીછારા ના નિયંત્રણ માટે ૧૦ લી. પાણીમાં ૩૦ ગ્રામ દ્રાવ્ય ગંધક + કેરેથોન ૪૮ % ઇ.સી. ૧૦ મીલી દવાનો ઇંટકાવ કરવો. ❖ આંબાને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી.
શાકભાજી	વૃદ્ધિ/ફૂલ/ ફળ	-	❖ શાકભાજીના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવું. શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા. ❖ પાકને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ આગાહી સમયગાળા દરમિયાન ખેતર પરનાં બધાં ખેતકાર્યો કરવા.
પશુપાલન	-	-	❖ દિવસનું તાપમાન વધી રહ્યું હોવાથી, ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છેકે જરૂરી પગલા લેવા અને પશુઓને ગરમીના તણાવથી બચાવવા. તેઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે બપોરનાસમય દરમિયાન જમીનની તૈયારી અને ખેડની કામગીરીને ટાળો અને બપોરથી સાંજ સુધી પ્રાણીઓને આરામ આપો. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો & પીવા માટે યોખ્ખું પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા. ❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવું.

			❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાંખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ. ❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. ❖ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.
--	--	--	--

યાંત્રિક અધિકારી
ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
જી.કૃ.યુ. જુનાગઢ

AMFU, JAU, Junagadh



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
કૃષિ હવામાન સેલ
કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
જૂનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧
ઈમેઈલ:-amfujnd@yhao.com ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૯



હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં ગીર સોમનાથ જીલ્લા માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(કૃષિ હવામાન સેલ, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

વાર:- શુક્રવાર

તારીખ:-૧૧/૦૪/૨૦૨૫

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૦૪ (૨૦૨૫-૨૬)

પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૦૬ થી ૧૦ એપ્રિલ, ૨૦૨૫)					હવામાન પરિબલો	હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૧૨ થી ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૫) માન્ય ૧૬ એપ્રિલ, ૨૦૨૫ સવારના ૮:૩૦ વાગ્યાં સુધી				
૦૬/૦૪	૦૭/૦૪	૦૮/૦૪	૦૯/૦૪	૧૦/૦૪	તારીખ	૧૨/૦૪	૧૩/૦૪	૧૪/૦૪	૧૫/૦૪	૧૬/૦૪
૦	૦	૦	૦	૦	વરસાદ (મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦
૩૧.૨	૩૧.૮	૩૬.૦	૩૨.૫	૩૬.૮	મહત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૩૩	૩૩	૩૪	૩૬	૩૬
૨૩.૩	૨૪.૪	૨૪.૬	૨૪.૯	-	લઘુત્તમ તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૨૭	૨૭	૨૭	૨૮	૨૮
ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	વાદળની સ્થિતિ	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
૮૩	૭૨	૭૨	૭૩	-	સવારના ભેજના ટકા	૮૫	૮૫	૮૦	૭૫	૭૫
૭૬	૪૮	૬૭	૪૧	૭૨	બપોરબાદના ભેજના ટકા	૭૫	૭૫	૭૫	૬૫	૬૫
-	-	-	૩.૭	૫.૬	પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	૧૭	૧૭	૧૪	૧૩	૯
-	-	-	૯૯	૨૯	પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૩૩૫	૩૩૦	૩૧૨	૨૯૫	૨૭૯

સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશ્રી ના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવેછે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના ગીર સોમનાથ જીલ્લામાં આગામી તારીખ ૧૨/૦૪/૨૦૨૫ થી ૧૬/૦૪/૨૦૨૫ દરમિયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી દિવસોમાં મુખ્યત્વે ચોખ્ખું થી મોટેભાગે ચોખ્ખું રહેશે, જીલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નહિવત છે. પવનની ઝડપ ૦૯ થી ૧૭ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતાઓ રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન ૩૩ થી ૩૬ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન ૨૭ થી ૨૮ ડીગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

✦ માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ૨૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ થી ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫ નાં સમયગાળા દરમિયાન હળવી સૂકી સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.

✦ સાપ્તાહિક હવામાન આગાહીની સૂચી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનાં વિસ્તારોમાં તા.૧૬/૦૪/૨૦૨૫ થી તા. ૨૨/૦૪/૨૦૨૫ દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય થી ઉપર & મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય થી નીચે અને લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતાઓ છે.


✦ મેઘદૂત એપ્લિકેશન:-કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારી મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો મેઘદૂત એપ્લિકેશન કે જે ખેડૂતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.

મેઘદૂત એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

એન્ડ્રોઈડ(મોબાઈલ)ઉપયોગકર્તા:-<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

આઈ.ઓ.એસ.ઉપયોગકર્તા:-<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ શિયાળુ પાકોની કાપણી થઈ ગયા બાદ આખા ખેતરનું અવલોકન કરી જમીનના નમુના લેવા અને પૃથ્થકરણ કરવા માટે લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવા.
- ❖ ઉનાળું ઋતુમાં જમીનમાં ઉંડી ખેડ કરવી જેથી રોગ અને કીટકોની જુદી જુદી અવસ્થાએ સુર્યતાપ સામે ખુલ્લી થતા નાશ પામે.
- ❖ સમયસર વાવેલ ઉનાળુ પાકોમાં આંતરખેડ અને નીંદણની કામગીરી કરવી.
- ❖ વર્તમાન ગરમ હવામાનને પગલે ઉનાળુ શાકભાજી, મગફળી, તલ અને ઘાસચારાના પાકોને સાંજના સમયે જરૂરિયાત મુજબ હળવું પીયત આપવું.



પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ / જીવાત / જાત	કૃષિ સલાહ
ઉનાળું	ફૂલ / સૂચા /	ચૂસીયા જીવાત	❖ પાકને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી.

મગફળી	ડોડવા	/ લશ્કરી ઈયળ અને લીલી ઈયળ	❖ મગફળીમાં ચુસીયા, મોલોમશી, થ્રીપ્સ ના નિયંત્રણ માટે ફોસ્ફામીડોન ૩ મીલી દવા અથવા ડાયમીથોએટ ૧૫ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. મોલોમશી સાથે દાળીયા જીવાત જોવા મળે તો દાવાનો છંટકાવ મુલતવી રાખવો. ❖ મગફળીના પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણ કરવું. ❖ લશ્કરી ઈયળ અને લીલી ઈયળના નિયંત્રણ માટે કવીનાલફોસ ૨૫ ઇસી અથવા કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી અથવા ફ્લુબેન્ડીયામાઈડ ૨૦ ડબલ્યુ.જી. અથવા નોવાલ્યુરોન ૫.૨૫+ ઇન્ડોક્ઝાકાર્બ ૪.૫૦ એસ.સી. મુજબ છંટકાવ કરવો. ❖ ચુસીયા જીવાતો માટે લેમડા-સાયહેલોથ્રીન ૫ ઇ.સી. અથવા ઈમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ.એલ. અથવા થાયામીથોક્ઝામ ૧૨.૬૦ + લેમડા-સાયહેલોથ્રીન ૯.૫૦ ઝેડ.સી. નો છંટકાવ કરવો.
ઉનાળું મગ	વૃદ્ધિ / ફૂલ	ચૂસીયા જીવાત / પાનનાં ટપકા / પંચ રંગિયો	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ ચૂસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાનું તેલ @૫ મિલી/ લીટર મુજબ છાંટવું. ❖ પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી. ❖ પાનનાં ટપકા નાં રોગની શરૂઆત થયે મેટીરામ ૫૫% + પાયરેકલોસ્ટ્રોબીન ૫% ડબલ્યુજી ૩૦ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા ટેબ્યુકોનાઝોલ ૨૫.૯ ટકા અથવા હેકઝાકોનાઝોલ ૫ ટકા ૧૦ મિલી/૧૦ લિટર મુજબ છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં પંચ રંગિયાના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથીઓટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિલી/૧૦લી નો છંટકાવ કરવો.
ઉનાળું અડદ	વૃદ્ધિ / ફૂલ	ચૂસીયા જીવાત / પાનનાં ટપકા / પંચ રંગિયો	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ ચૂસીયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાનું તેલ @૫ મિલી/ લીટર મુજબ છાંટવું. ❖ પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી. ❖ પાનનાં ટપકા નાં રોગની શરૂઆત થયે મેટીરામ ૫૫% + પાયરેકલોસ્ટ્રોબીન ૫% ડબલ્યુજી ૩૦ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા ટેબ્યુકોનાઝોલ ૨૫.૯ ટકા અથવા હેકઝાકોનાઝોલ ૫ ટકા ૧૦ મિલી/૧૦ લિટર મુજબ છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં પંચ રંગિયાના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથીઓટ ૩૦ ઇસી ૧૦

			મિલી/૧૦લી નો છંટકાવ કરવો.
ઉનાળું તલ	વૃદ્ધિ / ફૂલ	તડતડિયા / સફેદમાખી / પાન વાળનારી ઇંચળ	❖ પાકને સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ પાકમાં તડતડિયા અને સફેદમાખીનાં નિયંત્રણ માટે ઓક્ઝીડીમેટોન - મિથાઈલ ૨૫ ઇ.સી.નો છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણની કામગીરી કરવી. ❖ લીમડાની લીમ્બોડીના મીંજનો ભૂકો ૩% (૩૦૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી)ના બે છંટકાવ પાન વાળનારી ઇંચળના નિયંત્રણ માટે કરવા.
આંબા	ફળ અવસ્થા	મધીયા & ભુકીછારા	❖ આંબામાં મધીયાના નિયંત્રણ માટે ૫૦ % કાર્બારીલ ૪૦ ગ્રામ પાવડર અથવા ૩૬ % ઇ.સી. મોનોક્રોટોફોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લી.પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ આંબામાં ભુકીછારા ના નિયંત્રણ માટે ૧૦ લી. પાણીમાં ૩૦ ગ્રામ દ્રાવ્ય ગંધક + કેરેથોન ૪૮ % ઇ.સી. ૧૦ મીલી દવાનો છંટકાવ કરવો. ❖ આંબાને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી.
શાકભાજી	વૃદ્ધી/ફૂલ/ ફળ	-	❖ શાકભાજીના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવું. શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા. ❖ પાકને નિયમિત સમયાંતરે પિયત આપવાની કામગીરી કરવી. ❖ આગાહી સમયગાળા દરમિયાન ખેતર પરનાં બધાં ખેતકાર્યો કરવા.
પશુપાલન	-	-	❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો & પીવા માટે ચોખ્ખું પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્ખા રાખવા. ❖ દિવસનું તાપમાન વધી રહ્યું હોવાથી, ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છેકે જરૂરી પગલા લેવા અને પશુઓને ગરમીના તણાવથી બચાવવા. તેઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે બપોરનાસમય દરમિયાન જમીનની તૈયારી અને ખેડની કામગીરીને ટાળો અને બપોરથી સાંજ સુધી પ્રાણીઓને આરામ આપો. ❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવું. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાંખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ. ❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો. ❖ પશુઓમાં ઇતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.

			❖ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.
--	--	--	--

યાંત્રિક અધિકારી
ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
જી.કૃ.યુ. જુનાગઢ

AMFU, JAU, Junagadh



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139



G20
भारत 2023 INDIA

Agromet Advisory Service Bulletin for Junagadh District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

Day:- Friday

Date: 11-04-2025

Agromet Advisory Service bulletin. No:- 004 (2025-26)

Observed Weather during last Five days (Dated 05 th to 09 th April,2025)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 12 to 16 th April, 2025) until 08:30 hrs of 16-04-2025				
05/04	06/04	07/04	08/04	09/04	Date	12/04	13/04	14/04	15/04	16/04
0	0	0	0	0	Rainfall(mm)	0	0	0	0	0
41.0	41.3	42.0	42.2	42.5	T _{max} (°C)	40	40	40	41	43
20.2	25.8	26.6	23.8	24.0	T _{min} (°C)	23	24	25	25	25
0	0	0	0	0	Cloud Cover	2	2	0	0	0
72	44	42	39	29	RH-I (%)	70	70	60	60	60
11	12	12	13	11	RH-II (%)	25	30	25	25	25
4.2	5.2	5.9	6.3	5.3	Wind speed (km/hr)	11	12	9	9	10
320	340	320	07	230	Wind direction	337	328	297	275	266

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall	As per IMD Forecast, There is forecasting of no rainfall occurs during next five days. Sky will be remaining mainly clear to clear.
	Temperature	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 40 - 43°C and 23 - 25°C , respectively.
	RH (%)	The Relative Humidity is likely to be in the range of 25 - 70 % .
	Wind Direction and Wind Speed	Direction and speed of wind is to be NW & W and around 09 to 12 km/h , respectively.



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com

Phone: 0285-2670139



✚ **Standardized Precipitation Index:** - For the period of 26th December, 2024 to 22nd January, 2025. Junagadh district considered under the mildly dry condition.

✚ **As per ERFs products,** **above normal** rainfall and T_{max} **below normal** & T_{min} **normal** may occur in Saurashtra & Kutch region during 16th to 22 April, 2025.

✚ **MEGHDOOT Mobile Application:-** **Download** the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.

Click on the following link to download the MEGHDOOT application:

Android users: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>


IOS users: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

✚ **After harvesting of rabi crops, take the soil samples and send to the soil testing laboratory for the soil analysis.**

✚ **To cultivate deep in the soil summer season so that diseases and pests are destroyed at different stages by the direct sunlight.**

✚ **To carry out weeding and inter culturing operations in timely sown summer season crops.**

✚ **Due to prevailing hot weather irrigate summer vegetable and fodder crop during evening hours.**





75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com

Phone: 0285-2670139



Crop	Variety/ Pest/Insect	Stage	Agro met Advisories
Summer Groundnut	Sucking pest / Spodoptera and Helicoverpa	Flowering / Pegging / Pod formation	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ For the control of sucking pest (aphid, thrips jassid), spray 3 ml Phosphamidon OR 15 ml Dimethoate in 10 litre of water. For ladybird beetle is observed with aphid then postpone the spraying operation. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in groundnut. ➤ To spray Quinolpos 25 EC or Chlorpyrifos 20 EC or Flubendiamide 20 WG or Novaluron 5.25 + Indoxacarb 4.50 SC for managing defoliators like Spodoptera and Helicoverpa. ➤ Need based application of Lambda-cyhalothrin 5 EC or or Imidacloprid 17.8 SL or Thiamethoxam 12.60 + Lambda-cyhalothrin 9.50 ZC for managing sucking pests.
Summer Green gram	Sucking pest / leaf spot / Mosaic	Vegetative / Flowering	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To spray neem oil @ 5 ml/l for the control of sucking pest.



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com

Phone: 0285-2670139



			➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop. ➤ For leaf spot disease, Spray Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% WG 30g/10 l or Tebuconazole 25.9 EC or Hexaconazole 5 EC 10 ml/10 l. ➤ To Spray Dimethoate 30 EC 10 ml/10 l for the control of mosaic.
Summer Black gram	Sucking pest / leaf spot / Mosaic	Vegetative / Flowering	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To spray neem oil @ 5 ml/l for the control of sucking pest. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop. ➤ For leaf spot disease, Spray Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% WG 30g/10 l or Tebuconazole 25.9 EC or Hexaconazole 5 EC 10 ml/10 l. ➤ To Spray Dimethoate 30 EC 10 ml/10 l for the control of mosaic.
Summer Sesame	Leafhopper / Whitefly / leaf webber	Vegetative / Flowering	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To control of leafhopper and whitefly, Spray Oxydemeton-methyl 25 EC.



Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com

Phone: 0285-2670139



			➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop. ➤ Two sprays of Neem Seed Kernel Extract 3 % (300 g / 10 lit water) are recommended for effective and economic control of the sesame leaf webber.
Mango	Madhiya & Powdery mildew	Fruiting	➤ For the control of madhiya, spray 50 % WP carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of water. ➤ For the control of powdery mildew, spray 30 gm sulphur + 48 % EC carethon 10 ml in 10 liter of water. ➤ Apply irrigation to the mango at regular an interval.
Vegetable crops	-	Sowing/ Flowering/ Fruiting	➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading. ➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To done all the activity of farm during forecast period.
Livestock	-	-	➤ As the day temperatures are increasing, farmers are advised to take necessary measures and protect livestock from heat



Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com

Phone: 0285-2670139



			stress. They are advised to avoid land preparation and draught operations during mid days and give rest for draught animals from noon to evening. ➤ To provide adequate food & clean water for drinking and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.
--	--	--	---

Technical Officer
Gramin Krishi Mausam Sewa
(GKMS-IMD)
J.A.U., Junagadh



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139




Agromet Advisory Service Bulletin for Porbandar District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

Day:- Friday

Date: 11-04-2025


Agromet Advisory Service bulletin. No:- 004 (2025-26)

Observed Weather during last Five days (Dated 06 th to 10 th April, 2025)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 12 to 16 th April, 2025) until 08:30 hrs of 16-04-2025				
06/04	07/04	08/04	09/04	10/04	Date	12/04	13/04	14/04	15/04	16/04
0	0	0	0	0	Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
40.0	37.7	38.0	39.4	43.0	Tmax (°C)	37	38	38	39	39
22.8	23.8	22.8	21.6	-	Tmin (°C)	26	26	26	27	27
0	0	0	0	0	Cloud Cover	2	2	0	0	0
46	54	87	74	-	RH-I (%)	80	80	80	75	75
39	47	24	25	62	RH-II (%)	75	75	70	60	60
14.8	22.2	11.1	7.4	18.5	Wind speed (km/hr)	14	17	12	12	15
340	340	320	340	270	Wind direction	332	319	290	270	266

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall	As per IMD Forecast, There is forecasting of no rainfall occurs during next five days. Sky will be remaining mainly clear to clear.
	Temperature	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 37 - 39°C and 26 - 27°C , respectively.
	RH (%)	The Relative Humidity is likely to be in the range of 60 – 80 % .
	Wind Direction and Wind Speed	Direction and speed of wind is to be NW & W and 12 - 17 km/h , respectively.

- ❖ **Standardized Precipitation Index:** - For the period 26th December, 2024 to 22nd January, 2025. Porbandar district considered under the mildly dry condition.
- ❖ **As per ERFs products,** **above normal** rainfall and T_{max} **below normal** & T_{min} **normal** may occur in Saurashtra & Kutch region during **16th to 22 April, 2025.**
- ❖ **MEGHDOOT Mobile Application:** **Download** the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.
Click on the following link to download the MEGHDOOT application:
Android users: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>
IOS users: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>
- ✚ **After harvesting of rabi crops, take the soil samples and send to the soil testing laboratory for the soil analysis.**
- ✚ **To cultivate deep in the soil summer season so that diseases and pests are destroyed at different stages by the direct sunlight.**
- ✚ **To carry out weeding and inter culturing operations in timely sown summer season crops.**
- ✚ **Due to prevailing hot weather irrigate summer vegetable and fodder crop during evening hours.**



  आज़ादी का अमृत महोत्सव	Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS) Agrometeorological Cell Department of Agronomy Junagadh Agricultural University Junagadh-362001 E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139	 
---	--	--

Crop	Variety/ Pest / Insect	Stage	Agro met Advisories
Summer Groundnut	Sucking pest / Spodoptera and Helicoverpa	Flowering / Pegging / Pod formation	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ For the control of sucking pest (aphid, thrips jassid), spray 3 ml Phosphamidon OR 15 ml Dimethoate in 10 litre of water. For ladybird beetle is observed with aphid then postpone the spraying operation. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in groundnut. ➤ To spray Quinolphos 25 EC or Chlorpyrifos 20 EC or Flubendiamide 20 WG or Novaluron 5.25 + Indoxacarb 4.50 SC for managing defoliators like Spodoptera and Helicoverpa. ➤ Need based application of Lambda-cyhalothrin 5 EC or or Imidacloprid 17.8 SL or Thiamethoxam 12.60 + Lambda-cyhalothrin 9.50 ZC for managing sucking pests.
Summer Green gram	Sucking pest / leaf spot / Mosaic	Vegetative / Flowering	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To spray neem oil @ 5 ml/l for the control

  आज़ादी का अमृत महोत्सव	Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS) Agrometeorological Cell Department of Agronomy Junagadh Agricultural University Junagadh-362001 E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139	 
---	---	--

			of sucking pest. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop. ➤ For leaf spot disease, Spray Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% WG 30g/10 l or Tebuconazole 25.9 EC or Hexaconazole 5 EC 10 ml/10 l. ➤ To Spray Dimethoate 30 EC 10 ml/10 l for the control of mosaic.
Summer Black gram	Sucking pest / leaf spot / Mosaic	Vegetative / Flowering	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To spray neem oil @ 5 ml/l for the control of sucking pest. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop. ➤ For leaf spot disease, Spray Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% WG 30g/10 l or Tebuconazole 25.9 EC or Hexaconazole 5 EC 10 ml/10 l. ➤ To Spray Dimethoate 30 EC 10 ml/10 l for the control of mosaic.
Summer Sesame	Leafhopper / Whitefly /	Vegetative / Flowering	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To control of leafhopper and whitefly, Spray

  आज़ादी का अमृत महोत्सव	Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS) Agrometeorological Cell Department of Agronomy Junagadh Agricultural University Junagadh-362001 E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139	 
---	---	--

	leaf webber		Oxydemeton-methyl 25 EC. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop. ➤ Two sprays of Neem Seed Kernel Extract 3 % (300 g / 10 lit water) are recommended for effective and economic control of the sesame leaf webber.
Mango	Madhiya & Powdery mildew	Fruiting	➤ For the control of madhiya, spray 50 % WP carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of water. ➤ For the control of powdery mildew, spray 30 gm sulphur + 48 % EC carethon 10 ml in 10 liter of water. ➤ Apply irrigation to the mango at regular an interval.
Vegetable crops	-	Sowing/ Flowering/ Fruiting	➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading. ➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To done all the activity of farm during forecast period.
Livestock	-	-	➤ As the day temperatures are increasing,

  आज़ादी का अमृत महोत्सव	Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS) Agrometeorological Cell Department of Agronomy Junagadh Agricultural University Junagadh-362001 E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139	 
---	--	--

			farmers are advised to take necessary measures and protect livestock from heat stress. They are advised to avoid land preparation and draught operations during mid days and give rest for draught animals from noon to evening. ➤ To provide adequate food & clean water for drinking and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.
--	--	--	--

Technical Officer
Gramin Krushi Mausam Seva
(GKMS-IMD)
J.A.U., Junagadh



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139



AMFU, JAU, Junagadh



Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139



Agromet Advisory Service Bulletin for Gir Somnath District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone
(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

Day:- Friday

Date: 11-04-2025

Agromet Advisory Service Bulletin. No:-004 (2025-26)

Observed Weather during last Five days (Dated 06 rd to 10 th April,2025)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 12 th to 16 th April,2025) until 08:30 hrs of 16-04-2025				
06/04	07/04	08/04	09/04	10/04	Date	12/04	13/04	14/04	15/04	16/04
0	0	0	0	0	Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
31.2	31.8	36.0	32.5	36.8	Tmax (°C)	33	33	34	36	36
23.3	24.4	24.6	24.9	-	Tmin (°C)	27	27	27	28	28
0	0	0	0	0	Cloud cover	2	2	0	0	0
83	72	72	73	-	RH-I (%)	85	85	80	75	75
76	48	67	41	72	RH-II (%)	75	75	75	65	65
-	-	-	3.7	5.6	Wind speed (km/hr)	17	17	14	13	9
-	-	-	99	29	Wind direction	335	330	312	295	279

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall	As per IMD Forecast, There is forecasting of no rainfall occurs during next five days. Sky will be remaining Mainly clear to clear.
	Temperature	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 33 - 36°C and 27 - 28°C , respectively.
	RH (%)	The Relative Humidity is likely to be in the range of 65 – 85 % .
	Wind Direction and Wind Speed	Direction and speed of wind is to be NW & W and around 09 – 17 km/h , respectively.



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139



✦ **Standardized Precipitation Index:** - For the period 26th December, 2024 to 22nd January, 2025. Gir Somnath district considered under the mildly dry condition.

✦ **As per ERFs products,** **above normal** rainfall and T_{max} **below normal** & T_{min} **normal** may occur in Saurashtra & Kutch region during **16th to 22 April, 2025.**

✦ **MEGHDOOT Mobile Application:** **Download** the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.

Click on the following link to download the MEGHDOOT application:

Android users: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>


IOS users: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

✦ **After harvesting of rabi crops, take the soil samples and send to the soil testing laboratory for the soil analysis.**

✦ **To cultivate deep in the soil summer season so that diseases and pests are destroyed at different stages by the direct sunlight.**

✦ **To carry out weeding and inter culturing operations in timely sown summer season crops.**

✦ **Due to prevailing hot weather irrigate summer vegetable and fodder crop during evening hours.**





75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139



Crop	Variety/ Pest / Insect	Stage	Agro met Advisories
Summer Groundnut	Sucking pest / Spodoptera and Helicoverpa	Flowering / Pegging / Pod formation	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ For the control of sucking pest (aphid, thrips jassid), spray 3 ml Phosphamidon OR 15 ml Dimethoate in 10 litre of water. For ladybird beetle is observed with aphid then postpone the spraying operation. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in groundnut. ➤ To spray Quinolphos 25 EC or Chlorpyrifos 20 EC or Flubendiamide 20 WG or Novaluron 5.25 + Indoxacarb 4.50 SC for managing defoliators like Spodoptera and Helicoverpa. ➤ Need based application of Lambda-cyhalothrin 5 EC or or Imidacloprid 17.8 SL or Thiamethoxam 12.60 + Lambda-cyhalothrin 9.50 ZC for managing sucking pests.
Summer Green gram	Sucking pest / leaf spot / Mosaic	Vegetative / Flowering	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To spray neem oil @ 5 ml/l for the control of sucking pest. ➤ Inter culturing and hand weeding should be



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139



			carried out in crop. ➤ For leaf spot disease, Spray Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% WG 30g/10 l or Tebuconazole 25.9 EC or Hexaconazole 5 EC 10 ml/10 l. ➤ To Spray Dimethoate 30 EC 10 ml/10 l for the control of mosaic.
Summer Black gram	Sucking pest / leaf spot / Mosaic	Vegetative / Flowering	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To spray neem oil @ 5 ml/l for the control of sucking pest. ➤ Inter culturing and hand weeding should be carried out in crop. ➤ For leaf spot disease, Spray Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% WG 30g/10 l or Tebuconazole 25.9 EC or Hexaconazole 5 EC 10 ml/10 l. ➤ To Spray Dimethoate 30 EC 10 ml/10 l for the control of mosaic.
Summer Sesame	Leafhopper / Whitefly / leaf webber	Vegetative / Flowering	➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To control of leafhopper and whitefly, Spray Oxydemeton-methyl 25 EC. ➤ Inter culturing and hand weeding should be



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139



			carried out in crop. ➤ Two sprays of Neem Seed Kernel Extract 3 % (300 g / 10 lit water) are recommended for effective and economic control of the sesame leaf webber.
Mango	Madhiya & Powdery mildew	Fruiting	➤ For the control of madhiya, spray 50 % WP carbaryl 40 gm OR 36 % EC monocrotophos 10 ml in 10 liter of water. ➤ For the control of powdery mildew, spray 30 gm sulphur + 48 % EC carethon 10 ml in 10 liter of water. ➤ Apply irrigation to the mango at regular an interval.
Vegetable crops	-	Sowing/ Flowering/ Fruiting	➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading. ➤ Apply irrigation to the crop at regular an interval. ➤ To done all the activity of farm during forecast period.
Livestock	-	-	➤ As the day temperatures are increasing, farmers are advised to take necessary measures and protect livestock from heat



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)
Agrometeorological Cell
Department of Agronomy
Junagadh Agricultural University
Junagadh-362001

E-mail: amfujnd@yahoo.com Phone: 0285-2670139



			stress. They are advised to avoid land preparation and draught operations during mid days and give rest for draught animals from noon to evening. ➤ To provide adequate food & clean water for drinking and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.
--	--	--	---

Technical Officer
Gramin Krishi Mausam Sewa
(GKMS-IMD)
J.A.U., Junagadh