

**હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
તા. ૧૮-૦૭-૨૦૧૫ થી તા. ૨૨-૦૭-૨૦૧૫**

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૫

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	00.0
મહત્વમાન (સે.ગે.)	34.8
લઘુત્વમાન (સે.ગ્રે.)	26.6
ભોજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	89-77
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	7.6

પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૨૨-૦૭-૧૫ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૧૮.૦૭.૧૫	૦	૦
	૧૯.૦૭.૧૫	૦	૦
	૨૦.૦૭.૧૫	૦	૦
	૨૧.૦૭.૧૫	૩૦	૨૦
	૨૨.૦૭.૧૫	૫૦	૫૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૮.૦૭.૧૫	૩૩	૩૩
	૧૯.૦૭.૧૫	૩૩	૩૩
	૨૦.૦૭.૧૫	૩૩	૩૩
	૨૧.૦૭.૧૫	૩૨	૩૨
	૨૨.૦૭.૧૫	૩૧	૩૧
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૮.૦૭.૧૫	૨૭	૨૮
	૧૯.૦૭.૧૫	૨૭	૨૮
	૨૦.૦૭.૧૫	૨૭	૨૮
	૨૧.૦૭.૧૫	૨૬	૨૬
	૨૨.૦૭.૧૫	૨૬	૨૬
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટોબર)	૧૮.૦૭.૧૫	વાદળાયુ	વાદળાયુ
	૧૯.૦૭.૧૫	વાદળાયુ	વાદળાયુ
	૨૦.૦૭.૧૫	વાદળાયુ	વાદળાયુ
	૨૧.૦૭.૧૫	વાદળાયુ	વાદળાયુ
	૨૨.૦૭.૧૫	વાદળાયુ	વાદળાયુ
મહત્વમાન લેજ (%)	૧૮.૦૭.૧૫	૮૩	૮૩
	૧૯.૦૭.૧૫	૮૩	૮૩
	૨૦.૦૭.૧૫	૮૩	૮૪
	૨૧.૦૭.૧૫	૮૪	૮૪
	૨૨.૦૭.૧૫	૮૪	૮૪
લઘુત્વમાન લેજ (%)	૧૮.૦૭.૧૫	૭૯	૭૯
	૧૯.૦૭.૧૫	૮૦	૮૧
	૨૦.૦૭.૧૫	૭૮	૮૦
	૨૧.૦૭.૧૫	૮૦	૮૦
	૨૨.૦૭.૧૫	૮૦	૮૦
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૮.૦૭.૧૫	૦૩૮	૦૩૫
	૧૯.૦૭.૧૫	૦૩૭	૦૩૪
	૨૦.૦૭.૧૫	૦૩૬	૦૩૩
	૨૧.૦૭.૧૫	૦૩૧	૦૩૧
	૨૨.૦૭.૧૫	૦૩૩	૦૩૧
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૧૮.૦૭.૧૫	૨૪૪	૨૪૨
	૧૯.૦૭.૧૫	૨૫૦	૨૪૯
	૨૦.૦૭.૧૫	૨૪૭	૨૪૫
	૨૧.૦૭.૧૫	૨૫૦	૨૫૧
	૨૨.૦૭.૧૫	૨૫૫	૨૫૫

દક્ષિણ ખેત આબોહવાક્ય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર ફૂષિ સલાહ)

પાકનું નામ	ફૂષિ સલાહ
મગફળી	<ul style="list-style-type: none"> ❖ અગામી પાચ દિવસ દરમ્યાન હળવા થી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી હોય વરાપ થયે રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ ભલામણ મુજબ કરવો. ❖ દ્રાયકોડર્મા વીરીડી (કુગ) યુક્ત પાવડર વાબ્યા પછી 30 દિવસે 2.૫ કિલો હેકટરે પાણી સાથે ઓગાળી આપવો અથવા 2.૫ કિલો પાવડર ખોળ અથવા છાણીયા ખાતર સાથે મીક્ષ કરી ચાસમાં આપવો. ❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણણની કામગીરી કરવી.
કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણણની કામગીરી કરવી. ❖ અગામી પાચ દિવસ દરમ્યાન હળવા થી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી હોય વરાપ થયે રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ ભલામણ મુજબ કરવો
તુવેર	<ul style="list-style-type: none"> ❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણણની કામગીરી કરવી.
સોયાબીન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણણની કામગીરી કરવી.
રીંગએણા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ચુસીયા પ્રકારની જાવાતના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનું મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપક્રમ હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો
ભીડો	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકમાં ચુસીયા ના નિયંત્રણ માટે એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અને લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનું મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપક્રમ હોય તો ક્રાયઓફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો
પશુ પાલન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. ❖ પશુમા કુટ અને માઉથ રોગના આવે તે માટે જરૂરી રશીકરણ કરાવવું. ❖ પશુઓને વરસાદના સમયે ખુલ્લામા, ઝાડ નીચેકે ઇલેક્ટ્રીક પોલ પાસે ન રાખતા શેડમાં બાંધવાની વ્યવસ્થા કરવી.

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 17-07-2015

(Period from 18 to 22 July -2015)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	00.0
Maximum temperature °C	34.6-35.0
Minimum temperature °C	26.0-27.3
RH % (Morning/Afternoon)	89-77
Wind speed (Kmph)	4.1-11.4
Cloud cover	3-8

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 22-07-2015

Parameters	Day-1 18-07-15	Day-2 19-07-15	Day-3 20-07-15	Day-4 21-07-15	Day-5 22-07-15
Rain fall (mm)	0	0	0	30	50
Maximum temperature °C	33	33	33	32	31
Minimum temperature °C	27	27	27	26	26
Cloud cover (Okta)	8	8	8	8	8
RH % (Morning/After noon)	83-78	83-80	83-78	84-80	84-80
Wind speed (Kmph)	038	037	036	031	033
Wind direction(Deg)	244	250	247	250	255

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
Groundnut	Flowering	GG-20, GG-11	<ul style="list-style-type: none"> ➤ There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out after vaspa condition. ➤ Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil.
Cotton	Growth	Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition. ➤ There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days.
Soybean	Growth	Gujarat Soybean-1,2,3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.
Pigeon pea	Growth	BDN-2, GTH-1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition. ➤
Brinjla	Flowerin/ fruiting	Thrips and White Fly	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval

			(4 spray).
Lady's finger	Flowerin/ fruiting	Shoot and fruit borer	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.
Livestock	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases. ➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date :17-07-2015

(Period from 18 to 22 July -2015)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 22-07-2015

Parameters	Day-1 18-07-15	Day-2 19-07-15	Day-3 20-07-15	Day-4 21-07-15	Day-5 22-07-15
Rain fall (mm)	0	0	0	20	50
Maximum temperature °C	33	33	33	32	31
Minimum temperature °C	28	28	28	26	26
Cloud cover (Okta)	8	8	8	8	8
RH % (Morning/After noon)	83-79	83-81	84-80	84-80	84-80
Wind speed (Kmph)	035	034	033	031	031
Wind direction(Deg)	242	249	245	251	255

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
Groundnut	Flowering	GG-20, GG-11	<ul style="list-style-type: none"> ➤ There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out after vaspa condition. ➤ Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil.
Cotton	Growth	Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition. ➤ There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days.
Soybean	Growth	Gujarat Soybean-1,2,3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.
Pigeon pea	Growth	BDN-2, GTH-1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition. ➤
Brinjla	Flowerin/ fruiting	Thrips and White Fly	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).
Lady's finger	Flowerin/ fruiting	Shoot and fruit borer	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.

Livestock	-	-	<ul style="list-style-type: none">➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases.➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition.➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.
------------------	---	---	---