

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન

દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ

તા. ૧૮-૦૫-૨૦૧૯ થી તા. ૨૩-૦૬-૨૦૧૯

(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૯-૨૦

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	૦૪૭.૩
મહત્વમાન તાપમાન (°સે.)	૩૩.૪
લઘુત્વમાન તાપમાન (°સે.)	૨૪.૬
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	૬૨ - ૭૩
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૩.૫

પત્રક-૬ : જુલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૨૩-૦૬-૨૦૧૯ સુધી)

ભારત સરકારશીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનુસાર અતેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

૧. જુનાગઢ:- જુલ્લામા આગામી તારીખ ૧૮/૦૬/૨૦૧૯ થી ૨૩/૦૬/૨૦૧૯ દરમયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં અંશત વાદળાયું થી વાદળાયું રહેશે, આવતા પાંચ દિવસોમાં હળવા વરસાદ ની શક્યતાઓ રહેલી છે. પવનની ઝડપ ૧૫ થી ૨૦ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૨૮ થી ૩૦ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્વમાન તાપમાન ૨૫ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

૨. પોરબંદર:- જુલ્લામા આગામી તારીખ ૧૮/૦૬/૨૦૧૯ થી ૨૩/૦૬/૨૦૧૯ દરમયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં મોટેભાગે ચોખ્યું થી વાદળાયું રહેશે, આવતા પાંચ દિવસોમાં હળવા વરસાદ ની શક્યતાઓ રહેલી છે. પવનની ઝડપ ૧૮ થી ૨૨ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૩૧ થી ૩૬ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્વમાન તાપમાન ૨૬ થી ૨૮ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

રૂપીર સોમનાથ:- જુલામા આગામી તારીખ ૧૬/૦૬/૨૦૧૯ થી ૨૩/૦૬/૨૦૧૯ દરમાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં મોટેભાગે ચોખ્યું થી વાદળણાયું રહેશે, આવતા પાંચ દિવસોમાં હળવા થી મધ્યમ વરસાદ ની કોઈ શક્યતાઓ રહેલી છે. પવનની ઝડપ ૧૫ થી ૨૧ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન ૩૦ થી ૩૩ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન ૨૭ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

જુનાગઢ

હવામાન પરીબળો / તારીખ	દિવસ-૧ ૧૬-૦૬-૨૦૧૯	દિવસ-૨ ૨૦-૦૬-૨૦૧૯	દિવસ-૩ ૨૧-૦૬-૨૦૧૯	દિવસ-૪ ૨૨-૦૬-૨૦૧૯	દિવસ-૫ ૨૩-૦૬-૨૦૧૯
વરસાદ (મી.મી)	૧૬	૦૦	૦૦	૦૦	૦૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	૨૬	૨૬	૨૬	૩૦	૩૦
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	૨૫	૨૫	૨૫	૨૫	૨૫
વાદળની સ્થિતિ	મોટેભાગે વાદળણાયું	મોટેભાગે વાદળણાયું	મોટેભાગે વાદળણાયું	અંશત વાદળણાયું	મોટેભાગે વાદળણાયું
સવારના ભેજના ટકા	૮૨	૮૧	૭૮	૭૮	૭૮
બપોર બાદ ભેજના ટકા	૫૫	૫૪	૫૦	૫૦	૫૮
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૦૨૦	૦૧૯	૦૧૫	૦૧૫	૦૧૭
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૨૪૬	૨૪૭	૨૪૧	૨૫૧	૨૫૬

પોરબંદર

વરસાદ (મી.મી)	૨૨	૦૦	૦૦	૦૦	૦૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	૩૧	૩૩	૩૪	૩૫	૩૬
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	૨૬	૨૭	૨૭	૨૭	૨૮
વાદળની સ્થિતિ	મોટેભાગે વાદળણાયું	વાદળણાયું	મોટેભાગે વાદળણાયું	મોટેભાગે ચોખ્યું	મોટેભાગે વાદળણાયું
સવારના ભેજના ટકા	૮૪	૮૨	૮૧	૮૦	૮૦
બપોર બાદ ભેજના ટકા	૭૪	૭૨	૭૭	૭૫	૭૬
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૦૨૨	૦૨૧	૦૧૮	૦૧૬	૦૨૦
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૨૪૦	૨૪૨	૨૪૨	૨૫૦	૨૫૬

ગીર સોમનાથ

વરસાદ (મી.મી)	૭૦	૨૦	૨૦	૧૫	૧૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	૩૦	૩૧	૩૩	૩૩	૩૩
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે)	૨૭	૨૭	૨૭	૨૭	૨૭
વાદળની સ્થિતિ	મોટેભાગે વાદળછાયું	મોટેભાગે વાદળછાયું	મોટેભાગે વાદળછાયું	મોટેભાગે ચોખ્યું	મોટેભાગે વાદળછાયું
સવારના ભેજના ટકા	૮૫	૮૪	૮૨	૮૨	૮૨
બપોર બાદ ભેજના ટકા	૭૪	૭૫	૭૦	૭૧	૬૬
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૦૨૧	૦૨૦	૦૧૫	૦૧૭	૦૧૬
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૨૪૬	૨૫૧	૨૪૪	૨૫૩	૨૫૮

દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાક્ય વિભાગ

પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ / જીવાત / જાત	કૃષિ સલાહ
			<ul style="list-style-type: none"> ❖ આગામી પાંચ દિવસ દરમિયાન જુલ્લામાં વાતાવરણ મોટેભાગે વાદળછાયું રહેશે અને હળવા વરસાદ ની શક્યતાઓ રહેલી છે. ❖ આગામી ચોમાસુ પાકોના વાવેતર માટે ખેત આયોજન કરવુ તે મુજબ બીચારણ, ખાતર અને દવાનો પુરવઠો મેળવી દેવો. ❖ વાવણી લાયક વરસાદ થયે ચોમાસુ પાકોની સમયસર વરાપ થયે વાવણી કરવી.
ચોમાસુ મગફળી	વાવેતર/ ઉગાવો	અર્ધ વેલડી જુજુ-૨૦, ૨૨ વેલડી જુજુ- ૧૧,૧૩, ઉલડી જુજુ-૨, જુજેજુ- ૩૧,૩૨ ટીજુ- ૨૬,	<ul style="list-style-type: none"> ❖ વાવણી લાયક વરસાદ થયે ચોમાસુ મગફળીની સમયસર વાવણી કરવી. ચોમાસુ મગફળીની પ્રમાણીત જાતોનું વાવેતર કરવુ. ❖ વાવેતર માટે અર્ધવેલડી જાત- જુજુ.૨૦ અથવા ઉલડી જાતો જુજુ.૨ જુજુ.૫ જુજુ.૭ ટી.જુ. ૨૬ ની પસંદગી કરવી. ❖ ચોમાસુ મગફળીના પાકને હેકટરે ૧૨.૫ કિ.ગ્રા નાઇટ્રોજન અને ૨૫ કિ.ગ્રા ફોસ્ફરસ ખાતર તરીકે વાવણી વખતે ચાસમાં ઓરીને આપવા.

			<ul style="list-style-type: none"> ❖ વાવેતર સમયે ડીએપી ૫૪.૩ કીલો અને ૬ કીલો યુરીયા/હે. અને એરંડીનો ખોળ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હે. અથવા જીપ્સમ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હે. સાથે એરંડીનો ખોળ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હે પાયામા આપવો. તેમજ ૨.૫ કી.ગ્રા./હે રાયઝોબીયમ ફૂગનો પાઉડર, ૫૦૦ કી.ગ્રા./હે એરંડીના ખોળ સાથે ભેળવી પાયામા વાવણી સમયે આપવો. ❖ વાવતી વખતે બીયારણને થાયરમ અથવા મેંકોઝેબ અથવા વીટાવેક્ષ દવાનો ૨-૩ ગ્રામ/કી. બીજને પટ આપવો. ❖ રાસાયણિક નિદામણનાશક ૦.૮ કી.ગ્રા./હે. પેન્ડીમીથેલીન ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી વાવણી બાદ તુરેતજ છંટકાવ કરવો. ❖ આગોતરા વાવેલ મગફળીના પાકમાં વરાપ થયે આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિદામણ કરવુ.
કપાસ	વાવેતર	ગુ. હા. કપાસ-૬, ૮,૧૦,૧૨	<ul style="list-style-type: none"> ❖ કપાસ વાવણી માટે નવી બહાર પાડેલ વધુ ઉત્પાદન આપતી બીટી હાઈબ્રિડ કપાસ ગુજરાત હાઈબ્રિડ કપાસ-૬, ૮, ૧૨ (બ્લોલગાર્ડ-૨) પસંદ કરવી કે બી.ટી. કપાસનું વિશ્વાષપાત્ર સર્ટિફાઇડ બીયારણ જ ખરીદવું. ❖ કપાસના પાકની સમયસર વાવણી કરવી. ❖ વાવતા પહેલા ૧૫ થી ૨૦ ટન/હેક્ટર સેન્ટ્રીય ખાતર આપવુ અને ૫૦૦ કી.ગ્રા./હે. યુરીયાના (નાઈટ્રોઝન) ત્રણ સરખા હપ્તાથી આપવો અને ૧૦૮ કી.ગ્રામ/હે. ડીએપી અને ૨૫૦ કી.ગ્રામ/હે. પોટાશ ખાતર પાયામા આપવુ. ❖ રાસાયણિક નિદામણનાશક ૦.૮ કી.ગ્રા./હે. ફલુક્લોરેલીન અથવા પેન્ડીમીથેલીન ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી વાવણી બાદ તુરેતજ છંટકાવ કરવો.
ઉનાણું પાકો	પરિપક્વ અવસ્થા	-	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ઉનાણું પાકો પરિપક્વ થાય એટલે સમયસર કાપણી કરવી અને યોગ્ય સલામત જગ્યાએ સંગ્રહ કરવો.
સોયાબીન	વાવેતર	ગુજ. સોયા. - ૧,૨,૩.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ સોયાબીન પાકોનું વાવેતર માટે સારી ગુણવત્તા વાળું અને પ્રમાણિત કરેલ બીયારણ મેળવી લેવું. ❖ પાકમાં વાવેતર સમયે પાયામાં એસએસપી ઊંચા ૩૭૫ કીલો અને ૬૫.૨ કીલો યુરીયા/હે આપવુ.

તલ	વાવેતર	પૂર્વ -૧, ગુજ. તલ- ૧,૨.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ચોમાસુ તલનાં વાવેતર માટે સારી ગુણવત્તા વાળું અને પ્રમાણિત કરેલ બીયારણ મેળવી લેવું. ❖ પાકમાં વાવેતર સમયે પાચામાં ડીએપી ૫૪.૩ કીલો અને ૮૭.૪ કીલો યુરીયા/હે આપવુ.
કઠોળ પાકો	વાવેતર	ઈ- ૮, ગુજ. અડે- ૧,૨. અને ગુજ. માગ- ૨,૪.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ચોમાસુ કઠોળ પાકોનું વાવેતર માટે સારી ગુણવત્તા વાળું અને પ્રમાણિત કરેલ બીયારણ મેળવી લેવું. ❖ કઠોળ પાકો ના બીજાને ૧ કી.ગ્રા/૩ ગ્રામ મેન્કોઝેબનો પટ આપીને વાવેતર કરવુ. ❖ પાકમાં પ્રતિ હેક્ટરે ૨૦ કી.ગ્રા. નાઇટ્રોજન અને ૪૦ ફ્રેસ્ફરસ આપવાથી પાકનું સારુ ઉત્પાદન આવક મળે છે.
આંબો	પરિપક્વતા	-	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પરીપક્વ કેરી ઉતારી ગેડીંગ કરી બજારમાં મોકલવી.
શાકભાજુ	વૃધ્યા/કુલ/ ફળ	-	<ul style="list-style-type: none"> ❖ વેલાવાળા શાકભાજુના પાકમાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ ટાળવા માટે મુખ્ય પાકની ફરતે દિવેલા તથા ગલગોટાનું વાવેતર કરવાથી તેનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે જો ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે તો ૧૦ મીલી મીથાઈલ ઓ ડેમેટોન (૨૫ ઈસી) અથવા ૧૦ મીલી ડાયમીથોએટ (૩૦ ઈસી) ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો ત્યાર બાદ પણીથી બીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસ પછી કરવો. ❖ શાકભાજુના પાકમાં ચુસીયા પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનું મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્પાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. અથવા દ્રાવયાફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/૧૦ લી.પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. ❖ મરચીના પાકમાં શ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ૨૦મીલી પ્રોફેનોફ્લોસ અને લિમ્બોળીનું તેલ ૫૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણી મિશ્રણ કરી છાંટવી. ❖ શાકભાજુના પાકની રોપણી બાદ ચુસીયા પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ માટે દાણાદાર ફોરેટ ૧૦ જુ છોડ દીઠ ૨ ગ્રામ મુજબ આપીને પીયત આપવુ. ❖ મરચીના પાકમાં વાઈરસના કારણે પીળા થઈ કુકડાઈ ગયેલ છોડ ઉપાડી જમીનમાં દાટી નાશ કરવો અને ૫ મીલી ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ રીંગણ અને ટમેટાના ફળ અને અને ડોકાની ઈયળોનો

			<p>ઉપદ્રવ જણાય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકાને ટોડીને જમીનમા દાટી દેવા અને રીનાક્ષીપાયર દવા ૩મીલીદવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ રીંગણ અને ટમેટાના પાકમા ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા પગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ શાકભાજુ ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડિંગ કરી બજારમાં મુકવા.
પશુપાલન	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ❖ આપના પાલતુ પશુઓને ખુલ્લામા, ઇલેક્ટ્રિક થામ્બલા સાથે કે ઝડની નીચે ન બાંધતા સલામત જગ્યાએ રાખવાની વ્યવસ્થા કરવી. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્મા રાખવા. ❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવુ. ❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાં ખનિજ્યુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળો સંગ્રહિત કરવો જોઈએ. ❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. ❖ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઇડ અથલા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date: - 18-06-2019

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	047.3
Maximum temperature °C	33.4
Minimum temperature °C	24.9
RH % (Morning/Afternoon)	92 – 73
Wind speed (Kmph)	13.5
Cloud cover	6 - 8

(Period from 19 to 23 June 2019)

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 23-06-2019

Parameters	Day-1 19-06-19	Day-2 20-06-19	Day-3 21-06-19	Day-4 22-06-19	Day-5 23-06-19
Rain fall (mm)	16	0	0	0	0
Maximum temperature °C	29	29	29	30	30
Minimum temperature °C	25	25	25	25	25
Cloud cover (Okta)	7	6	6	3	5
RH I % (Morning)	82	81	78	78	78
RH II % (After noon)	65	64	60	60	59
Wind speed (Km/h)	020	019	015	015	017
Wind direction(Deg)	246	247	241	261	266

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall	There is forecasting of moderate rainfall on next day.
	Temperature	Maximum and minimum temperature likely to be in range of 29 - 30°C and 25°C, respectively.

	RH (%) Wind Direction and Wind Speed	The Relative Humidity is likely to be in the range of 82 – 59 %. Direction and speed of wind is likely to be SW & W and 15 - 20 km/h, respectively.	
Crop	Variety/ Pest/Insect	Stage	Agro met Advisories
			<ul style="list-style-type: none"> ❖ The sky will remain variable cloudy during next five days. ❖ To get the supply of seeds, fertilizers and insecticide, pesticide and fungicide according to planning the farm for the next monsoon crops. ❖ Timely sowing of Kharif crops should be done after sufficient rainfall.
Kharif Groundnut	Semi Spreading GG-20, 22 Bunch:- GG - 2, GJG - 31, 32, TG – 26, 37	Sowing / Germination	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Timely sowing should be done after sufficient rainfall. Select the certified seed of groundnut for cultivation. ➤ For Sowing of Kharif groundnut select semi-spreading GG.20 or erect GG.2, GG.5, GG.7 and TG-26 varieties. ➤ In Kharif groundnut apply 12.5 kg N/ha and 25 kg P/ha at the time of sowing. ➤ Apply 54.3 kg/ha DAP, 6 kg/ha Urea and 500 kg/ha Castor cake as basal dose. ➤ Seed should be treatment with Dithane M-45/ Captan/vitavax @ 2 grams per kg of seeds before sowing. ➤ Spray weedicide 0.9 kg/ha pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing. ➤ Interculturing and hand weeding should be

			carried out in pre-sowing groundnut.
Cotton	Hy.cotton-6, 8, 10 and 12, AHH-468 as well as Govt. approved Bt Cotton G.Cot Hy-6 Bt, G.Cot Hy-8 Bt, G.Cot Hy- 12 Bt Variety etc.	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Farmers are advised to procure the seed of high yielding variety of BT hybrid Cotton 'Gujarat Hybrid Cotton-6, 8, 12' (Bolegaurd-2) or Govt. approved varieties of B.T. cotton for sowing. ➤ Timely sowing should be done after sufficient rainfall. Select the certified seed of cotton for cultivation. ➤ In cotton apply 166 kg urea/ha, 108 kg DAP/ha & potash 250 kg/ha and 15 to 20 tonne FYM at the time of sowing. ➤ Spray weedicides 0.9 kg/ha fluchloralin or pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing.
Summer Crops	-	Maturity	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Harvesting operation should be carried out at maturity stage of all summer crops.
Soyabean	Gujarat Soya bean – 1, 2, 3.	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To procure good quality certified seeds of Soybean. ➤ In soybean apply 375 kg SSP/ha & 65.2 kg urea/ha at the time of sowing.
Seasame	Purva-1, Guj. Til – 1, 2.	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To procure good quality certified seeds of Sesame. ➤ In sesame apply 54.3 kg DAP/ha & 87.4 kg urea/ha at the time of sowing.
Pulse crops	T-9, Guj. Black gram- 1, 2. And GM- 4 ,Gujarat mung - 2	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To procure good quality certified seeds of pulse crops. ➤ Before sowing the seeds should be treated with 3 gm Mencozeb per 1 kg of seed. ➤ Apply 20 kg nitrogen, 40 kg phosphorus per

			ha for more production.
Mango	-	Maturity	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To send mango fruit to the market often grading.
Vegetable crops	-	Sowing/ Flowering/ Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of leaf webber in fruit leafy vegetable, sowing of trap crop (castor and galgota) around the vegetable crop. For the heavy incidence spray 10 ml methyl O demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 10 liter of water. ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ For the control of thrips in chilli, spray 20 ml profenophos in 10 litres of water. ➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Rouging of viral infested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of 5 ml Imidacloprid per 10 litre of water is advised for control the vector, when sky remains clear. ➤ Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the flowering and fruiting stage. ➤ In brinjal and tomato crops constant monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised, for the control of

			<p>fruit borer, spray reenaxipayar @ 3.0ml in 10 lit of water.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ In brinjal and tomato crops, for the control of fruit fly, spray acetemaprid 5.0 ml in 10 lit of water. ➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.
Livestock	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keep animals indoor during the forecasting of raining period. ➤ To provide adequate food and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.

PORBANDAR

Phone: 0285-2670139

Date: - 18-06-2019

(Period from 19 to 23 June 2019)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 23-06-2019

Parameters	Day-1 19-06-19	Day-2 20-06-19	Day-3 21-06-19	Day-4 22-06-19	Day-5 23-06-19
Rain fall (mm)	22	0	0	0	0
Maximum temperature °C	31	33	34	35	36
Minimum temperature °C	26	27	27	27	28
Cloud cover (Okta)	7	8	6	2	5
RH I % (Morning)	84	82	81	80	80
RH II % (After noon)	74	72	67	65	66
Wind speed (Km/h)	022	021	018	019	020
Wind direction(Deg)	240	242	242	260	259

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall		There is forecasting of moderate rainfall during next day.
	Temperature		Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31 – 36 °C and 26 - 28 °C, respectively.
	RH (%)		The Relative Humidity is likely to be in the range of 84 – 66 %.
	Wind Direction and Wind Speed		Direction and speed of wind is likely to be SW & W and 18 – 22 km/h, respectively.
	Crop	Variety/ Pest / Insect	Stage
			Agro met Advisories
			➤ The sky will remain cloudy during next five days.

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ To get the supply of seeds, fertilizers and insecticide, pesticide and fungicide according to planning the farm for the next monsoon crops. ➤ Timely sowing of Kharif crops should be done after sufficient rainfall.
Kharif Groundnut	Semi Spreading GG-20, 22 Bunch:- GG -2, GJG - 31, 32, TG – 26, 37	Sowing / Germination	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Timely sowing should be done after sufficient rainfall. Select the certified seed of groundnut for cultivation. ➤ For Sowing of Kharif groundnut select semi-spread GG.20 or erect GG.2, GG.5, GG.7 and TG-26 varieties. ➤ In Kharif groundnut apply 12.5 kg N/ha and 25 kg P/ha at the time of sowing. ➤ Apply 54.3 kg/ha DAP, 6 kg/ha Urea and 500 kg/ha Castor cake as basal dose. ➤ Seed should be treatment with Dithane M-45/Captan/vitavax @ 2 grams per kg of seeds before sowing. ➤ Spray weedicide 0.9 kg/ha pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in pre-sowing groundnut.
Cotton	Hy.cotton- 6, 8, 10 and 12, AHH- 468 as well as Govt. approved Bt Cotton	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Farmers are advised to procure the seed of high yielding variety of BT hybrid Cotton 'Gujarat Hybrid Cotton-6, 8, 12' (Bolegaurd-2) or Govt. approved varieties of B.T. cotton for sowing. ➤ Timely sowing should be done after sufficient rainfall. Select the certified seed of cotton for

	G.Cot Hy-6 Bt, G.Cot Hy-8 Bt, G.Cot Hy-12 Bt Variety etc.		cultivation. <ul style="list-style-type: none"> ➤ In cotton apply 166 kg urea/ha, 108 kg DAP/ha & potash 250 kg/ha and 15 to 20 tonne FYM at the time of sowing. ➤ Spray weedicides 0.9 kg/ha fluchloralin or pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing.
Summer Crops	-	Maturity	➤ Harvesting operation should be carried out at maturity stage of all summer crops.
Soyabean	Gujarat Soya bean – 1, 2, 3.	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To procure good quality certified seeds of Soybean. ➤ In soybean apply 375 kg SSP/ha & 65.2 kg urea/ha at the time of sowing.
Seasame	Purva-1, Guj. Til – 1, 2.	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To procure good quality certified seeds of Sesame. ➤ In sesame apply 54.3 kg DAP/ha & 87.4 kg urea/ha at the time of sowing.
Pulse crops	T-9, Guj. Black gram- 1, 2. And GM-4 ,Gujarat mung - 2	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To procure good quality certified seeds of pulse crops. ➤ Before sowing the seeds should be treated with 3 gm Mencozeb per 1 kg of seed. ➤ Apply 20 kg nitrogen, 40 kg phosphorus per ha for more production.
Mango	-	Maturity	➤ To send mango fruit to the market often grading.
Vegetable crops	-	Sowing/ Flowering/ Fruiting	➤ For the control of leaf webber in fruit leafy vegetable, sowing of trap crop (castor and galgota) around the vegetable crop. For the heavy incidence spray 10 ml methyl O demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC)

- in 10 liter of water.
- For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.
 - For the control of thrips in chilli, spray 20 ml profenophos in 10 litres of water.
 - For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.
 - Rouging of viralinfested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of 5 ml Imidacloprid per 10 litre of water is advised for control the vector, when sky remains clear.
 - Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the flowering and fruiting stage.
 - In brinjal and tomato crops constant monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised, for the control of fruit borer, spray reenaxipayar @ 3.0ml in 10 lit of water.
 - In brinjal and tomato crops, for the control of fruit fly, spray acetemaphrid 5.0 ml in 10 lit of water.
 - Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.

Livestock	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keep animals indoor during the forecasting of raining period. ➤ To provide adequate food and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.
------------------	---	---	--

Gir Somnath

Phone: 0285-2670139

Date: - 18-06-2019

(Period from 19 to 23 June 2019)

Weather forecast for Gir Somnath Dist. until 08:30 hrs of 23-06-2019

Parameters	Day-1 19-06-19	Day-2 20-06-19	Day-3 21-06-19	Day-4 22-06-19	Day-5 23-06-19
Rain fall (mm)	70	20	20	15	10
Maximum temperature °C	30	31	33	33	33
Minimum temperature °C	27	27	27	27	27
Cloud cover (Okta)	7	5	5	2	5
RH I % (Morning)	85	84	82	82	82
RH II % (After noon)	74	75	70	71	69
Wind speed (Km/h)	021	020	015	017	019
Wind direction(Deg)	249	251	244	263	268

Agro meteorological Advisories

General Advice	Rain fall		There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days.
	Temperature		Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30 – 33 °C and 27 °C, respectively.
	RH (%)		The Relative Humidity is likely to be in the range of 85 – 69 %.
	Wind Direction and Wind Speed		Direction and speed of wind is likely to be W & SW and 15 – 21 km/h, respectively.
Crop	Variety/ Pest / Insect	Stage	Agro met Advisories
			➤ The sky will remain cloudy and light to moderate rainfall will occur during next five days.

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ To get the supply of seeds, fertilizers and insecticide, pesticide and fungicide according to planning the farm for the next monsoon crops. ➤ Timely sowing of Kharif crops should be done after sufficient rainfall.
Kharif Groundnut	Semi Spreading GG-20, 22 Bunch:- GG -2, GJG - 31, 32, TG – 26, 37	Sowing / Germination	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Timely sowing should be done after sufficient rainfall. Select the certified seed of groundnut for cultivation. ➤ For Sowing of Kharif groundnut select semi-spread GG.20 or erect GG.2, GG.5, GG.7 and TG-26 varieties. ➤ In Kharif groundnut apply 12.5 kg N/ha and 25 kg P/ha at the time of sowing. ➤ Apply 54.3 kg/ha DAP, 6 kg/ha Urea and 500 kg/ha Castor cake as basal dose. ➤ Seed should be treatment with Dithane M-45/Captan/vitavax @ 2 grams per kg of seeds before sowing. ➤ Spray weedicide 0.9 kg/ha pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing. ➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in pre-sowing groundnut.
Cotton	Hy.cotton- 6, 8, 10 and 12, AHH- 468 as well as Govt. approved Bt Cotton	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Farmers are advised to procure the seed of high yielding variety of BT hybrid Cotton 'Gujarat Hybrid Cotton-6, 8, 12' (Bolegaurd-2) or Govt. approved varieties of B.T. cotton for sowing. ➤ Timely sowing should be done after sufficient rainfall. Select the certified seed of cotton for

	G.Cot Hy-6 Bt, G.Cot Hy-8 Bt, G.Cot Hy-12 Bt Variety etc.		cultivation. <ul style="list-style-type: none"> ➤ In cotton apply 166 kg urea/ha, 108 kg DAP/ha & potash 250 kg/ha and 15 to 20 tonne FYM at the time of sowing. ➤ Spray weedicides 0.9 kg/ha fluchloralin or pendimethalin mix in 500 litre of water after sowing.
Summer Crops	-	Maturity	➤ Harvesting operation should be carried out at maturity stage of all summer crops.
Soyabean	Gujarat Soya bean – 1, 2, 3.	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To procure good quality certified seeds of Soybean. ➤ In soybean apply 375 kg SSP/ha & 65.2 kg urea/ha at the time of sowing.
Seasame	Purva-1, Guj. Til – 1, 2.	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To procure good quality certified seeds of Sesame. ➤ In sesame apply 54.3 kg DAP/ha & 87.4 kg urea/ha at the time of sowing.
Pulse crops	T-9, Guj. Black gram- 1, 2. And GM-4 ,Gujarat mung - 2	Sowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To procure good quality certified seeds of pulse crops. ➤ Before sowing the seeds should be treated with 3 gm Mencozeb per 1 kg of seed. ➤ Apply 20 kg nitrogen, 40 kg phosphorus per ha for more production.
Mango	-	Maturity	➤ To send mango fruit to the market often grading.
Vegetable crops	-	Sowing/ Flowering/ Fruiting	➤ For the control of leaf webber in fruit leafy vegetable, sowing of trap crop (castor and galgota) around the vegetable crop. For the heavy incidence spray 10 ml methyl O demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC)

- in 10 liter of water.
- For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 or neem oil 40 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.
 - For the control of thrips in chilli, spray 20 ml profenophos in 10 litres of water.
 - For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.
 - Rouging of viralinfested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of 5 ml Imidacloprid per 10 litre of water is advised for control the vector, when sky remains clear.
 - Apply regular irrigation at 6 to 8 days to the crop at the flowering and fruiting stage.
 - In brinjal and tomato crops constant monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised, for the control of fruit borer, spray reenaxipayar @ 3.0ml in 10 lit of water.
 - In brinjal and tomato crops, for the control of fruit fly, spray acetemaphrid 5.0 ml in 10 lit of water.
 - Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.

Livestock	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keep animals indoor during the forecasting of raining period. ➤ To provide adequate food and keep the animals clean shed. ➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. ➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place. ➤ Feed silage & hay material along with concentrate feed. ➤ Use chaff cutter for fodder. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water. ➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.
------------------	---	---	--