

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
તા. ૨૧-૦૩-૨૦૧૫ થી તા. ૨૫-૦૩-૨૦૧૫

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૫

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	00.0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગે.)	33.9
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગે.)	15.9
ભેજ(%) (સવાર/ખપોરબાદ)	51-26
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	5.2

પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૨૫-૦૩-૧૫ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૧.૦૩.૧૫	૦	૦
	૨૨.૦૩.૧૫	૦	૦
	૨૩.૦૩.૧૫	૦	૦
	૨૪.૦૩.૧૫	૦	૦
	૨૫.૦૩.૧૫	૦	૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્ર.)	૨૧.૦૩.૧૫	૩૨	૩૬
	૨૨.૦૩.૧૫	૩૨	૩૬
	૨૩.૦૩.૧૫	૩૩	૩૭
	૨૪.૦૩.૧૫	૩૩	૩૭
૨૫.૦૩.૧૫		૩૩	૩૭
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્ર.)	૨૧.૦૩.૧૫	૨૧	૨૧
	૨૨.૦૩.૧૫	૨૧	૨૧
	૨૩.૦૩.૧૫	૨૨	૨૨
	૨૪.૦૩.૧૫	૨૨	૨૨
	૨૫.૦૩.૧૫	૨૨	૨૨
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૧.૦૩.૧૫	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૨૨.૦૩.૧૫	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૨૩.૦૩.૧૫	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૨૪.૦૩.૧૫	મોટેભાગે ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૨૫.૦૩.૧૫	અંશતઃ વાદળણાયુ	અંશતઃ વાદળણાયુ
મહત્વમાન લેજ (%)	૨૧.૦૩.૧૫	૬૦	૫૮
	૨૨.૦૩.૧૫	૬૩	૬૨
	૨૩.૦૩.૧૫	૬૩	૬૪
	૨૪.૦૩.૧૫	૬૪	૬૬
	૨૫.૦૩.૧૫	૫૯	૬૨
લઘુત્વમાન લેજ (%)	૨૧.૦૩.૧૫	૪૩	૩૭
	૨૨.૦૩.૧૫	૪૭	૪૩
	૨૩.૦૩.૧૫	૪૯	૪૫
	૨૪.૦૩.૧૫	૫૦	૪૪
	૨૫.૦૩.૧૫	૫૨	૪૮
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૧.૦૩.૧૫	૦૧૯	૦૧૮
	૨૨.૦૩.૧૫	૦૨૧	૦૨૦
	૨૩.૦૩.૧૫	૦૧૯	૦૧૭
	૨૪.૦૩.૧૫	૦૨૨	૦૧૯
	૨૫.૦૩.૧૫	૦૨૨	૦૨૫
પવનની દિશા (ડાય્રી)	૨૧.૦૩.૧૫	૩૫૦	૩૪૦
	૨૨.૦૩.૧૫	૩૩૦	૩૩૦
	૨૩.૦૩.૧૫	૩૩૦	૩૩૦
	૨૪.૦૩.૧૫	૩૩૦	૩૨૦
	૨૫.૦૩.૧૫	૩૨૦	૩૨૦

દક્ષિણ ખેત આબોહવાક્રિય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર ફૂષિ સલાહ)

પાકનું નામ	ફૂષિ સલાહ
ઉનાળુ મગાફળી	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકમાં થીઓસના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોફોસ 20 મીલી દવાનો 10 લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો. ❖ વહેલા લાગતા પાનના ટપકાના રોગના નિયંત્રણ માટે 300 ગ્રામ કાર્બોનડાઇમ 12 % + મેન્કોઝેબ 53 % wp /એકર/ 150 લીટર પાણીમાં ભેણવી છંટકાવ કરવો. ❖ વધુ પડતા નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતર આપવાથી વાનસ્પતિક વૃધ્ઘિ થાય છે અને ઉત્પાદન ઘટે છે. ખોટો ખર્ચ નિવારવા પુર્તિ ખાતરો ના આપવા
ઉનાળુ તલ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ બીજને વાવતા પહેલા થાઈરમ અથવા મેન્કોઝેબ અથવા કાર્બોનડાઇમ દવાનો પટ પ્રતિ કીલોગ્રામ બીજ દીઠ 2 થી 3 ગ્રામ મુજબ આપવો.
ઉનાળુ મગા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ બીજને વાવતા પહેલા થાઈરમ અથવા મેન્કોઝેબ અથવા કાર્બોનડાઇમ દવાનો પટ પ્રતિ કીલોગ્રામ બીજ દીઠ 2 થી 3 ગ્રામ મુજબ આપવો. ❖ વાવેતર માટે ગુજરાત મગ- 4 અથવા કે-૮૫૧ જાત પસંદ કરવી. ❖ પાયાના ખાતર તરીકે 14.0 કીલો ડિ.એ.પી અને 1.5 કીલો યુરીયા પ્રતી વીધા મુજબ આપવું.
લસણ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાન ની ટોચના સુકારા રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ દવા 25 ગ્રામ ને 10 લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં થીઓસના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોફોસ 20 મીલી દવાનો 10 લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો.
ધાણા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ સફેદમાખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ 50 મીલી/ પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો જો વધારે ઉપક્રમ જણાય તો એસીફેટ દવા 15 ગ્રામ/10 મીલી પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં બુકીછારાના નિયંત્રણ માટે હેક્ટાકોનાઝોલ 15 મીલી દવાનો 10 લીટર પાણી ભેણવીને છંટકાવ કરવો.
દિવેલા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ઘોડીયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે કવીનાલફોસ 20 મીલી 10 લીટર પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો
શાકભાજ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ સ્પોટેડ વીલ્ટ વાયરસના નિયંત્રણ માટે પાકની રોપણી પછી 10 થી 12 દિવસના અંતરે 5 ગ્રામ કાર્બોનડાઇમ (50 % વે.પા.) 10 લિટર પાણીમાં ઓગાળી ને છાંટવું જેથી રોગનું પ્રમાણ ઓછુ રહે છે અને ઉત્પાદન વધારે મળે છે. ❖ પાક એક થી દોઢ માસનો થાય ત્યારે 50 % વે.પા. કાર્બોનડાઇમ 10 ગ્રામ અથવા 75 % વે.પા. મેન્કોઝેબ 25 ગ્રામ અથવા 50 % તામબાયુક્ત દવા 50 ગ્રામ 10

	લીટર પાણીમા ઓગાળી ત્રણ છંટકાવ કરવાથી પાનજા ટપકા તથા ફળના સડાનો રોગનુ નિયંત્રણ કરી શકાય છે.
આબો	<ul style="list-style-type: none"> ❖ મધ્યાના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાકલોપ્રીડ ૫ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી ૧૦ દીવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા. ❖ પાકમાં બુકીધારાના નિયંત્રણ માટે હેકાક્રોનાઝોલ ૧૫ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી લેળવીને છંટકાવ કરવો.
પશુ પાલન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. ❖ પશુમા કુટ અને માઉથ રોગના આવે તે માટે જરૂરી રશીકરણ કરાવવુ. ❖ પશુમા કાળીયા તાવનો રોગના આવે તે માટે જરૂરી રશીકરણ કરાવવુ.

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 20-03-2015

(Period from 21 to 25 March-2015)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	00.0
Maximum temperature °C	31.5-35.8
Minimum temperature °C	15.5-16.6
RH % (Morning/Afternoon)	51-26
Wind speed (Kmph)	4.3-5.8
Cloud cover	0-2

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 25-03-2015

Parameters	Day-1 21-03-15	Day-2 22-03-15	Day-3 23-03-15	Day-4 24-03-15	Day-5 25-03-15
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	32	32	33	33	33
Minimum temperature °C	21	21	22	22	22
Cloud cover (Okta)	0	0	0	1	4
RH % (Morning/After noon)	60-43	63-47	63-49	64-51	59-52
Wind speed (Kmph)	019	021	019	022	022
Wind direction(Deg)	350	330	330	330	320

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Groundnut	Growth	<ul style="list-style-type: none"> For the control of thrips, spray Profenophos @ 20 ml in 10 liter of water. For the control of early leaf spot, spray 300gm Carbendenzim 12 + Mencozeb 63 % WP / acre/ 150 liter of water.
Summer Sesame	Sowing/ Germination	<ul style="list-style-type: none"> Seed should be treated with thiram or mancozeb or Carbendazim @ 2 to 3g per 1 kg of seed before sowing.
Summer Mung	Sowing/ Germination	<ul style="list-style-type: none"> Seed should be treated with thiram or mancozeb or Carbendazim @ 2 to 3g per 1 kg of seed before sowing. Select the variety either Gujarat Mung-4 or K-851 for sowing. The basal dose fertilizer should be applied @ 14.0kg DAP /Vigha and 1.6 kg Urea/vigha.
Coriander	Seed formation	<ul style="list-style-type: none"> For the control of white fly spray neem oil @ 50 ml/10 liter of water if infestation is more, spray acephate @ 15 gm/ 10 liter of water. For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol 15 ml in 10 liter of water.
Garlic	Bulb development	<ul style="list-style-type: none"> For the control of white tip, spray Mencozeb 25 ml/10 liter of water.

		<ul style="list-style-type: none"> For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 liter of water.
Castor	Capsule formation	<ul style="list-style-type: none"> For the control of semi lopper, spray quinalphos 20 ml in 10 liter of water.
Vegetables	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval. For the control of fruit rot, three spray of 50 WP carbrndenzim 10 gm or 75 WP Mencozeb 25 gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.
Mango	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of leaf hopper, spray Imidaclopride 5 ml in 10 liter of water. For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol@50ml in 10 liter of water.
Livestock	-	<ul style="list-style-type: none"> Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. Keep animals in shed to protect against cold. Do vaccination in animal for the prevention of FMD disease. Do vaccination in animal for the prevention of black fever disease. The beaks of bird in poultry under the age of 15 weeks should be cut.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date :20-03-2015

(Period from 21 to 25 March-2015)

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 25-03-2015

Parameters	Day-1 21-03-15	Day-2 22-03-15	Day-3 23-03-15	Day-4 24-03-15	Day-5 25-03-15
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	36	36	37	37	37
Minimum temperature °C	21	21	22	22	22
Cloud cover (Okta)	0	0	0	0	4
RH % (Morning/After noon)	58-37	62-43	64-45	66-44	62-48
Wind speed (Kmph)	018	020	017	019	025
Wind direction(Deg)	340	330	330	320	320

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Groundnut	Growth	<ul style="list-style-type: none"> For the control of thrips, spray Profenophos @ 20 ml in 10 liter of water. For the control of early leaf spot, spray 300gm Carbendenzim 12 + Mencozeb 63 % WP / acre/ 150 liter of water.
Summer Sesame	Sowing/ Germination	<ul style="list-style-type: none"> Seed should be treated with thiram or mancozeb or Carbendazim @ 2 to 3g per 1 kg of seed before sowing.
Summer Mung	Sowing/ Germination	<ul style="list-style-type: none"> Seed should be treated with thiram or mancozeb or Carbendazim @ 2 to 3g per 1 kg of seed before sowing. Select the variety either Gujarat Mung-4 or K-851 for sowing. The basal dose fertilizer should be applied @ 14.0kg DAP /Vigha and 1.6 kg Urea/vigha.
Coriander	Seed formation	<ul style="list-style-type: none"> For the control of white fly spray neem oil @ 50 ml/10 liter of water of infestation is more, spray acephate @ 15 gm/ 10 liter of water. For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol 15 ml in 10 liter of water.
Garlic	Bulb development	<ul style="list-style-type: none"> For the control of white tip, spray Mencozeb 25 ml/10 liter of water. For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 liter of water.
Castor	Capsule formation	<ul style="list-style-type: none"> For the control of semi lopper, spray quinalphos 20 ml in 10 liter of water.
Vegetables	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.

		<ul style="list-style-type: none"> For the control of fruit rot, three spray of 50 WP carbrndenzim 10 gm or 75 WP Mencozeb 25 gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.
Mango	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of leaf hopper, spray Imidaclopride 5 ml in 10 liter of water. For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol@50ml in 10 liter of water.
Livestock	-	<ul style="list-style-type: none"> Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. Keep animals in shed to protect against cold. Do vaccination in animal for the prevention of FMD disease. Do vaccination in animal for the prevention of black fever disease. The beaks of bird in poultry under the age of 15 weeks should be cut.