

**હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
તા. ૨૨-૦૮-૨૦૧૫ થી તા. ૨૬-૦૮-૨૦૧૫**

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૫

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	04.2
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	33.0
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	25.0
ભોજ(%) (સવાર/ખપોરખાદ)	87-66
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	2.9

પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૨૬-૦૮-૧૫ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૨.૦૮.૧૫	2	2
	૨૩.૦૮.૧૫	2	2
	૨૪.૦૮.૧૫	0	0
	૨૫.૦૮.૧૫	0	0
	૨૬.૦૮.૧૫	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૨.૦૮.૧૫	32	31
	૨૩.૦૮.૧૫	32	31
	૨૪.૦૮.૧૫	32	31
	૨૫.૦૮.૧૫	32	31
	૨૬.૦૮.૧૫	32	31
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૨.૦૮.૧૫	25	26
	૨૩.૦૮.૧૫	26	26
	૨૪.૦૮.૧૫	25	26
	૨૫.૦૮.૧૫	25	26
	૨૬.૦૮.૧૫	25	25
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટોબર)	૨૨.૦૮.૧૫	મોટેભાગે વાદળછાયું	મોટેભાગે વાદળછાયું
	૨૩.૦૮.૧૫	વાદળછાયું	વાદળછાયું
	૨૪.૦૮.૧૫	મોટેભાગે વાદળછાયું	મોટેભાગે વાદળછાયું
	૨૫.૦૮.૧૫	મોટેભાગે વાદળછાયું	મોટેભાગે વાદળછાયું
	૨૬.૦૮.૧૫	મોટેભાગે વાદળછાયું	મોટેભાગે વાદળછાયું
મહત્વમાન લેજ (%)	૨૨.૦૮.૧૫	83	83
	૨૩.૦૮.૧૫	84	84
	૨૪.૦૮.૧૫	84	85
	૨૫.૦૮.૧૫	84	84
	૨૬.૦૮.૧૫	84	85
લઘુત્વમાન લેજ (%)	૨૨.૦૮.૧૫	77	79
	૨૩.૦૮.૧૫	80	81
	૨૪.૦૮.૧૫	80	81
	૨૫.૦૮.૧૫	78	80
	૨૬.૦૮.૧૫	79	80
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૨.૦૮.૧૫	034	031
	૨૩.૦૮.૧૫	035	033
	૨૪.૦૮.૧૫	030	028
	૨૫.૦૮.૧૫	028	026
	૨૬.૦૮.૧૫	028	027
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૨૨.૦૮.૧૫	259	259
	૨૩.૦૮.૧૫	250	250
	૨૪.૦૮.૧૫	253	251
	૨૫.૦૮.૧૫	258	257
	૨૬.૦૮.૧૫	256	255

દક્ષિણ ખેત આબોહવાક્ય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર ફૂષિ સલાહ)

પાકનું નામ	ફૂષિ સલાહ
	<p>❖ અગામી પાચ દિવસ દરમયાન હળવા છુટા છવાયા વરસાદના આપટા પડવાની આગાહી હોય વરાપ થયે રાસાયણીક દવાનો છંટકાવ ભલામણ મુજબ કરવો.</p>
મગફળી	<p>❖ થડના કોહવારાના નિયંત્રણ માટે ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી (કુગ) યુક્ત પાવડર ૨.૫ કિલો હેકટરે પાણી સાથે ઓગાળી આપવો અથવા ૨.૫ કિલો પાવડર ખોળ અથવા છાણીયા ખાતર સાથે મીક્ષ કરી ચાસમાં આપવો.</p> <p>❖ મગફળીના પાકમાં થ્રીપ્સ અને લીલી પોપટી જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાકલોપ્રીડ ૫ મીલી અથવા ૩૦ ઈ.સી ડાયમીથીયોટ ૨ મીલી પ્રતિ લીટર પાણીમા લેળવી ૧૫ થી ૨૦ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.</p>
કપાસ	<p>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી.</p> <p>❖ કપાસમાં ગુલાબી ઈયળના નિયત્રણ માટે ૫૦ ઈ.સી. પ્રોફેનોફોસ ૧૦ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમા દવાનું પ્રમાણ રાખી મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો તથા ગુલાબી ઈયળના નર કુદાઓને આકર્ષવા ફેરોમોન ટ્રેપ્સ હેકટરે ૧૦ ની સંપ્રાયામા ગોઠવવા.</p> <p>❖ પાકમાં મોલોમસી અને થ્રીપ્સ ના નિયંત્રણ માટે મીથાઈલ પેરાથીયોન ૧૦ મીલી અથવા મોનોકોટોફોસ ૧૫-૨૦ મીલી અને એસીફેટ ૨૫ ગ્રામ અથવા કલોરપાઈરીફોસ ૨૫ મીલી અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી દવા સાથે ડિટરજન્ટ પાવડર ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમા મિશ્રણ કરી છંટકાવ કરવાથી સારુ પરિણામ મળે છે.</p>
તુવેર	<p>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણની કામગીરી કરવી.</p> <p>❖ તુવેરના પીછીયુ કુદુના રાસાયણીક નિયંત્રણ માટે કવીનાલફોસ ૨૦ મીલી અથવા પ્રોફેનોફોસ ૧૦ મીલી અથવા પોલિટ્રીન ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમા લેળવી છંટકાવ કરવો.</p> <p>❖ તુવેરમાં પુરતી ખાતર તરિકે યુરીયા આપવાથી ઉત્પાદનમાં વધારો થતો નથી માત્ર ખર્ચમાં વધારો થાય છે.</p> <p>❖ પાકમાં શિંગો કોરી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૪૫ એસ.એલ સ્પિનોસાડ ૩ મીલી અથવા કલોરાન્દ્રાનિલીપોલ ૩ મીલી અથવા ફલુબેનીયામાઇડ ૨ મીલી દવા ને ૧૦ લીટર પાણીમા લેળવી બે છંટકાવ કરવા.</p>
સોયાબીન	<p>❖ વધુ ઉત્પાદન અને યોઝ્મી આવક મેળવવા માટે સોયાબીનનું વાવેતર કર્યું બાદ ૩૦ દિવસે રીલે આંતરપાક પદ્ધિતથી સોયાબીનની બે હાર પછી એક હાર એરંડાનું વાવેતર કરવું.</p> <p>❖ પાકમા લશકરી ઈયળનો ઉપક્રમ ખુબ જોવા મળે તો તેના નિયંત્રણ માટે સંકલિત જીવાત નિયંત્રણના પગલા લેવા. જેવાકે ઉંડી ખેડ કરવી, ફેરોમેન ટ્રેપ, વર્ટિસેલીયમ</p>

	લોહાટી કુગા, લિંબોળીનો એક વરેનો ઉપયોગ કરવો.
રીંગણા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ચુસીયા પ્રકારની જાવાતના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનું મીજનું ૫ ટકા એકનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્બ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો
લડો	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકમાં ચુસીયા ના નિયંત્રણ માટે એસીટામ્બ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અને લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનું મીજનું ૫ ટકા એકનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો દ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો
પશુ પાલન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પશુઓને યોગય આહાર આપવો. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેશ્થીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. ❖ પશુમા કુટ અને માઉથ રોગના આવે તે માટે જરૂરી રષીકરણ કરાવવું. ❖ પશુઓને વરસાદના સમયે ખુલ્લામા, ઝાડ નીચેકે ઇલેક્ટ્રીક પોલ પાસે ન રાખતા શેડમાં બાંધવાની વ્યવસ્થા કરવી.

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 21-08-2015

(Period from 22 to 26 August -2015)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	04.2
Maximum temperature °C	32.5-33.3
Minimum temperature °C	25.0-25.2
RH % (Morning/Afternoon)	87-66
Wind speed (Kmph)	2.4-3.8
Cloud cover	4-8

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 26-08-2015

Parameters	Day-1 22-08-15	Day-2 23-08-15	Day-3 24-08-15	Day-4 25-08-15	Day-5 26-08-15
Rain fall (mm)	2	2	0	0	0
Maximum temperature °C	32	32	32	32	32
Minimum temperature °C	25	26	25	25	25
Cloud cover (Okta)	7	8	7	6	7
RH % (Morning/After noon)	83-77	84-80	84-80	84-78	84-79
Wind speed (Kmph)	034	035	030	028	028
Wind direction(Deg)	259	250	253	258	256

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
<ul style="list-style-type: none"> There is slightly to medium forecasting of rainfall during next five days. 			
Groundnut	Flowering	GG-20, GG-11	➤ For the control of root rot, Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil.
		Root rot	➤ For the control of thrips and jassid, spray imidaclopride 5 ml or Diamethoate 3-4 ml in 10 liter of water.
Cotton	Growth	Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...	➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.
		Pink bollworm	➤ Spray either Quinalphos 25EC 20ml or Fenvalrat 20EC 10ml or polytrin C 44EC 10ml or Aemamectin 5 WG 2gm ➤ For the attraction of male moth of pink bollworm erect 10 pheromon traps per one ha.

		Thrips and Aphid	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of sucking pest, spray methyl parathion 10 ml or monocrotophos 15-20 ml and Acefet 25 gram or clorpyriphos 25 ml or profenophos 20 ml with 10 gram detergent powder mix in 10 liter of water.
Soybean	Growth	Gujarat Soybean-1,2,3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ More income & get more production on the 30-45 DAS of soybean relay intercropping soybean planting with two rows of castor.
		Prodenia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apply IPM viz., deep ploughing, feromen trap, <i>Verticillium lacani</i>, neem seed extract etc. for the control of Prodenia.
Pigeon pea	Growth	BDN-2, GTH-1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition. ➤ For the control of moth, spray quinaphos 20 ml or profenophos 10 ml or politrin 10 ml in 10 liter of water.
		Pod borer	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of pod borer, spray spinosad 5 ml OR clorantrinilipol 3 ml OR flubendimide 2 ml in 10 liter of water.
Brinjla	Flowering/ fruiting	Thrips and White Fly	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).
Lady's finger	Flowering/ fruiting	Shoot and fruit borer	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.
Livestock	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases. ➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date :21-08-2015

(Period from 22 to 26 August -2015)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 26-08-2015

Parameters	Day-1 22-08-15	Day-2 23-08-15	Day-3 24-08-15	Day-4 25-08-15	Day-5 26-08-15
Rain fall (mm)	2	2	0	0	0
Maximum temperature °C	31	31	31	31	31
Minimum temperature °C	26	26	26	26	25
Cloud cover (Okta)	7	8	7	7	7
RH % (Morning/After noon)	83-79	84-81	85-81	84-80	85-80
Wind speed (Kmph)	031	033	028	026	027
Wind direction(Deg)	259	250	251	257	255

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
<ul style="list-style-type: none"> There is slightly to medium forecasting of rainfall during next five days. 			
Groundnut	Flowering	GG-20, GG-11	<ul style="list-style-type: none"> For the control of root rot, Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil.
		Root rot	<ul style="list-style-type: none"> For the control of thrips and jassid, spray imidaclopride 5 ml or Diamethoate 3-4 ml in 10 liter of water.
Cotton	Growth	Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...	<ul style="list-style-type: none"> Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.
		Pink bollworm	<ul style="list-style-type: none"> Spray either Quinalphos 25EC 20ml or Fenvalrat 20EC 10ml or polytrin C 44EC 10ml or Aemamectin 5 WG 2gm For the attraction of male moth of pink bollworm erect 10 pheromon traps per one ha.
		Thrips and Aphid	<ul style="list-style-type: none"> For the control of sucking pest, spray methyl parathion 10 ml or monocrotophos 15-20 ml and Acefet 25 gram or clorpyrifos 25 ml or prophenophos 20 ml with 10 gram detergent powder mix in 10 liter of water.
Soybean	Growth	Gujarat Soybean-1,2,3	<ul style="list-style-type: none"> More income & get more production on the 30-45 DAS of soybean relay intercropping

			soybean planting with two rows of castor.
		Prodenia	➤ Apply IPM viz., deep ploughing, feromen trap, <i>Verticillium lacani</i> , neem seed extract etc. for the control of Prodenia.
Pigeon pea	Growth	BDN-2, GTH-1	➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition. ➤ For the control of moth, spray quinaphos 20 ml or profenophos 10 ml or politrin 10 ml in 10 liter of water.
		Pod borer	➤ For the control of pod borer, spray spinosad 5 ml OR clorantrinilipol 3 ml OR flubendimide 2 ml in 10 liter of water.
Brinjla	Flowering/ fruiting	Thrips and White Fly	➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).
Lady's finger	Flowering/ fruiting	Shoot fruit borer	➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.
Livestock	-	-	➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases. ➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.