

## પત્રક-અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન

( સમય તા : ૨૩.૦૭.૧૪ થી તા : ૨૭.૦૭.૧૪ )

પાછળા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાક્ય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	042.0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગે.)	31.7
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગે.)	24.9
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	93-72
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	10.3

## પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી ( તા. ૨૭.૦૭.૧૪ સુધી)

હવામાન પરીબળોઅ	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૩.૭.૧૪	૦	૦
	૨૪.૭.૧૪	૧૦	૧૧
	૨૫.૭.૧૪	૧૦	૬
	૨૬.૭.૧૪	૩	૦
	૨૭.૭.૧૪	૦	૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૩.૭.૧૪	૩૨	૩૨
	૨૪.૭.૧૪	૩૨	૩૨
	૨૫.૭.૧૪	૩૧	૩૩
	૨૬.૭.૧૪	૩૧	૩૩
	૨૭.૭.૧૪	૩૧	૩૩
લઘૃતમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૩.૭.૧૪	૨૫	૨૭
	૨૪.૭.૧૪	૨૬	૨૭
	૨૫.૭.૧૪	૨૬	૨૬
	૨૬.૭.૧૪	૨૬	૨૬
	૨૭.૭.૧૪	૨૬	૨૬
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો)	૨૩.૭.૧૪	મોટેભાગે વાદળછાયુ	મોટેભાગે વાદળછાયુ
	૨૪.૭.૧૪	મોટેભાગે વાદળછાયુ	મોટેભાગે વાદળછાયુ
	૨૫.૭.૧૪	મોટેભાગે વાદળછાયુ	મોટેભાગે વાદળછાયુ
	૨૬.૭.૧૪	મોટેભાગે વાદળછાયુ	મોટેભાગે વાદળછાયુ
	૨૭.૭.૧૪	મોટેભાગે વાદળછાયુ	મોટેભાગે વાદળછાયુ
મહત્વમાન ભેજ (%)	૨૩.૭.૧૪	૮૦	૮૦
	૨૪.૭.૧૪	૮૨	૮૨
	૨૫.૭.૧૪	૮૧	૮૦
	૨૬.૭.૧૪	૮૦	૮૦
	૨૭.૭.૧૪	૮૦	૮૦
લઘૃતમાન ભેજ (%)	૨૩.૭.૧૪	૭૫	૭૪
	૨૪.૭.૧૪	૭૭	૭૭
	૨૫.૭.૧૪	૭૫	૭૪
	૨૬.૭.૧૪	૭૪	૭૩
	૨૭.૭.૧૪	૭૩	૭૨
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૩.૭.૧૪	૦૩૨	૦૩૦
	૨૪.૭.૧૪	૦૩૨	૦૩૦
	૨૫.૭.૧૪	૦૩૧	૦૨૯
	૨૬.૭.૧૪	૦૨૯	૦૨૬
	૨૭.૭.૧૪	૦૩૦	૦૨૮
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૩.૭.૧૪	૨૫૦	૨૫૦
	૨૪.૭.૧૪	૨૫૦	૨૪૦
	૨૫.૭.૧૪	૨૪૦	૨૩૦
	૨૬.૭.૧૪	૨૪૦	૨૪૦
	૨૭.૭.૧૪	૨૪૦	૨૪૦

## પત્રક-૯

### જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
<b>દક્ષિણ આબોહવાક્ય વિસ્તાર</b>  <b>ખેત</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકમાં જરૂરીયાત મુજબ સમયાંતરે આતરખેડ અને નિંદામણ જેવી કામગીરી હાથ ધરવી.</li> <li>❖ વાદળથાયા વાતાવરણના લીધે પાકમાં ઉગસુકનો રોગ જોવા મળે શકે છે તો તેના નિયંત્રણ માટે બીજ ને થાયરમ નો પટ આપવો અથવા જમીનમાં ૬ કીગ્રા/હે. ટ્રાઇકોડરમા પાવડરનો છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ મગફળી પીળી પડી જાય તો ૧૦૦ ગ્રામ ફેરસ સલ્ફેટ અને ૧૦ ગ્રામ લીમ્બુના ફુલને ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળીને છંટકાવ કરવો. જરૂર પડે તો ૮ થી ૧૦ દિવસે ફરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકમાં જરૂરીયાત મુજબ સમયાંતરે આતરખેડ અને નિંદામણ જેવી કામગીરી હાથ ધરવી.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકમાં જરૂરીયાત મુજબ સમયાંતરે આતરખેડ અને નિંદામણ જેવી કામગીરી હાથ ધરવી.</li> </ul>
<b>શાકભાજુ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વાતાવરણમાં ભેજ વધવાને કારણે કીટક અને રોગનું પ્રમાણ વધે નહી તેના માટે યોગ્ય કાળજી લેવી. ચોમાસુ શાકભાજુ જેવાકે રીંગણા, ટમેટા, મરચા વગેરે માટે ધરૂવાડી તૈયાર કરવા.</li> <li>❖ અગામી પાચ દિવસમા ઘણા સ્થળો પર મધ્યમ વરસાદ પડવાની સંભાવના હોય તો પિયત ટાળવું તેમજ દવા જેવા રાસાયણીક દવાનો ઉપયોગ કરવો નહી.</li> </ul>
<b>પશુ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો. પશુઓને માખી અને મચ્છરથી બચાવવા માટે રહેવાની જગ્યા સ્વચ્છ કરવી.</li> </ul>

## JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date: 22-07-2014

**(Period from 23 to 27 July -2014)**

### Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	042.0
Maximum temperature °C	29.8-32.8
Minimum temperature °C	24.5-25.4
RH % (Morning/Afternoon)	93-72
Wind speed (Kmph)	9.3-11.9
Cloud cover	6-8

### Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 27-07-2014

Parameters	Day-1 23-07-14	Day-2 24-07-14	Day-3 25-07-14	Day-4 26-07-14	Day-5 27-07-14
Rain fall (mm)	0	10	10	3	0
Maximum temperature °C	32	32	31	31	31
Minimum temperature °C	25	26	26	26	26
Cloud cover (Okta)	6	7	6	6	5
RH % (Morning/After noon)	80-75	82-77	81-75	80-74	80-73
Wind speed (Kmph)	032	032	031	029	030
Wind direction(Deg)	250	250	240	240	240

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
<b>Kharif Groundnut</b>	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> <li>During vaspa condition Interculturing and hand weeding practices should be carried out.</li> <li>Due to cloudy whether condition, there is chance for the incidence of collar rot of groundnut, for the control of seed treatment and soil application with <i>Tricoderama</i> at 6 kg/ha.</li> <li>For the control of yellowish of groundnut, spray 100 gm ferrous sulphate or 10 gm lemon flower in 10 liter of water at 8 to 10 days interval.</li> </ul>
<b>Cotton</b>	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> <li>During vaspa condition Interculturing and hand weeding practices should be carried out.</li> </ul>
<b>Soybean</b>	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> <li>During vaspa condition Interculturing and hand weeding practices should be carried out.</li> </ul>
<b>Vegetable</b>	Seedling/ Nursery	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be chances of pest/ disease infestation in vegetables due to increase in relative humidity so take appropriate precautions against them. Prepared the nursery for kharif vegetables like brinjal, tomato, chilli etc.</li> <li>Due to moderate rainfall forecast during next five days at most places avoid irrigation and chemical application.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes.</li> </ul>

## PORBANDAR

**Phone : 0285-2670139**

**Date : 22-07-2014**

**(Period from 23 to 27 July -2014)**

**Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 27-07-2014**

Parameters	Day-1 23-07-14	Day-2 24-07-14	Day-3 25-07-14	Day-4 26-07-14	Day-5 27-07-14
Rain fall (mm)	0	11	6	0	0
Maximum temperature °C	32	32	33	33	33
Minimum temperature °C	27	27	26	26	26
Cloud cover (Okta)	6	7	7	6	5
RH % (Morning/After noon)	80-74	82-77	80-74	80-73	80-72
Wind speed (Kmph)	030	030	029	026	028
Wind direction(Deg)	250	240	230	240	240

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
<b>Kharif Groundnut</b>	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> <li>During vaspa condition Interculturing and hand weeding practices should be carried out.</li> <li>Due to cloudy whether condition, there is chance for the incidence of collar rot of groundnut, for the control of seed treatment and soil application with <i>Tricoderama</i> at 6 kg/ha.</li> <li>For the control of yellowish of groundnut, spray 100 gm ferrous sulphate or 10 gm lemon flower in 10 liter of water at 8 to 10 days interval.</li> </ul>
<b>Cotton</b>	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> <li>During vaspa condition Interculturing and hand weeding practices should be carried out.</li> </ul>
<b>Soybean</b>	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> <li>During vaspa condition Interculturing and hand weeding practices should be carried out.</li> </ul>
<b>Vegetable</b>	Seedling/ Nursery	<ul style="list-style-type: none"> <li>There may be chances of pest/ disease infestation in vegetables due to increase in relative humidity so take appropriate precautions against them. Prepared the nursery for kharif vegetables like brinjal, tomato, chilli etc.</li> <li>Due to moderate rainfall forecast during next five days at most places avoid irrigation and chemical application.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes.</li> </ul>