

**હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
તા. ૨૫-૦૮-૨૦૧૫ થી તા. ૨૭-૦૮-૨૦૧૫**

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૫

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	109.8
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	30.7
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	24.2
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	98-95
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	2.4

પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૨૭-૦૮-૧૫ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૩.૦૮.૧૫	2	2
	૨૪.૦૮.૧૫	0	0
	૨૫.૦૮.૧૫	0	0
	૨૬.૦૮.૧૫	0	0
	૨૭.૦૮.૧૫	0	0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૩.૦૮.૧૫	31	31
	૨૪.૦૮.૧૫	31	31
	૨૫.૦૮.૧૫	32	32
	૨૬.૦૮.૧૫	32	32
	૨૭.૦૮.૧૫	32	32
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૩.૦૮.૧૫	26	26
	૨૪.૦૮.૧૫	26	26
	૨૫.૦૮.૧૫	26	26
	૨૬.૦૮.૧૫	26	26
	૨૭.૦૮.૧૫	26	26
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૩.૦૮.૧૫	અશાંત: વાદળછાયુ	અશાંત: વાદળછાયુ
	૨૪.૦૮.૧૫	અશાંત: વાદળછાયુ	અશાંત: વાદળછાયુ
	૨૫.૦૮.૧૫	મોટેભાગે ચોખ્યુ	મોટેભાગે ચોખ્યુ
	૨૬.૦૮.૧૫	મોટેભાગે ચોખ્યુ	મોટેભાગે ચોખ્યુ
	૨૭.૦૮.૧૫	મોટેભાગે ચોખ્યુ	મોટેભાગે ચોખ્યુ
મહત્વમાન લેજ (%)	૨૩.૦૮.૧૫	88	88
	૨૪.૦૮.૧૫	86	86
	૨૫.૦૮.૧૫	86	86
	૨૬.૦૮.૧૫	85	84
	૨૭.૦૮.૧૫	85	85
લઘુત્વમાન લેજ (%)	૨૩.૦૮.૧૫	83	82
	૨૪.૦૮.૧૫	77	75
	૨૫.૦૮.૧૫	75	74
	૨૬.૦૮.૧૫	74	73
	૨૭.૦૮.૧૫	75	74
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૩.૦૮.૧૫	019	019
	૨૪.૦૮.૧૫	016	015
	૨૫.૦૮.૧૫	018	017
	૨૬.૦૮.૧૫	019	019
	૨૭.૦૮.૧૫	018	017
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૨૩.૦૮.૧૫	218	214
	૨૪.૦૮.૧૫	226	221
	૨૫.૦૮.૧૫	240	238
	૨૬.૦૮.૧૫	242	240
	૨૭.૦૮.૧૫	240	236

દક્ષિણ ખેત આબોહવાક્રિય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર ફૂષિ સલાહ)

પાકનું નામ	ફૂષિ સલાહ
❖ અગામી પાચ દિવસ દરમયાન નહિવત વરસાદ પડવાની આગાહી છે.	
મગફળી	<ul style="list-style-type: none"> ❖ થડના કોહવારાના નિયંત્રણ માટે દ્રાયકોડર્મા વીરીડી (કુગ) યુક્ત પાવડર ૨.૫ કિલો હેકટરે પાણી સાથે ઓગાળી આપવો અથવા ૨.૫ કિલો પાવડર ખોળ અથવા છાણીયા ખાતર સાથે મીક્ષ કરી ચાસમાં આપવો. ❖ મગફળીના પાકમાં થ્રીપ્સ અને લીલી પોપટી જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૫ મીલી અથવા ૩૦ ઈ.સી ડાયમીથીયોટ ૨ મીલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી ૧૫ થી ૨૦ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા. ❖ મગફળીમા પાન ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે ક્લોરોપાયરીઝોસ ૨૫ મીલી અથવા ડાયક્લોરોવોસ ૫ મીલી પ્રવાહી ૧૦ લીટર પાણીના ભેળવી છંટકાવ કરવો.
કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકમાં ચુસીયા પ્રકારની જાવાત ના નિયંત્રણ માટે મીથાઈલ પેરાથીયોન ૧૦ મીલી અથવા મોનોકોટોઝોસ ૧૫-૨૦ મીલી અને એસીફેટ ૨૫ ગ્રામ અથવા ક્લોરપાઈરીઝોસ ૨૫ મીલી અથવા પ્રોફેનોઝોસ ૨૦ મીલી દવા અથવા ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૫ મીલી અથવા થાયોમીથીક્ઝામ ૩ ગ્રામ સાથે ડિટરજન્ટ પાવડર ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમા મિશ્રણ કરી છંટકાવ કરવાથી સારુ પરિણામ મળે છે.
તુવેર	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકમાં શિંગો કોરી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૪૫ એસ.એલ સ્પિનોસાડ ૩ મીલી અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનિલીપોલ ૩ મીલી અથવા ફલુબેનીયામાઈડ ૨ મીલી દવા ને ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી બે છંટકાવ કરવા.
સોયાબીન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકમા લશકરી ઈયળનો ઉપદ્રવ ખુબ જોવા મળે તો તેના નિયંત્રણ માટે સંકલિત જીવાત નિયંત્રણના પગલા લેવા. જેવાકે ઊંડી ખેડ કરવી, ફેરોમેન ટ્રેપ, વર્ટીસેલીયમ લોહાટી કુગ, લિંબોળીનો અંક વગેરેનો ઉપયોગ કરવો.
રીંગણા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ચુસીયા પ્રકારની જાવાતના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનુ મીજનુ ૫ ટકા અર્કનુ દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો
ભાડો	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકમાં ચુસીયા ના નિયંત્રણ માટે એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અને લીબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનુ મીજનુ ૫ ટકા અર્કનુ દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો દ્રાયજોઝોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો
પશુ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો.

પાલન

- ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.
- ❖ પશુમા કુટ અને માઉથ રોગના આવે તે માટે જરૂરી રશીકરણ કરાવવું.
- ❖ પશુઓને વરસાદના સમયે ખુલ્લામા, ઝાડ નીચેકે ઇલેક્ટ્રીક પોલ પાસે ન રાખતા શેડમાં બાંધવાની વ્યવસ્થા કરવી.

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 22-09-2015

(Period from 23 to 27 Sept. -2015)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	109.8
Maximum temperature °C	27.6-35.8
Minimum temperature °C	23.6-25.5
RH % (Morning/Afternoon)	98-95
Wind speed (Kmph)	1.0-4.2
Cloud cover	7-8

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 27-09-2015

Parameters	Day-1 23-09-15	Day-2 24-09-15	Day-3 25-09-15	Day-4 26-09-15	Day-5 27-09-15
Rain fall (mm)	2	0	0	0	0
Maximum temperature °C	31	31	32	32	32
Minimum temperature °C	26	26	26	26	26
Cloud cover (Okta)	5	3	2	1	2
RH % (Morning/After noon)	88-83	86-77	86-75	85-74	85-75
Wind speed (Kmph)	019	016	018	019	018
Wind direction(Deg)	218	226	240	242	240

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
<ul style="list-style-type: none"> • There is no forecasting of rainfall during next five days. 			
Groundnut	Pegging	GG-20, GG-11	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of root rot, Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil.
		Root rot	
		Thrips and Jassid	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of thrips and jassid, spray imidaclopride 5 ml or Diamethoate 3-4 ml in 10 liter of water.
		Prodenia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of prodenia, spray cloropyriphos 25 ml OR dichlorvos 50 ml in 10 liter of water.
Cotton	Growth/Ball formation	Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of sucking pest, spray methyl parathion 10 ml or monocrotophos 15-20 ml and Acefet 25 gram or clorpyriphos 25 ml or prophenophos 20 ml OR Thiomethoxam 3 gm or imidaclopride 5 ml with 10 gram detergent powder mix in 10 liter of water.
		Sucking pest (Thrips, Aphid and white fly)	

Soybean	Growth	Gujarat Soybean-1,2,3	➤ Apply IPM viz., deep ploughing, feromen trap, <i>Verticillium lacani</i> , neem seed extract etc. for the control of Prodenia.
		Prodenia	
Pigeon pea	Growth	BDN-2, GTH-1	➤ For the control of pod borer, spray spinosad 5 ml OR clorantrinilipol 3 ml OR flubendimide 2 ml in 10 liter of water.
		Pod borer	
Brinjla	Flowering/ fruiting	Thrips and White Fly	➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).
Lady's finger	Flowering/ fruiting	Shoot and fruit borer	➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.
Livestock	-	-	➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases. ➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date :22-09-2015

(Period from 23 to 27 Sept. -2015)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 27-09-2015

Parameters	Day-1 23-09-15	Day-2 24-09-15	Day-3 25-09-15	Day-4 26-09-15	Day-5 27-09-15
Rain fall (mm)	2	0	0	0	0
Maximum temperature °C	31	31	32	32	32
Minimum temperature °C	26	26	26	26	26
Cloud cover (Okta)	4	3	2	1	2
RH % (Morning/After noon)	88-82	86-75	86-74	84-73	85-74
Wind speed (Kmph)	019	015	017	019	017
Wind direction(Deg)	214	221	238	240	236

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
<ul style="list-style-type: none"> • There is no forecasting of rainfall during next five days. 			
Groundnut	Pegging	GG-20, GG-11	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of root rot, Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil.
		Root rot	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of thrips and jassid, spray imidaclopride 5 ml or Diamethoate 3-4 ml in 10 liter of water.
		Thrips and Jassid	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of prodenia, spray cloropyriphos 25 ml OR dichlorvos 50 ml in 10 liter of water.
		Prodenia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of sucking pest, spray methyl parathion 10 ml or monocrotophos 15-20 ml and Acefet 25 gram or clorpyriphos 25 ml or prophenophos 20 ml OR Thiomethoxam 3 gm or imidaclopride 5 ml with 10 gram detergent powder mix in 10 liter of water.
Cotton	Growth/Ball formation	Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of sucking pest, spray methyl parathion 10 ml or monocrotophos 15-20 ml and Acefet 25 gram or clorpyriphos 25 ml or prophenophos 20 ml OR Thiomethoxam 3 gm or imidaclopride 5 ml with 10 gram detergent powder mix in 10 liter of water.
		Sucking pest (Thrips, Aphid and white fly)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of pod borer, spray spinosad 5 ml OR clorantrinilipol 3 ml OR flubendimide 2 ml in 10 liter of water.
Soybean	Growth	Gujarat Soybean-1,2,3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apply IPM viz., deep ploughing, feromen trap, <i>Verticillium lacani</i>, neem seed extract etc. for the control of Prodenia.
Pigeon pea	Growth	BDN-2, GTH-1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of pod borer, spray spinosad 5 ml OR clorantrinilipol 3 ml OR flubendimide 2 ml in 10 liter of water.
		Pod borer	

Brinjal	Flowering/ fruiting	Thrips and White Fly	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).
Lady's finger	Flowering/ fruiting	Shoot and fruit borer	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval. ➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.
Livestock	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases. ➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition. ➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.