

**હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ  
તા. ૨૫-૦૭-૨૦૧૫ થી તા. ૨૮-૦૭-૨૦૧૫**

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

**હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૫**

**પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન**

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	06.6
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	31.6
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	25.6
ભોજ(%) (સવાર/ખપોરખાદ)	94-82
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	2.5

**પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા. ૨૮-૦૭-૧૫ સુધી)**

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૫.૦૭.૧૫	10	10
	૨૬.૦૭.૧૫	10	10
	૨૭.૦૭.૧૫	33	33
	૨૮.૦૭.૧૫	40	40
	૨૯.૦૭.૧૫	30	30
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૫.૦૭.૧૫	31	31
	૨૬.૦૭.૧૫	30	30
	૨૭.૦૭.૧૫	29	29
	૨૮.૦૭.૧૫	28	28
	૨૯.૦૭.૧૫	28	28
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૫.૦૭.૧૫	27	27
	૨૬.૦૭.૧૫	27	27
	૨૭.૦૭.૧૫	27	27
	૨૮.૦૭.૧૫	27	27
	૨૯.૦૭.૧૫	27	27
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટોબર)	૨૫.૦૭.૧૫	મોટેભાગે વાદળછાયું	મોટેભાગે વાદળછાયું
	૨૬.૦૭.૧૫	મોટેભાગે વાદળછાયું	મોટેભાગે વાદળછાયું
	૨૭.૦૭.૧૫	મોટેભાગે વાદળછાયું	મોટેભાગે વાદળછાયું
	૨૮.૦૭.૧૫	વાદળછાયું	વાદળછાયું
	૨૯.૦૭.૧૫	વાદળછાયું	વાદળછાયું
મહત્વમાન લેજ (%)	૨૫.૦૭.૧૫	83	82
	૨૬.૦૭.૧૫	81	82
	૨૭.૦૭.૧૫	81	81
	૨૮.૦૭.૧૫	84	85
	૨૯.૦૭.૧૫	85	85
લઘુત્વમાન લેજ (%)	૨૫.૦૭.૧૫	76	77
	૨૬.૦૭.૧૫	76	76
	૨૭.૦૭.૧૫	75	75
	૨૮.૦૭.૧૫	77	79
	૨૯.૦૭.૧૫	80	81
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૫.૦૭.૧૫	028	027
	૨૬.૦૭.૧૫	034	034
	૨૭.૦૭.૧૫	038	036
	૨૮.૦૭.૧૫	048	044
	૨૯.૦૭.૧૫	062	065
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૨૫.૦૭.૧૫	247	248
	૨૬.૦૭.૧૫	251	251
	૨૭.૦૭.૧૫	250	249
	૨૮.૦૭.૧૫	245	244
	૨૯.૦૭.૧૫	258	262

## દક્ષિણ ખેત આબોહવાક્ય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર ફૂષિ સલાહ)

પાકનું નામ	ફૂષિ સલાહ
મગફળી	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ અગામી પાચ દિવસ દરમ્યાન હળવા થી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી હોય વરાપ થયે રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ ભલામણ મુજબ કરવો.</li> <li>❖ દ્રાયકોડર્મા વીરીડી (કુગ) યુક્ત પાવડર વાબ્યા પછી 30 દિવસે 2.૫ કિલો હેકટરે પાણી સાથે ઓગાળી આપવો અથવા 2.૫ કિલો પાવડર ખોળ અથવા છાણીયા ખાતર સાથે મીક્ષ કરી ચાસમાં આપવો.</li> <li>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણણની કામગીરી કરવી.</li> </ul>
કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણણની કામગીરી કરવી.</li> <li>❖ અગામી પાચ દિવસ દરમ્યાન હળવા થી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી હોય વરાપ થયે રાસાયણિક દવાનો છંટકાવ ભલામણ મુજબ કરવો</li> </ul>
તુવેર	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણણની કામગીરી કરવી.</li> </ul>
સોયાબીન	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વરાપના સમયે પાકમાં આંતરખેડ અને નિદાંમણણની કામગીરી કરવી.</li> </ul>
રીંગએણા	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ચુસીયા પ્રકારની જાવાતના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનું મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપક્રમ હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો</li> </ul>
ભીડો	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકમાં ચુસીયા ના નિયંત્રણ માટે એસીટામ્રાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ અને લીબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીનું મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો વધુ ઉપક્રમ હોય તો ક્રાયઓફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ મીલી/ ૧૦ લી. પાણીમાં મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો</li> </ul>
પશુ પાલન	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો.</li> <li>❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.</li> <li>❖ પશુમા કુટ અને માઉથ રોગના આવે તે માટે જરૂરી રશીકરણ કરાવવું.</li> <li>❖ પશુઓને વરસાદના સમયે ખુલ્લામા, ઝાડ નીચેકે ઇલેક્ટ્રીક પોલ પાસે ન રાખતા શેડમાં બાંધવાની વ્યવસ્થા કરવી.</li> </ul>

## JUNAGADH

**Phone: 0285-2670139**

**Date:- 24-07-2015**

**(Period from 25 to 29 July -2015)**

### **Significant weather for the preceding week**

Rain fall (mm)	06.6
Maximum temperature °C	30.0-32.5
Minimum temperature °C	25.5-26.0
RH % (Morning/Afternoon)	94-82
Wind speed (Kmph)	1.1-3.8
Cloud cover	8

### **Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 29-07-2015**

Parameters	Day-1 25-07-15	Day-2 26-07-15	Day-3 27-07-15	Day-4 28-07-15	Day-5 29-07-15
Rain fall (mm)	10	10	33	40	30
Maximum temperature °C	31	30	29	28	28
Minimum temperature °C	27	27	27	27	27
Cloud cover (Okta)	6	7	7	8	8
RH % (Morning/After noon)	83-76	81-76	81-75	84-77	85-80
Wind speed (Kmph)	028	034	038	048	062
Wind direction(Deg)	247	251	250	245	258

### **Agro meteorological Advisories**

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
<b>Groundnut</b>	<b>Flowering</b>	<b>GG-20, GG-11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days.</li> <li>➤ Interculturing and hand weeding should be carried out after vaspa condition.</li> <li>➤ Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil.</li> </ul>
<b>Cotton</b>	<b>Growth</b>	<b>Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.</li> <li>➤ There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days.</li> </ul>
<b>Soybean</b>	<b>Growth</b>	<b>Gujarat Soybean-1,2,3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.</li> </ul>
<b>Pigeon pea</b>	<b>Growth</b>	<b>BDN-2, GTH-1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.</li> <li>➤ </li> </ul>
<b>Brinjla</b>	<b>Flowerin/ fruiting</b>	<b>Thrips and White Fly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil</li> </ul>

			50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).
<b>Lady's finger</b>	<b>Flowerin/ fruiting</b>	<b>Shoot and fruit borer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</li> <li>➤ Collect damaged fruits and buried deep in soil.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases.</li> <li>➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition.</li> <li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.</li> </ul>

## PORBANDAR

**Phone : 0285-2670139**

**Date :24-07-2015**

**(Period from 25 to 29 July -2015)**

**Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 29-07-2015**

Parameters	Day-1 25-07-15	Day-2 26-07-15	Day-3 27-07-15	Day-4 28-07-15	Day-5 29-07-15
Rain fall (mm)	10	10	33	40	30
Maximum temperature °C	31	30	29	28	28
Minimum temperature °C	27	27	27	27	27
Cloud cover (Okta)	6	7	6	8	8
RH % (Morning/After noon)	82-77	82-76	81-75	85-79	85-81
Wind speed (Kmph)	027	034	036	044	065
Wind direction(Deg)	248	251	249	244	262

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Insect/Pest/ Variety	Agromet Advisories
<b>Groundnut</b>	<b>Flowering</b>	<b>GG-20, GG-11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days.</li> <li>➤ Interculturing and hand weeding should be carried out after vaspa condition.</li> <li>➤ Mix the <i>Trichoderma viridi</i> powder 2.5 kg/ha + 250kg castor cake and apply when there is sufficient moisture in the soil.</li> </ul>
<b>Cotton</b>	<b>Growth</b>	<b>Bg-II GCH-6, 8, Mallika, Agit, Vikram-5, Uttam, etc...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.</li> <li>➤ There is forecasting of light to moderate rainfall during next five days.</li> </ul>
<b>Soybean</b>	<b>Growth</b>	<b>Gujarat Soybean-1,2,3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.</li> </ul>
<b>Pigeon pea</b>	<b>Growth</b>	<b>BDN-2, GTH-1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interculturing and weeding operation should be carried out after vaspa condition.</li> <li>➤</li> </ul>
<b>Brinjla</b>	<b>Flowerin/ fruiting</b>	<b>Thrips and White Fly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of thrips and white fly, spray neem seed extract 500 ml or neem seed oil 50 ml in 10 litre of water at 15 days interval (4 spray).</li> </ul>
<b>Lady's finger</b>	<b>Flowerin/ fruiting</b>	<b>Shoot fruit borer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For the control of fruit and shoot borer, spray neem seed extract 5 % or neem seed oil 50 ml and acetamiprid 20 % SP@ 5.0 gm / 10 lit of water at 15 days interval.</li> <li>➤ Collect damaged fruits and buried deep in</li> </ul>

			soil.
Livestock	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other diseases.</li> <li>➤ Do not keep the animals in open during rainy weather condition.</li> <li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.</li> </ul>