

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
તા. ૨૫-૧૦-૨૦૧૪ થી તા. ૨૯-૧૦-૨૦૧૪

(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૪

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	00.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગે.)	37.1
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	19.7
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	73-37
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	1.5

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૨૯.૧૦.૧૪ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૫.૧૦.૧૪	૦	૦
	૨૬.૧૦.૧૪	૦	૦
	૨૭.૧૦.૧૪	૦	૦
	૨૮.૧૦.૧૪	૦	૦
	૨૯.૧૦.૧૪	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૫.૧૦.૧૪	૩૪	૩૩
	૨૬.૧૦.૧૪	૩૪	૩૩
	૨૭.૧૦.૧૪	૩૫	૩૪
	૨૮.૧૦.૧૪	૩૫	૩૪
	૨૯.૧૦.૧૪	૩૫	૩૪
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૫.૧૦.૧૪	૨૩	૨૪
	૨૬.૧૦.૧૪	૨૩	૨૪
	૨૭.૧૦.૧૪	૨૪	૨૪
	૨૮.૧૦.૧૪	૨૫	૨૫
	૨૯.૧૦.૧૪	૨૪	૨૫
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૫.૧૦.૧૪	મોટે ભાગે વાદળછાયુ	મોટે ભાગે વાદળછાયુ
	૨૬.૧૦.૧૪	મોટે ભાગે વાદળછાયુ	મોટે ભાગે વાદળછાયુ
	૨૭.૧૦.૧૪	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૨૮.૧૦.૧૪	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૨૯.૧૦.૧૪	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
મહત્તમ ભેજ (%)	૨૫.૧૦.૧૪	૬૩	૫૯
	૨૬.૧૦.૧૪	૭૩	૭૨
	૨૭.૧૦.૧૪	૭૭	૭૪
	૨૮.૧૦.૧૪	૭૯	૭૭
	૨૯.૧૦.૧૪	૭૭	૭૫
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૫.૧૦.૧૪	૪૭	૪૪
	૨૬.૧૦.૧૪	૫૫	૫૦
	૨૭.૧૦.૧૪	૬૪	૫૬
	૨૮.૧૦.૧૪	૬૪	૫૮
	૨૯.૧૦.૧૪	૬૯	૬૭
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૫.૧૦.૧૪	૦૧૧	૦૦૯
	૨૬.૧૦.૧૪	૦૨૧	૦૧૮
	૨૭.૧૦.૧૪	૦૧૯	૦૧૭
ડક્ષ	૨૮.૧૦.૧૪	૦૦૮	૦૦૭
	૨૯.૧૦.૧૪	૦૦૮	૦૦૬
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૫.૧૦.૧૪	૧૪૦	૧૫૦
	૨૬.૧૦.૧૪	૨૩૦	૧૬૦
	૨૭.૧૦.૧૪	૨૩૦	૧૮૦
	૨૮.૧૦.૧૪	૨૩૦	૧૮૦
	૨૯.૧૦.૧૪	૧૮૦	૧૫૦

દક્ષિણ ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ)

પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકમાં યુસીયાના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૧૦ મીલી અથવા થાઈમીથોક્ઝામ ૮ ગ્રામ અને એસીફેટ ને ૨૦ ગ્રામ ને ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો. ❖ તૈયાર થયેલ કપાસની વીણી સમયસર કરીને તેને પણ સલામત જગ્યાએ સંગ્રહવાની વ્યવસ્થા કરવી. ❖ પાકને કટોકટી અવસ્થાએ આવશ્યક પીયત આપવું.
સોયાબીન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ જો પાકમાં લશ્કરી ઈયળનો ઉપદ્રવ ખુબ જોવા મળે તો તેના નિયંત્રણ માટે સંકલીત જીવાત નિયંત્રણના પગલા લેવા. તેમજ ફેરોમેન ટ્રેપ, વર્ટીસેલીયમ લોહાટી કુગ વગેરેનો ઉપયોગ કરવો
દિવેલા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ઘોડીયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે ક્વીનાલફોસ ૨૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમા મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો
ટમેટા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ સ્પોટેડ વીલ્ટ વાયરસના નિયંત્રણ માટે પાકની રોપણી પછી ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે ૫ ગ્રામ કાર્બેન્ડાઝીમ (૫૦ % વે.પા.) ૧૦ લિટર પાણીમા ઓગાળી ને છાંટવું જેથી રોગનું પ્રમાણ ઓછું રહે છે અને ઉત્પાદન વધારે મળે છે.
મરચા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ વાતાવરણમા થતા ફેરફારના કારણે મરચામાં ભુકીછારાના નિયંત્રણ માટે ૫ મીલી ટ્રાઈડીમોર્ફ (૮૦ % ઈ.સી.) ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી છંટકાવ કરવો અને જરૂર જણાય તો ફરીથી ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે બીજા છંટકાવ કરવા.
ભીંડો	<ul style="list-style-type: none"> ❖ હુફાળુ વાતાવરણ નાકારણે ભીંડાના પાકમાં માઈટનો ઉપદ્રવ વધારે પડતો જોવા મળે છે તેના નિયંત્રણ માટે ઈથીયોન ૨૦ મીલી ને ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છટકાવ કરવો.
પશુ પાલન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો. પશુઓને માખી અને મચ્છરથી બચાવવા માટે રહેવાની જગ્યા સ્વચ્છ કરવી તથા ચેપી રોગોથી પીડાતા પશુઓને જુદા બાંધવા તેમજ બીજા અન્ય રોગોથી જેવા કે કાળીયો તાવ, લેપ્ટોસ્પાયરોસીસ અને દુધીયો તાવથી પીડાતા પશુઓને રક્ષણ મેળવવા માટે રોગ પ્રતિકારક રસીઓ સમયસર મુકાવવી

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date: 24-10-2014

(Period from 25 to 29 October-2014)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	00.0
Maximum temperature °C	37.0-37.2
Minimum temperature °C	19.0-20.6
RH % (Morning/Afternoon)	73-37
Wind speed (Kmph)	1.2-1.9
Cloud cover	0-4

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 29-10-2014

Parameters	Day-1 25-10-14	Day-2 26-10-14	Day-3 27-10-14	Day-4 28-10-14	Day-5 29-10-14
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	34	34	35	35	35
Minimum temperature °C	23	23	24	25	24
Cloud cover (Okta)	6	6	8	8	8
RH % (Morning/After noon)	63-47	73-55	77-64	79-64	77-69
Wind speed (Kmph)	011	021	019	008	008
Wind direction(Deg)	140	230	230	230	180

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Kharif Groundnut	Harvesting	<ul style="list-style-type: none"> Complete the harvesting operation in time and store the produce in safer place and after grading, cleaning send it to market.
Cotton	Boll formation	<ul style="list-style-type: none"> For the control of Sucking pest, Spray Imidacloprid 17.8 % 10 ml or Thiomethoxam 8 gram or Acephate 20 gram in 10 liters of water. To apply irrigation at critical stage. Complete the picking of cotton and send it to market.
Castor	Growth	<ul style="list-style-type: none"> For the control of semi lopper, spray quinalphos 20 ml in 10 liter of water.
Tomato	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> Due to cloudy whether incidence of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.
Chilli	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of Altarnaria blight, spray spray Tridimorf (80 % EC) 5ml dissolving in 10 liter of water.
lady finger	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of mite in lady finger, spray Ethion 20 ml/10 liter of water.
Livestock	-	<ul style="list-style-type: none"> Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes.

		<ul style="list-style-type: none">• Disease (like, Anthraces, milk fever and Brucellosis) infected animals to regular check-up and regular vaccination for the animal.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date : 29-10-2014

(Period from 25 to 29 October-2014)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 29-10-2014

Parameters	Day-1 25-10-14	Day-2 26-10-14	Day-3 27-10-14	Day-4 28-10-14	Day-5 29-10-14
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	33	33	34	34	34
Minimum temperature °C	24	24	24	25	25
Cloud cover (Okta)	6	5	8	8	8
RH % (Morning/After noon)	59-44	72-50	74-56	77-58	75-67
Wind speed (Kmph)	009	018	017	007	006
Wind direction(Deg)	150	160	180	180	150

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Kharif Groundnut	Harvesting	<ul style="list-style-type: none">Complete the harvesting operation in time and store the produce in safer place and after grading, cleaning send it to market.
Cotton	Boll formation	<ul style="list-style-type: none">For the control of Sucking pest, Spray Imidacloprid 17.8 % 10 ml or Thiomethoxam 8 gram or Acephate 20 gram in 10 liters of water.To apply irrigation at critical stage.Complete the picking of cotton and send it to market.
Castor	Growth	<ul style="list-style-type: none">For the control of semi lopper, spray quinalphos 20 ml in 10 liter of water.
Tomato	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none">Due to cloudy whether incidence of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.
Chilli	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none">For the control of Altarnaria blight, spray spray Tridimorf (80 % EC) 5ml dissolving in 10 liter of water.
lady finger	Fruiting	<ul style="list-style-type: none">For the control of mite in lady finger, spray Ethion 20 ml/10 liter of water.
Livestock	-	<ul style="list-style-type: none">Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes.Disease (like, Anthracis, milk fever and Brucellosis) infected animals to regular check-up and regular vaccination for the animal.