

**હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
તા. ૨૭-૧૨-૨૦૧૪ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૪**

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૪

પાછળા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	000.0
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	29.7
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	10.0
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	83-41
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	3.1

પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૩૧.૧૨.૧૪ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૭.૧૨.૧૪	૦	૦
	૨૮.૧૨.૧૪	૦	૦
	૨૯.૧૨.૧૪	૦	૦
	૩૦.૧૨.૧૪	૦	૦
	૩૧.૧૨.૧૪	૦	૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૭.૧૨.૧૪	૨૮	૨૮
	૨૮.૧૨.૧૪	૨૮	૨૮
	૨૯.૧૨.૧૪	૨૭	૨૭
	૩૦.૧૨.૧૪	૨૬	૨૭
	૩૧.૧૨.૧૪	૨૬	૨૬
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૭.૧૨.૧૪	૧૪	૧૬
	૨૮.૧૨.૧૪	૧૪	૧૬
	૨૯.૧૨.૧૪	૧૪	૧૫
	૩૦.૧૨.૧૪	૧૩	૧૫
	૩૧.૧૨.૧૪	૧૩	૧૫
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૭.૧૨.૧૪	અંશતઃ વાદળછાયુ	અંશતઃ વાદળછાયુ
	૨૮.૧૨.૧૪	મોટેભાગે ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૨૯.૧૨.૧૪	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૩૦.૧૨.૧૪	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૩૧.૧૨.૧૪	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
મહત્વમાન લેજ (%)	૨૭.૧૨.૧૪	૪૬	૪૫
	૨૮.૧૨.૧૪	૪૨	૪૧
	૨૯.૧૨.૧૪	૪૩	૪૦
	૩૦.૧૨.૧૪	૪૯	૪૪
	૩૧.૧૨.૧૪	૪૩	૪૧
લઘુત્વમાન લેજ (%)	૨૭.૧૨.૧૪	૩૭	૩૩
	૨૮.૧૨.૧૪	૩૬	૩૦
	૨૯.૧૨.૧૪	૩૫	૩૦
	૩૦.૧૨.૧૪	૩૬	૩૧
	૩૧.૧૨.૧૪	૩૫	૩૦
પવનની ગતિ (ડિમી/કલાક)	૨૭.૧૨.૧૪	૦૧૦	૦૧૦
	૨૮.૧૨.૧૪	૦૧૦	૦૧૦
	૨૯.૧૨.૧૪	૦૦૮	૦૦૮
	૩૦.૧૨.૧૪	૦૦૮	૦૦૮
	૩૧.૧૨.૧૪	૦૦૬	૦૧૦
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૨૭.૧૨.૧૪	૦૩૦	૦૨૦
	૨૮.૧૨.૧૪	૦૪૦	૦૪૦
	૨૯.૧૨.૧૪	૦૩૦	૦૪૦
	૩૦.૧૨.૧૪	૦૫૦	૦૨૦
	૩૧.૧૨.૧૪	૦૫૦	૦૫૦

દક્ષિણ ખેત આબોહવાક્ય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર ફૂષિ સલાહ)

પાકનું નામ	ફૂષિ સલાહ
ઘઉ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ સમયસરની વાવણી કરેલ પાકમા પુતિ ખાતર તરીકે વાવેતર બાદ ૨૧ દિવસે ૧૩૦ કિલો/હેક મુજબ યુરિયા આપવુ.
ચણા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ લીલી ઈયળ તથા લશકરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે એમામેક્ટીન બેંડોઓટ ૬.૫ ગ્રામ અથવા ઈંડોકાકાર્બ ૧૦ મીલી ૧૦ મીલી પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.
લસણ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાન ની ટોચના સુકારા રોગના નિયંત્રણ માટે મેંકોજેબ દવા ૨૫ ગ્રામ ને ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો. ❖ સમયસર નિદામણ કરવુ.
ધાણા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ સફેદમાખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનુ તેલ ૫૦ મીલી/ પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો જો વધારે ઉપદ્રવ જણાય તો એસીફેટ દવા ૧૫ ગ્રામ/૧૦ મીલી પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં ભુકીછારાના નિયંત્રણ માટે હેકાકોનાઝોલ ૧૫ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી લેળવીને છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં થ્રીખસના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોફ્લોસ ૨૦ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો.
જીરુ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ જીરુના પાકમાં ચરમીના રોગના નિયંત્રણ માટે મેંકોજેબ ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી દર ૧૫ દિવસે ત્રણ છંટકાવ.
કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકમાં ચુસીયાના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાકલોપ્રાઇડ ૧૦ મીલી અથવા થાઈમીથોકામ ૮ ગ્રામ અને એસીફેટ ને ૨૦ ગ્રામ ને ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો. ❖ તૈયાર થયેલ કપાસની વીણી સમયસર કરીને તેને પણ સલામત જગ્યાએ સંગ્રહવાની વ્યવસ્થા કરવી. ❖ પાકને કટોકટી અવસ્થાએ ટીપા પદ્ધતિથી અથવા એકાંતરા પાટલે પીયત આપવુ.
દિવેલા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ઘોડીયા ઈયળના નિયંત્રણ માટે ક્વીનાલફ્લોસ ૨૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમા મીશ્ર કરી છંટકાવ કરવો
ટમેટા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ સ્પોટેડ વીલ્ટ વાયરસના નિયંત્રણ માટે પાકની રોપણી પણી ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે ૫ ગ્રામ કાર્બેન્ડાઝીમ (૫૦ % વે.પા.) ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી ને છાંટવુ જેથી રોગનુ પ્રમાણ ઓછુ રહે છે અને ઉત્પાદન વધારે મળે છે.
મરચા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ વાતાવરણમા થતા ફેરફારના કારણે મરચામાં ભુકીછારાના નિયંત્રણ માટે ૫ મીલી ટ્રાઇડીમોફ (૮૦ % ઈ.સી.) ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી છંટકાવ કરવો અને જરૂર જણાય તો ફરીથી ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે બીજા છંટકાવ કરવા.

ભીડો	<ul style="list-style-type: none"> ❖ હુણાળુ વાતાવરણ નાકારણે ભીડાના પાકમાં માઈટનો ઉપક્રમ વધારે પડતો જોવા મળે છે તેના નિયંત્રણ માટે ઈથીયોન ૨૦ મીલી ને ૧૦ લીટર પાણીમાં બેળવી છટકાવ કરવો.
પશુ પાલન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો. પશુઓને માખી અને મચ્છરથી બચાવવા માટે રહેવાની જગ્યા સ્વચ્છ કરવી તથા ચેપી રોગોથી પીડાતા પશુઓને જુદા બાંધવા તેમજ બીજા અન્ય રોગોથી જેવા કે કાળીયો તાવ, લેપટોસ્પાયરોસીસ અને દુધીયો તાવથી પીડાતા પશુઓને રક્ષણ મેળવવા માટે રોગ પ્રતિકારક રસીઓ સમયસર મુકાવવી ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાઠવી. ❖ બપોરના સમયે મરધાનુ પરીવહન ટાળવુ અને મરધા ઘરની પચિમ દિવાલે પડદા લગાવવા.

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 26-12-2014

(Period from 27 to 31 December -2014)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	28.5-30.4
Minimum temperature °C	9.0-10.4
RH % (Morning/Afternoon)	83-41
Wind speed (Kmph)	2.1-5.2
Cloud cover	0

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 31-12-2014

Parameters	Day-1 27-12-14	Day-2 28-12-14	Day-3 29-12-14	Day-4 30-12-14	Day-5 31-12-14
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	28	28	27	26	26
Minimum temperature °C	14	14	14	13	13
Cloud cover (Okta)	3	1	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	46-37	42-36	43-35	49-36	43-35
Wind speed (Kmph)	010	010	008	008	006
Wind direction(Deg)	030	040	030	050	050

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Wheat	Growth	<ul style="list-style-type: none"> For timely sown crop apply 130 kg/ha Urea as top dressing.
Chickpea	Flowering	<ul style="list-style-type: none"> For the control of pod borer spray Amamectin benzoate 6.5 gm or Indoxacarb 10 ml/10 liter of water.
Coriander	Growth	<ul style="list-style-type: none"> For the control of white fly spray neem oil @ 50 ml/10 liter of water of infestation is more, spray acephate @ 15 gm/ 10 liter of water. For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol 15 ml in 10 liter of water. For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 liter of water.
Cumin	Growth	<ul style="list-style-type: none"> For the control of blight, spray three spray of Mencozeb 27 gm/10 liter of water at 15 days interval.
Cotton	Boll formation	<ul style="list-style-type: none"> For the control of Sucking pest, Spray Imidacloprid 17.8 % 10 ml or Thiometoxam 8 gram or Acephate 20 gram in 10 liters of water. To apply irrigation at critical stages. Complete the picking of cotton and send it to market.
Garlic	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> Timely weeding operation should be carried out.

		<ul style="list-style-type: none"> For the control of white tip, spray Mencozeb 25 ml/10 liter of water.
Castor	Growth	<ul style="list-style-type: none"> For the control of semi lopper, spray quinalphos 20 ml in 10 liter of water.
Tomato	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.
Chilli	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of Altarnaria blight, spray spray Tridimorf (80 % EC) 5ml disolving in 10 liter of water.
lady finger	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of mite in lady finger, spray Ethion 20 ml/10 liter of water.
Livestock	-	<ul style="list-style-type: none"> Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. Disease (like, Anthraces, milk fever and Brucellosis) infected animals to regular check-up and regular vaccination for the animal. Avoid transportation of poultry birds during noon & keep curtwn in west direction. Deltaamathrin or Amitaz @ 2 ml/1 lietr of water for the control of tick.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date : 26-12-2014

(Period from 27 to 31 December -2014)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 08:30 hrs of 31-12-2014

Parameters	Day-1 27-12-14	Day-2 28-12-14	Day-3 29-12-14	Day-4 30-12-14	Day-5 31-12-14
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	28	28	27	27	26
Minimum temperature °C	16	16	15	15	15
Cloud cover (Okta)	3	0	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	45-33	43-30	40-30	44-31	41-30
Wind speed (Kmph)	010	010	008	008	010
Wind direction(Deg)	020	040	040	020	050

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Wheat	Growth	<ul style="list-style-type: none"> For timely sown crop apply 130 kg/ha Urea as top dressing.
Chickpea	Flowering	<ul style="list-style-type: none"> For the control of pod borer spray Amamectin benzoate 6.5 gm or Indoxacarb 10 ml/10 liter of water.
Coriander	Growth	<ul style="list-style-type: none"> For the control of white fly spray neem oil @ 50 ml/10 liter of water of infestation is more, spray acephate @ 15 gm/10 liter of water. For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol 15 ml in 10 liter of water. For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 liter of water.
Cumin	Growth	<ul style="list-style-type: none"> For the control of blight, spray three spray of Mencozeb 27 gm/10 liter of water at 15 days interval.
Cotton	Boll formation	<ul style="list-style-type: none"> For the control of Sucking pest, Spray Imidacloprid 17.8 % 10 ml or Thiometoxam 8 gram or Acephate 20 gram in 10 liters of water. To apply irrigation at critical stages. Complete the picking of cotton and send it to market.
Garlic	Vegetative	<ul style="list-style-type: none"> Timely weeding operation should be carried out. For the control of white tip, spray Mencozeb 25 ml/10 liter of water.
Castor	Growth	<ul style="list-style-type: none"> For the control of semi lopper, spray quinalphos 20 ml in 10 liter of water.
Tomato	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.
Chilli	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of Altarnaria blight, spray Tridimorf (80 % EC) 5ml disolving in 10 liter of water.

lady finger	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of mite in lady finger, spray Ethion 20 ml/10 liter of water.
Livestock	-	<ul style="list-style-type: none"> Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. Disease (like, Anthraces, milk fever and Brucellosis) infected animals to regular check-up and regular vaccination for the animal. Avoid transportation of poultry birds during noon & keep curtn in west direction. Deltaamathrin or Amitaz @ 2 ml/1 lietr of water for the control of tick.