



**ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા**  
**કૃષિ હવામાન સેલ**  
**કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ**  
**જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી**  
**જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧**  
**ઈમેઇલ:- [amfujind@yahoo.com](mailto:amfujind@yahoo.com)**      ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૬



**હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં જુનાગઢ જીલ્લા માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન**  
**(કૃષિ હવામાન સેલ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપદ્ધ)**

વાર:- મંગળવાર

તારીખ:- ૨૮/૧૧/૨૦૨૩

**હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૫૬ (૨૦૨૩-૨૪)**

પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૨૩ થી ૨૭ નવેમ્બર, ૨૦૨૩)					હવામાન પરિબળો	હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૨૮ નવેમ્બર થી ૦૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩) માન્ય ૦૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩ સવારના ૮:૩૦ વાગ્યાં સુધી				
૨૩/૧૧	૨૪/૧૧	૨૫/૧૧	૨૬/૧૧	૨૭/૧૧	તારીખ	૨૮/૧૧	૩૦/૧૧	૦૧/૧૨	૦૨/૧૨	૦૩/૧૨
૦	૦	૦	૧૪.૬	૪.૪	વરસાદ(મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦
૩૩.૫	૩૩.૬	૩૫.૬	૨૬.૩	૨૬.૫	મહત્વમાન (૦સે.ગ્રે)	૨૮	૩૦	૩૨	૩૨	૩૧
૧૬.૪	૧૪.૬	૨૪.૫	૨૧.૫	૧૬.૧	લઘુત્વમાન (૦સે.ગ્રે)	૧૮	૨૦	૨૨	૨૨	૨૧
ચોખ્યું	ચોખ્યું	મોટેભાગે ચોખ્યું	મોટેભાગે વાદળાયું	અંશત વાદળાયું	વાદળની સ્થિતિ	ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	અંશત વાદળાયું
૭૪	૮૨	૫૯	૬૬	૬૪	સવારના ભેજના ટકા	૫૨	૫૬	૫૦	૫૧	૫૨
૨૬	૩૩	૩૩	૭૧	૬૬	બપોરબાદ ના ભેજના ટકા	૩૬	૩૪	૩૧	૩૨	૩૭
૧.૨	૩.૨	૩.૪	૨.૭	૭.૪	પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૨.૦	૧૩.૦	૧૩.૦	૧૨.૦	૧૪.૦
૩૨૦	૧૮૦	૧૪૦	૧૪૦	૩૬૦	પવનની દિશા	૨૨	૨૫	૨૨	૫૮	૭૧

### સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનુસાર અત્રેનાં ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના જુનાગઢ જીલ્લામાં આગામી તારીખ ૨૮/૧૧/૨૦૨૩ થી ૦૩/૧૨/૨૦૨૩ દરમ્યાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં મુખ્યત્વે ચોખ્યું અને ૩ ડિસેમ્બરનાં અંશત વાદળાયું રહેશે, જુલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નહિવત છે. પવનની ઝડપ ૧૨ થી ૧૪ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન ૨૮ થી ૩૨ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્વમાન ૧૮ થી ૨૨ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ જુનાગઢ જીલ્લામાં ૨૭ સપ્ટેમ્બર થી ૨૫ ઓક્ટોમ્બર, ૨૦૨૩ નાં સમયગાળા દરમિયાન મધ્યમ લેજની સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.

સાપ્તાહિક હવામાન આગાહીની સૂચી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનાં વિસ્તારોમાં તા. ૦૩/૧૨/૨૦૨૩ થી તા. ૦૬/૧૨/૨૦૨૩ દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય થી નિયે અને મહત્વમ & લધુતમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતાઓ છે.


**મેધદૂત એપ્લીકેશન:-** કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારી મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો મેધદૂત એપ્લીકેશન કે જે ખેડૂતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.

મેધદૂત એપ્લીકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

એન્ડ્રોઈડ(મોબાઈલ) ઉપયોગકર્તા: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

આઇ.ઓ.એસ. ઉપયોગકર્તા: - <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ પાકમાં દવા છાંટવાનું અને ખાતર આપવાનું કામ આગાહીનાં સમયગાળા દરમિયાન કરવું.
- ❖ શિયાળું પાકનું વાવેતર કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવું.
- ❖ સમયસર વાવેલ શિયાળું પાકમાં આંતરખેડ અને નીંદણાની કામગીરી કરવી અને સમયાંતરે પાકને પીયત આપવું.



પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિ સલાહ
ચણા	વૃદ્ધિ	લીલી ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ જીવાતની સમયસર મોજણી કરવી.</li> <li>❖ લીલી ઈયળ માટે ૪૦-૫૦ બડ પર્ચીસ મુકવા.</li> <li>❖ ફેરોમોન ટ્રેપ ૪૦/હે. મુજબ અને પ્રકાશ પિંજર ૧/હે. મુજબ ગોઠવવા.</li> <li>❖ કડવી મેહંદીનો ભૂકો અથવા મામેજવાનો ભૂકો અથવા રતનજ્યોતનો ભૂકો અથવા લીમડાના પાનનો ૫ ટકા અંક જીવાતની શરૂઆત થયે દર ૧૫ દિવસે છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
ઘઉં	વૃદ્ધિ	ઉધાર્દ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ઘઉના ઉભા પાકમાં ઉધઈનો ઉપક્રમ શરૂ થતો જણાય તો તુરત જ એક હેકટર પાકના વિસ્તાર માટે ફીપ્રોનિલ ૫ એસસી ૧.૬ લિટર અથવા કલોરપાયરીફેસ ૨૦ ઈસી ૧.૫ લિટર ૧૦૦ કિ.ગ્રા. રેતી સાથે બરાબર લેળવી માવજત આપેલ રેતી ઘઉના ઉભા પાકમાં પૂરવી અને ત્યારબાદ પાકને હળવું પિયત આપવું.</li> </ul>
ધાણા	વૃદ્ધિ	મોલો	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વધારે પડતું પાણી આપવું નહિં.</li> <li>❖ મોલોનાં પરિક્ષણ માટે પીળા ચીકણા પીંજર પ્રતિ હેક્ટેરે ૧૦ પ્રમાણે ગોઠવવા.</li> <li>❖ દાળિયાબ સીરફીડ માખીના કીડા અને કાયસોપર્લા નામના પરબક્ષી કીટકો કુદરતી રીતે મોલોનું લક્ષણ કરતા હોય છે. આથી આવા ઉપયોગી પરબક્ષીઓની વસ્તી વધારે હોય ત્યારે ઝેરી દવાઓના છંટકાવ ટાળવા જોઇએ.</li> </ul>
લસણ	વૃદ્ધિ	ચુસીયા જીવાત	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ આ જીવાતના અસરકારક નિયંત્રણ માટે બ્યુવેરીયા બાજીયાના ૧.૧૫ વે.પા. નો પ્રથમ છંટકાવ જીવાત દેખાય ત્યારે ૦.૦૦૩૫% (૩૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં)બાબીજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણી) અને ત્રીજો ૦.૦૦૯ ટકા (૮૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણી) ૧૦ દિવસના અંતરે કરવા.</li> <li>❖ આ જીવાતના રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે ડાયમીથીઓટ ૩૦ ઇ.સી. ૧૦ મિ.લી. અથવા કવીનાલફોસ ૨૫ ઇ.સી. ૨૦ મિ.લી. દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી દવાની અસરકારકતા વધારવા તેમાં સ્ટીકર ઉમેરી દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
કપાસ	ફૂલ / ઝીંડવા / વીણું	ગુલાબી ઈયળ, પાનનાં ટપકા	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકમાં દવા છાંટવાનું અને ખાતર આપવનું કામ આ સમયગાળામાં કરવું.</li> <li>❖ પાનનાં ટપકાનાં રોગનાં નિયંત્રણ માટે પ્રોપીકોનાઓલ ૨૫% ઇ.સી. ૧૦ મી.લી./૧૦ લી. અથવા પાઈરેકલોસ્ટ્રોબીન ૨૦% ડબલ્યુ. જી. ૧૦ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા એઝોકાઝીસ્ટ્રોબીન ૧૮.૨% + ડાયફેનકોનાઓલ ૧૧.૪% ડબલ્યુ.ડબલ્યુ. એસ. સી. ૧૦ મી.લી./૧૦ લી. અથવા પ્રોપીનેબ ૭૦% વે.પા. ૨૫ ગ્રામ/૧૦ લી. પાણીમાં મુજબ છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ કપાસમાં ગુલાબી ઈયળના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા ટ્રાઇઝોફેસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો અથવા ૧૦૦ ગ્રામ બીવેરીયા પાવડર અને ૨૦ મીલી પ્રોફેનોફોસ ને ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ખેતરમાં ફેરોમેન ટ્રેપગોઠવી નર કુદાઓનો નાશ કરવો.</li> <li>❖ કપાસ જેમ જેમ પાકતો જાય તેમ તેમ વીણી કરવી અને વીણી સવારના સમયે કરવી.</li> <li>❖ કપાસના પાકને સમયાંતરે પીયત આપવુ.</li> </ul>
તુવેર	વૃદ્ધિ / ફૂલ	લીલી ઈચ્છા, ચુસીયા જીવાત, વ્યંધત્વ વાયરસ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ઈંડાનો અને નાની ઈચ્છાને એકત્રિત કરી નાશ કરવો.</li> <li>❖ પીળા ચીકણા પીજરનો % ૪-૫ ટ્રેપ/એકર મુજબ ઉપયોગ કરવો.</li> <li>❖ પ્રકાશ પીજરનો % ૧/એકર મુજબ ઉપયોગ કરવો.</li> <li>❖ પુષ્ટ જીવાતોની મોજણી માટે ૪-૫ ફેરોમેન ટ્રેપ/એકર મુકવા જોઈએ (લ્યુર દર ૨ થી ૩ અઠવાડિયે બદલવી).</li> <li>❖ તુવેરમાં વ્યંધત્વ વાયરસ અટકાવવા માટે પ્રોપરગાઇટ ૫૭ ઈસી અથવા સ્પાયરોમેસીફેન ૨૨.૬ એસસી ૧૦ મિલી/૧૦ લી. નો છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ શીંગ કોરી ખાનાર અને ચુસીયા જીવાત માટે લીમડાની લીંબોડીના મીંજનો ભૂકો ૫% અથવા બીઠી કસ્ટકી ૧ કિગ્રા/હે. ડબલ્યુ.પી.% ૪૦૦-૫૦૦ ગ્રામ/એકર ૨૦૦-૪૦૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવુ.</li> </ul>
એરંડા	વૃદ્ધિ / ફૂલ	આજ અને પાનનાં ટપકા, તડતડીયા અને શ્રીપ્સ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પુષ્ટ જીવાતની મોજણી માટે ૪-૫ ફેરોમેન ટ્રેપ/એકર મુજબ ફેરોમેન ટ્રેપ ગોઠવવા (લ્યુર દર ૨ થી ૩ અઠવાડિયે બદલવી).</li> <li>❖ એરંડામાં આજ અને પાનનાં ટપકાનાં રોગ માટે મેન્કોઝેબ ૭૫% વે.પા. ૨૬ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા કોપર ઓક્સિક્લોરાઇડ ૫૦% વે.પા. ૪૦ ગ્રામ/૧૦ લી. મુજબ છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ તડતડીયા અને શ્રીપ્સ માટે એરંડામાં ડાયમીથોએટ ૩૦ છ.સી. (૧૦ મિલી/૧૦ લીટર) મુજબ છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવુ.</li> </ul>
શાકભાજુ	વૃદ્ધિ / ફૂલ / ફળ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકમાં દવા છાંટવાનું અને ખાતર આપવનું કામ આ સમયગાળામાં કરવું.</li> <li>❖ પાકમાં હાથથી નિંદામણ અને આંતરફેડની કામગીરી કરવી.</li> <li>❖ શાકભાજુ પાકોને સમયસર પીયત આપવુ.</li> <li>❖ શાકભાજુના પાકોને નીદામણ મુકત કરવુ અને નિયમીત પિયત આપવુ. શાકભાજુ ને સમયસર ઉતારી ગેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા.</li> </ul>
પશુપાલન	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો &amp; પીવા માટે ચોખ્યું ઠંડુ પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્મા રાખવા.</li> <li>❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઇલ છાટવુ.</li> </ul>

- ❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાં ખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ.
- ❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો.
- ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.
- ❖ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઇડ અથલા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.

  <b>આંગાધીક અમૃત મહોત્સવ</b>	<b>ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા</b> <b>કૃષિ હવામાન સેલ</b> <b>કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ</b> <b>જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી</b> <b>જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧</b> <b>ઈમેઇલ:-amfujnd@yahoo.com</b> <b>ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૫૭૦૧૩૮</b>	 
---	--	--

હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં **પોરબંદર જુલ્લા** માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
**(કૃષિ હવામાન સેલ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપદ્ધ)**

વાર:- મંગાળવાર

તારીખ: ૨૮/૧૧/૨૦૨૩

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: **૦૫૬ (૨૦૨૩-૨૪)**

પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન (તારીખ:- ૨૩ થી ૨૭ નવેમ્બર, ૨૦૨૩)					હવામાન પરિબળો		હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે (તારીખ:- ૨૮ નવેમ્બર થી ૦૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩)				
૨૩/૧૧	૨૪/૧૧	૨૫/૧૧	૨૬/૧૧	૨૭/૧૧	તારીખ	૨૮/૧૧	૩૦/૧૧	૦૧/૧૨	૦૨/૧૨	૦૩/૧૨	
૦	૦	૦	૦	૦	વરસાદ(મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦	
૩૪.૨	૩૨.૬	૩૩.૪	૩૫.૦	૩૦.૮	મહત્વમાન તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૨૬	૩૦	૩૧	૩૨	૩૩	
૧૮.૨	૧૭.૬	૨૨.૪	૨૩.૪	૧૮.૨	લઘુત્વમાન તાપમાન (°સે.ગ્રે)	૧૭	૧૮	૧૯	૨૦	૨૦	
ચોખ્યું	ચોખ્યું	મોટેલાગે ચોખ્યું	મોટેલાગે ચોખ્યું	ચોખ્યું	વાદળની સ્થિતિ	અંશત વાદળચાયું	અંશત વાદળચાયું	મોટેલાગે ચોખ્યું	મોટેલાગે ચોખ્યું	મોટેલાગે ચોખ્યું	
૬૦	૬૩	૫૩	૭૭	૬૧	સવારના ભેજના ટકા	૫૬	૫૭	૫૧	૫૬	૫૩	
૪૮	૪૫	૨૮	૬૧	૭૦	બપોરબાદ ના ભેજના ટકા	૪૦	૪૦	૩૬	૩૭	૪૨	
-	-	૭.૪	૩.૭	-	પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૮.૦	૧૮.૦	૨૦.૦	૨૧.૦	૧૯.૦	
-	-	૭૦	૨૩૦	-	પવનની દિશા	૩૨	૨૨	૨૨	૨૫	૫૬	

## સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર પેટ આબોહવાકીય વિસ્તારના પોરબંદર જુલ્લામાં આગામી તારીખ ૨૬/૧૧/૨૦૨૩ થી ૦૩/૧૨/૨૦૨૩ દરમ્યાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી પાંચ દિવસોમાં મુખ્યત્વે મોટેભાગે ચોખ્યું થી અંશત વાદળથાયું રહેશે, જુલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નહિવત છે. પવનની ઝડપ ૧૮ થી ૨૧ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતા રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન તાપમાન ૨૮ થી ૩૩ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લધુતમ તાપમાન ૧૭ થી ૨૦ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

+ માન્ય વરસાદની સૂરી મુજબ પોરબંદર જુલ્લામાં ૨૭ સપ્ટેમ્બર થી ૨૫ ઓક્ટોમ્બર, ૨૦૨૩ નાં સમયગાળા દરમિયાન મધ્યમ સૂકી સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.

+ સાપ્તાહિક હવામાન આગાહીની સૂરી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કર્ચનાં વિસ્તારોમાં તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૩ થી તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૩ દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય થી નોચે અને મહત્વમ & લધુતમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની શક્યતાઓ છે.


+ મેધદૂત એપ્લીકેશન:-કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારી મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો મેધદૂત એપ્લીકેશન કે જે મેફૂતોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.

મેધદૂત એપ્લીકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

એન્ડ્રોઇડ(મોબાઇલ)ઉપયોગકર્તા: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

આઈ.ઓ.એસ.ઉપયોગકર્તા: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ પાકમાં દવા છાંટવાનું અને ખાતર આપવનું કામ આગાહીનાં સમયગાળા દરમિયાન કરવું.
- ❖ શિયાળું પાકનું વાવેતર કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવું.
- ❖ સમયસર વાવેલ શિયાળ પાકમાં આંતરખેડ અને નીંદણની કામગીરી કરવી અને સમયાંતરે પાકને પીયત આપવું.



પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/જીત	કૃષિ સલાહ
ચણા	વૃદ્ધિ	લીલી ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>જીવાતની સમયસર મોજણી કરવી.</li> <li>લીલી ઈયળ માટે ૪૦-૫૦ બર્ડ પર્ચીસ મુકવા.</li> <li>ફેરોમોન ટ્રેપ ૪૦/હે. મુજબ અને પ્રકાશ પિંજર ૧/હે. મુજબ ગોઠવવા.</li> <li>કડવી મેહંદીનો ભૂકો અથવા મામેજવાનો ભૂકો અથવા રતનજીયોતનો ભૂકો અથવા લીમડાના પાનનો ૫ ટકા એક જીવાતની શરૂઆત થયે દર ૧૫ દિવસે છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
ઘઉં	વૃદ્ધિ	ઉધઈ	<ul style="list-style-type: none"> <li>પાકને સમયાંતરે પીયત આપવુ.</li> <li>ઘઉના ઊભા પાકમાં ઉધઈનો ઉપદ્રવ શરૂ થતો જણાય તો તુરત જ એક હેકટર પાકના વિસ્તાર માટે ફીપ્રોનિલ ૫ એસસી ૧.૬ લિટર અથવા કલોરપાયરીઝોસ ૨૦ ઈસી ૧.૫ લિટર ૧૦૦ કિ.ગ્રા. રેતી સાથે બરાબર ભેળવી માવજત આપેલ રેતી ઘઉના ઊભા પાકમાં પૂરવી અને ત્યારબાદ પાકને હળવું પિયત આપવું.</li> </ul>
ધાણા	વૃદ્ધિ	મોલો	<ul style="list-style-type: none"> <li>વધારે પડતું પાણી આપવું નહિ.</li> <li>મોલોનાં પરિક્ષણ માટે પીળા ચીકણા પીંજર પ્રતિ હેકટેરે ૧૦ પ્રમાણે ગોઠવવા.</li> <li>દાળિયા, સીરફીડ માખીના કીડા અને કાયસોપલ્લી નામના પરબક્ષી કીટકો કુદરતી રીતે મોલોનું ભક્ષણ કરતા હોય છે. આથી આવા ઉપયોગી પરબક્ષીઓની વસ્તી વધારે હોય ત્યારે ઝેરી દવાઓના છંટકાવ ટાળવા જોઇએ.</li> </ul>
લસણ	વૃદ્ધિ	ચુસીયા જીવાત	<ul style="list-style-type: none"> <li>આ જીવાતના અસરકારક નિયંત્રણ માટે બ્યુવેરીયા બાળીયાના ૧.૧૫ વે.પા. નો પ્રથમ છંટકાવ જીવાત દેખાય ત્યારે ૦.૦૦૩૫% (૩૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં) બિજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણી) અને ત્રીજો ૦.૦૦૮ ટકા (૮૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણી) ૧૦ દિવસના અંતરે કરવા.</li> <li>આ જીવાતના રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૩૦ ઇ.સી. ૧૦ મિ.લી. અથવા કવીનાલફોસ ૨૫ ઇ.સી. ૨૦ મિ.લી. દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી દવાની અસરકારકતા વધારવા તેમાં સ્ટીકર ઉમેરી દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
કપાસ	કૂલ / ઝીનડવા / વીણી	ગુલાબી ઈયળ, પાનનાં ટપકા	<ul style="list-style-type: none"> <li>પાકમાં દવા છાંટવાનું અને ખાતર આપવનું કામ આ સમયગાળામાં કરવુ.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાનનાં ટપકાનાં રોગનાં નિયંત્રણ માટે પ્રોપીકોનાડોલ ૨૫% ઈ.સી. ૧૦ મી.લી./૧૦ લી. અથવા પાઈરેકલોસ્ટ્રોબીન ૨૦% ડબલ્યુ. જી. ૧૦ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા એગ્રોકાર્બોસ્ટ્રોબીન ૧૮.૨% + ડાયફેનકોનાડોલ ૧૧.૪% ડબલ્યુ./ડબલ્યુ. એસ. સી. ૧૦ મી.લી./૧૦ લી. અથવા પ્રોપીનેબ ૭૦% વે.પા. ૨૫ ગ્રામ/૧૦ લી. પાણીમાં મુજબ છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ કપાસમાં ગુલાબી ઈયળના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા ડ્રાઇઝોફોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો અથવા ૧૦૦ ગ્રામ બીવેરીયા પાવડર અને ૨૦ મીલી પ્રોફેનોફોસ ને ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ ખેતરમાં ફેરોમેન ટ્રેપગોઠવી નર કુદાઓનો નાશ કરવો.</li> <li>❖ કપાસ જેમ જેમ પાકતો જાય તેમ તેમ વીણી કરવી અને વીણી સવારના સમયે કરવી.</li> <li>❖ કપાસના પાકને સમયાંતરે પીયત આપવુ.</li> </ul>
તુવેર	વૃદ્ધિ / ફૂલ	લીલી ઈયળ, ચુસીયા જીવાત, વ્યંધત્વ વાયરસ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ઈંડાનો અને નાની ઈયળોને એકત્રિત કરી નાશ કરવો.</li> <li>❖ પીળા ચીકણા પીંજરનો % ૪-૫ ટ્રેપ/એકર મુજબ ઉપયોગ કરવો.</li> <li>❖ પ્રકાશ પીંજરનો % ૧/એકર મુજબ ઉપયોગ કરવો.</li> <li>❖ પુખ્ત જીવાતોની મોજણી માટે ૪-૫ ફેરોમોન ટ્રેપ/એકર મુકવા જોઈએ (લ્યુર દર ૨ થી ૩ અઠવાડિયે બદલવી).</li> <li>❖ તુવેરમાં વ્યંધત્વ વાયરસ અટકાવવા માટે પ્રોપરગાઇટ ૫૭ ઈસી અથવા સ્પાયરોમેસીફેન ૨૨.૬ એસસી ૧૦ મિલી/૧૦ લી. નો છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ શીંગ કોરી ખાનાર અને ચુસીયા જીવાત માટે લીમડાની લીંબોડીના મીંજનો ભૂકો ૫% અથવા બીટી કસ્ટ્ર્કી ૧ કિગ્રા/હે. ડબલ્યુ.પી.% ૪૦૦-૫૦૦ ગ્રામ/એકર ૨૦૦-૪૦૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવુ.</li> </ul>
એરંડા	વૃદ્ધિ / ફૂલ	આળ અને પાનનાં ટપકા, તડતડીયા અને શીંગ્સ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પુખ્ત જીવાતોની મોજણી માટે ૪-૫ ફેરોમોન ટ્રેપ/એકર મુજબ ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવવા (લ્યુર દર ૨ થી ૩ અઠવાડિયે બદલવી).</li> <li>❖ એરંડામાં આળ અને પાનનાં ટપકાનાં રોગ માટે મેન્કોઝેબ ૭૫% વે.પા. ૨૬ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા કોપર ઓક્સિકલોરાઇટ ૫૦% વે.પા. ૪૦ ગ્રામ/૧૦ લી. મુજબ છંટકાવ કરવો.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ તડતડીયા અને શ્રીપસ માટે એરેડામાં ડાયમીથોએટ 30 ઇ.સી. (૧૦ મિલી/૧૦ લીટર) મુજબ છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવુ.</li> </ul>
શાકભાજુ	વૃદ્ધી / કુલ / ફળ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકમાં દવા છાંટવાનુ અને ખાતર આપવનું કામ આ સમયગાળામાં કરવું.</li> <li>❖ પાકમાં હાથથી નિંદામણ અને આંતરખેડની કામગીરી કરવી.</li> <li>❖ શાકભાજુ પાકોને સમયસર પીયત આપવુ.</li> <li>❖ શાકભાજુના પાકોને નીદામણ મુક્ત કરવુ અને નિયમીત પિયત આપવુ. શાકભાજુ ને સમયસર ઉતારી ગ્રેડિંગ કરી બજારમાં મુકવા.</li> </ul>
પશુપાલન		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો &amp; પીવા માટે ચોખ્યું પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ ચોખ્યા રાખવા.</li> <li>❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઈલ છાટવુ.</li> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાંખનિજ્યુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ.</li> <li>❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો.</li> <li>❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.</li> <li>❖ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીક ઓક્સાઇડ અથલા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.</li> </ul>

 <b>75</b> આજાદીની અમૃત મહોત્સવ	<b>ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા</b> <b>કૃષિ હવામાન સેલ</b> <b>કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ</b> <b>જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી</b> <b>જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧</b> <b>E-mail:- <a href="mailto:amfujind@yahoo.com">amfujind@yahoo.com</a></b> <b>ફોન નં. ૦૨૮૫-૨૬૭૦૧૩૬</b>	 <b>G20</b> ભારત ૨૦૨૩ INDIA
---	---	--

હવામાન આગાહી આધારીત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર પેત આબોહવાકીય વિસ્તારનાં <b>ગીર સોમનાથ જીલ્લા</b> માટે કૃષિ સલાહ બુલેટીન (કૃષિ હવામાન સેલ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત હવામાન વિભાગ દ્વારા સંપદ્ધ)
---

<b>વાર:- મંગળવાર</b>	<b>તારીખ:- ૨૮/૧૧/૨૦૨૩</b>	
<b>હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન: ૦૫૮ (૨૦૨૩-૨૪)</b>		
<b>પાછલા પાંચ દિવસનું હવામાન</b>	<b>હવામાન પરિબળો</b>	<b>હવામાન આગાહી આગામી પાંચ દિવસ માટે</b>


(તારીખ:- ૨૩ થી ૨૭ નવેમ્બર, ૨૦૨૩)						(તારીખ:- ૨૮ નવેમ્બર થી ૦૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩)				
						માન્ય ૦૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩. સવારના ૮:૩૦ વગ્યાં સુધી				
૨૩/૧૧	૨૪/૧૧	૨૫/૧૧	૨૬/૧૧	૨૭/૧૧	તારીખ	૨૮/૧૧	૩૦/૧૧	૦૧/૧૨	૦૨/૧૨	૦૩/૧૨
૦	૦	૦	૦	૧.૭	વરસાદ(મિમી)	૦	૦	૦	૦	૦
૩૩.૬	૩૩.૦	૩૪.૬	૩૪.૪	૨૬.૧	મહત્વમાન (૦૩.૧૨)	૩૦	૩૦	૩૧	૩૨	૩૩
૨૧.૪	૨૦.૪	૨૨.૬	૨૦.૮	૧૬.૬	લઘુત્વમાન (૦૩.૧૨)	૧૬	૨૦	૨૧	૨૨	૨૩
ચોખ્યું	ચોખ્યું	ચોખ્યું	મોટેલાગે વાદળછાયું	વાદળની સ્થિતિ	અંશત વાદળછાયું	અંશત વાદળછાયું	મોટેલાગે ચોખ્યું	મોટેલાગે ચોખ્યું	મોટેલાગે ચોખ્યું	મોટેલાગે ચોખ્યું
૫૫	૫૭	૫૮	૬૮	૬૫	સવારના ભેજના ટકા	૫૭	૫૭	૫૮	૭૩	૫૬
૫૭	૫૧	૫૪	૭૪	૮૪	બપોરબાદ ના ભેજના ટકા	૪૨	૩૮	૩૭	૪૧	૪૪
-	૩.૭	૫.૬	-	૫.૬	પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૦.૦	૧૨.૦	૧૨.૦	૧૨.૦	૧૬.૦
-	૨૦	૫૦	-	૨૦	પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૨૨	૨૬	૨૨	૫૦	૬૦

## સામાન્ય સલાહ

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વિભાગ તરફથી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસુમ સેવા ચોજના, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના ગીર સોમનાથ જીલ્લામાં આગામી તારીખ ૨૮/૧૧/૨૦૨૩ થી ૦૩/૧૨/૨૦૨૩ દરમયાન આકાશ મુખ્યત્વે આગામી દિવસોમાં મુખ્યત્વે મોટેલાગે ચોખ્યું થી અંશત વાદળછાયું રહેશે, જીલ્લામાં આગામી પાંચ દિવસો દરમિયાન વરસાદની શક્યતાઓ નહિવત છે. પવનની ઝડપ ૧૦ થી ૧૬ કિમી/કલાક રહેવાની શક્યતાઓ રહેશે. આ સમયગાળામાં મહત્વમાન ૩૦ થી ૩૩ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેશે તેમજ લઘુત્વમાન ૧૮ થી ૨૩ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ રહેવાની સંભાવના છે.

- + માન્ય વરસાદની સૂચી મુજબ ગીર સોમનાથ જીલ્લામાં ૨૭ સપ્ટેમ્બર થી ૨૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૩ નાં સમયગાળા દરમિયાન મધ્યમ ભેજની સ્થિતિ જોવા મળેલ છે.
  - + સાપ્તાહિક હવામાન આગાહીની સૂચી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનાં વિસ્તારોમાં તા. ૦૩/૧૨/૨૦૨૩ થી તા. ૦૮/૧૨/૨૦૨૩ દરમિયાન વરસાદ સામાન્ય થી નાચે અને મહત્વમાન લઘુત્વમાન પવનની શક્યતાઓ છે.
  - + મેધદૂત એપ્લીકેશન:- કૃષિ હવામાન સલાહ સેવા અને હવામાન આગાહી અંગેની જાણકારી મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો મેધદૂત એપ્લીકેશન કે જે એટોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં સ્થાન, પાક અને પશુધન વિશે હવામાન આધારિત કૃષિ સલાહ પ્રદાન કરશે.
  - મેધદૂત એપ્લીકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.
- એન્ડ્રોઇડ(મોબાઈલ) ઉપયોગકર્તાની લિંક: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>
- આઈ.ઓ.એસ. ઉપયોગકર્તાની લિંક: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ પાકમાં દવા છંટવાનું અને ખાતર આપવનું કામ આગાહીનાં સમયગાળા દરમિયાન કરવું.
- ❖ શિયાળું પાકનું વાવેતર કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવું.
- ❖ સમયસર વાવેલ શિયાળું પાકમાં આંતરખેડ અને નીંદણાની કામગીરી કરવી અને સમયાંતરે પાકને પીયત આપવું.



પાકનું નામ	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/ જાત	કૃષિ સલાહ
ચણા	વૃક્ષ	લીલી ઈયળ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ જીવાતની સમયસર મોજણી કરવી.</li> <li>❖ લીલી ઈયળ માટે ૪૦-૫૦ બડ પર્ચીસ મુકવા.</li> <li>❖ ફેરોમોન ટ્રેપ ૪૦/હે. મુજબ અને પ્રકાશ પિંજર ૧/હે. મુજબ ગોઠવવા.</li> <li>❖ કડવી મેહંદીનો ભૂકો અથવા મામેજવાનો ભૂકો અથવા રતનજ્યોતનો ભૂકો અથવા લીમડાના પાનનો ૫ ટકા એક જીવાતની શરૂઆત થયે દર ૧૫ દિવસે છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ વરાપ સમયે પાકમાં આંતરખેડ કરવી અને હાથથી નિંદામણાની કામગીરી કરવી.</li> </ul>
ઘઉં	વૃક્ષ	ઉધઈ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું.</li> <li>❖ ઘઉંના ઉભા પાકમાં ઉધઈનો ઉપદ્રવ શરૂ થતો જણાય તો તુરત જ એક હેક્ટર પાકના વિસ્તાર માટે ફીપ્રોનિલ ૫ એસસી ૧.૬ લિટર અથવા કલોરપાયરીઝેસ ૨૦ ઈસી ૧.૫ લિટર ૧૦૦ કિ.ગ્રા.રેતી સાથે બરાબર લેળવી માવજત આપેલ રેતી ઘઉના ઉભા પાકમાં પૂરવી અને ત્યારબાદ પાકને હળવું પિયત આપવું.</li> </ul>

ધાણા	વૃક્ષિ	મોલો	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ વધારે પડતું પાણી આપવું નહિ.</li> <li>❖ મોલોનાં પરિક્ષણ માટે પીળા ચીકણા પીંજર પ્રતિ હેકટેરે ૧૦ પ્રમાણે ગોઠવવા.</li> <li>❖ દાળિયાબ સીરફીડ માખીના કીડા અને કાયસોપર્લી નામના પરબક્ષી કીટકો કુદરતી રીતે મોલોનું ભક્ષણ કરતા હોય છે. આથી આવા ઉપયોગી પરબક્ષીઓની વસ્તી વધારે હોય ત્યારે ઝેરી દવાઓના છંટકાવ ટાળવા જોઈએ.</li> </ul>
લસણ	વૃક્ષિ	ચુસીયા જીવાત	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ આ જીવાતના અસરકારક નિયંત્રણ માટે બ્યુવેરીયા બાળીયાના ૧.૧૫ વે.પા. નો પ્રથમ છંટકાવ જીવાત દેખાય ત્યારે ૦.૦૦૩૫% (૩૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં) બિજો ૦.૦૦૭ ટકા (૬૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) અને ત્રીજો ૦.૦૦૯ ટકા (૮૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણી) ૧૦ દિવસના અંતરે કરવા.</li> <li>❖ આ જીવાતના રાસાયણિક નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૩૦ ઇ.સી. ૧૦ મિ.લી. અથવા કવીનાલફોસ ૨૫ ઇ.સી. ૨૦ મિ.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી દવાની અસરકારકતા વધારવા તેમાં સ્ટીકર ઉમેરી દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
કપાસ	કૂલ / જીન્ડવા / વીણી	ગુલાબી ઈયળ, પાનનાં ટપકા	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકમાં દવા છાંટવાનું અને ખાતર આપવનું કામ આ સમયગાળામાં કરવું.</li> <li>❖ પાનનાં ટપકાનાં રોગનાં નિયંત્રણ માટે પ્રોપીકોનાઓલ ૨૫% ઇ.સી. ૧૦ મી.લી./૧૦ લી. અથવા પાઇરેકલોસ્ટ્રોબીન ૨૦% ડબલ્યુ. જી. ૧૦ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા એઝોકારીસ્ટ્રોબીન ૧૮.૨% + ડાયફેનકોનાઓલ ૧૧.૪% ડબલ્યુ./ડબલ્યુ. એસ. સી. ૧૦ મી.લી./૧૦ લી. અથવા પ્રોપીનેબ ૭૦% વે.પા. ૨૫ ગ્રામ/૧૦ લી. પાણીમાં મુજબ છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ કપાસમાં ગુલાબી ઈયળના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથીન અથવા ટ્રાઇઝોસ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો અથવા ૧૦૦ ગ્રામ બીવેરીયા પાવડર અને ૨૦ મીલી પ્રોફેનોફોસ ને ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ ઘેતરમાં ફેરોમેન ટ્રેપગોઠવી નર કુદાઓનો નાશ કરવો.</li> <li>❖ કપાસ જેમ જેમ પાકતો જાય તેમ તેમ વીણી કરવી અને વીણી સવારના સમયે કરવી.</li> <li>❖ કપાસના પાકને સમયાંતરે પીયત આપવું.</li> </ul>

તુવેર	વૃદ્ધિ / ફૂલ	લીલી ઈયળ, ચુસીચા જીવાત, વ્યંધત્વ વાયરસ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ઈંડાનો અને નાની ઈયળોને એકત્રિત કરી નાશ કરવો.</li> <li>❖ પીળા ચીકણા પીંજરનો % ૪-૫ ટ્રેપ/એકર મુજબ ઉપયોગ કરવો.</li> <li>❖ પ્રકાશ પીંજરનો % ૧/એકર મુજબ ઉપયોગ કરવો.</li> <li>❖ પુષ્ટ જીવાતોની મોજણી માટે ૪-૫ ફેરોમોન ટ્રેપ/એકર મુકવા જોઈએ (લ્યુર દર ૨ થી ૩ અઠવાડિયે બદલવી).</li> <li>❖ તુવેરમાં વ્યંધત્વ વાયરસ અટકાવવા માટે પ્રોપરગાઇટ ૫૭ ઈસી અથવા સ્પાયરોમેસીફેન ૨૨.૬ એસસી ૧૦ મિલી/૧૦ લી. નો છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ શીંગ ડોરી ખાનાર અને ચુસીચા જીવાત માટે લીમડાની લીંબોડીના મીંજનો ભૂકો ૫% અથવા બીટી કસ્ટકી ૧ કિગ્રા/હે. ડબલ્યુ.પી.% ૪૦૦-૫૦૦ ગ્રામ/એકર ૨૦૦-૪૦૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવુ.</li> </ul>
એરંડા	વૃદ્ધિ / ફૂલ	આજ અને પાનનાં ટપકા, તડતડીયા અને શ્રીપ્સ	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પુષ્ટ જીવાતની મોજણી માટે ૪-૫ ફેરોમોન ટ્રેપ/એકર મુજબ ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવવા (લ્યુર દર ૨ થી ૩ અઠવાડિયે બદલવી).</li> <li>❖ એરંડામાં આજ અને પાનનાં ટપકાનાં રોગ માટે મેન્કોઝેબ ૭૫% વે.પા. ૨૬ ગ્રામ/૧૦ લી. અથવા કોપર ઓક્સિક્લોરાઇઝ ૫૦% વે.પા. ૪૦ ગ્રામ/૧૦ લી. મુજબ છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ તડતડીયા અને શ્રીપ્સ માટે એરંડામાં ડાયમીથોએટ ૩૦ છ.સી. (૧૦ મિલી/૧૦ લીટર) મુજબ છંટકાવ કરવો.</li> <li>❖ પાકને સમયાંતરે પીયત આપવુ.</li> </ul>
શાકભાજુ	વૃદ્ધિ / ફૂલ / ફળ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પાકમાં દવા છાંટવાનું અને ખાતર આપવનું કામ આ સમયગાળામાં કરવું.</li> <li>❖ પાકમાં હાથથી નિંદામણાની કામગીરી કરવી.</li> <li>❖ શાકભાજુ પાકોને સમયસર પીયત આપવુ.</li> <li>❖ શાકભાજુના પાકોને નીદામણ મુકત કરવું અને નિયમીત પિયત આપવુ. શાકભાજુ ને સમયસર ઉતારી ગેડીંગ કરી બજારમાં મુકવા.</li> </ul>
પશુપાલન	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો &amp; પીવા માટે યોખ્યું પાણી આપવું અને પશુઓના રહેઠાણ યોખ્યા રાખવા.</li> <li>❖ માખી મચ્છરથી રક્ષણ માટે ફીનાઇલ છાટવુ.</li> <li>❖ પશુઓને યોગ્ય આહારમાં ખનિજયુક્ત મિશ્રણ સાથે સંગ્રહિત ચારા આપો. ચારા ને સલામત સ્થળે સંગ્રહિત કરવો જોઈએ.</li> </ul>

- ❖ ચારા માટે ચાફ કટર વાપરો.
- ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી.
- ❖ દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથલા બોરીક પાવડરથી બરાબર સાફ કરવા.

યાંત્રિક અધિકારી  
ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા  
જુ.કૃ.યુ.

**Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)**  
**Agrometeorological Cell**  
**Department of Agronomy**  
**Junagadh Agricultural University**  
**Junagadh-362001**

E-mail: [amfujnd@yahoo.com](mailto:amfujnd@yahoo.com) Phone: 0285-2670139



75  
आજાદી કા  
અમૃત મહોત્સવ

**Agromet Advisory Service Bulletin for Junagadh District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone**  
**(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)**

Day:- Tuesday

Date: 28-11-2023

**Agromet Advisory Service bulletin. No:- 069 (2023-24)**

Observed Weather during last Five days (Dated 23 <sup>rd</sup> to 27 <sup>th</sup> November, 2023)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 29 <sup>th</sup> Nov. to 03 <sup>rd</sup> December, 2023) <u>until 08:30 hrs of 03-12-2023</u>				
23/10	24/10	25/10	26/11	27/11	Date	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
0	0	0	14.6	4.4	Rainfall(mm)	0	0	0	0	0
33.5	33.6	35.6	29.3	29.5	T <sub>max</sub> (°C)	28	30	32	32	31
16.4	14.6	21.0	21.5	19.1	T <sub>min</sub> (°C)	18	20	22	22	21
0	0	2	7	4	Cloud Cover	0	0	0	0	3
74	82	59	96	94	RH-I (%)	62	56	50	61	52
29	33	33	71	66	RH-II (%)	36	34	31	32	37
1.2	3.2	3.4	2.7	7.4	Wind speed (km/hr)	12.0	13.0	13.0	12.0	14.0
320	180	140	140	360	Wind direction	22	25	22	68	71

**Agro meteorological Advisories**

<b>General Advice</b>	<b>Rain fall</b>	As per IMD Forecast, There is forecasting of <b>no rainfall</b> occurs during next five days. Sky will be remaining clear and on 3 <sup>rd</sup> Dec partly cloudy.
	<b>Temperature</b>	Maximum and minimum temperature likely to be in range of <b>28 - 32 °C</b> and <b>18 - 22 °C</b> , respectively.
	<b>RH (%)</b>	The Relative Humidity is likely to be in the range of <b>31 – 62 %</b> .
	<b>Wind Direction and Wind Speed</b>	Direction and speed of wind is to be <b>N, NE &amp; E</b> and <b>12.0 – 14.0 km/h</b> , respectively.

⊕ **Standardized Precipitation Index**: - For the period of **28<sup>th</sup> September to 25<sup>th</sup> October, 2023**. Junagadh district considered under the mildly wet condition.

⊕ **As per ERFS products, below normal rainfall and T<sub>max.</sub> & normal T<sub>min.</sub> may occur in Saurashtra & Kutch region during 03<sup>rd</sup> to 09<sup>th</sup> December, 2023.**


⊕ **MEGHDOOT Mobile Application**:- Download the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.

***Click on the following link to download the MEGHDOOT application:***

**Android users:** <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

**IOS users:** <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ **To apply fertilizer and agro- bio-chemicals to the crops during forecast period.**
- ❖ **To complete the sowing operation timely.**
- ❖ **Carry out weeding and inter culturing operations in timely sown *Rabi* crops and to apply irrigation to the crops at regular interval.**



Crop	Variety/ Pest/Insect	Stage	Agro met Advisories
<b>Chickpea</b>	<b>Helicoverpa armigera</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Regular monitoring of gram pod borer during entire crop season.</li> <li>➤ To set up the bird perches 40-50 for pod borer.</li> <li>➤ Installation of pheromone trap 40/ha and light trap 1/ha.</li> <li>➤ To spraying of kadvi mehadi leaf extract or mamejava leaf extract or Jatropha leaf extract or 5 % neem leaf extract at 15 days interval from the date of pest infestation.</li> </ul>
<b>Wheat</b>	<b>Termite</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</li> <li>➤ If a termite infestation is observed in the standing crop of wheat, immediately apply Fipronil 5 SC @ 1.6 litres or Chlorpyrifos 20 EC @ 1.5 litres with 100 kg of sand or soil per hectare. then lightly irrigate the crop.</li> </ul>
<b>Coriander</b>	<b>Aphid</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Over irrigation should be avoided.</li> <li>➤ Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor aphid population.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Avoid to spray pesticides whenever predators like ladybird beetle, syrphid fly and chrysopa are present in the field which are preying the aphids.</li> </ul>
<b>Garlic</b>	<b>Thrips</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For management of thrips, apply schedule spraying of Beauveria bassiana 1.15 WP (min 2 x 106 cfu/g), first spray at initiation of pest infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) spray at 10 days interval.</li> <li>➤ Spray Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water).</li> </ul>
<b>Cotton</b>	<b>Pink bollworm, Leaf spot</b>	<b>Flowering / Boll development / Maturity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To apply fertilizer and any agro-chemicals to the crops during this period.</li> <li>➤ To Spray Propiconazole 25% EC 10 ml/10 l or Pyraclostrobin 20% WG 10 g/10 l or Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% w/w SC 10 g/10 l or Propineb 70% WP 25 g/10 l for the control of leaf spot.</li> <li>➤ For the control of pink bollworm, spray 10 ml deltamethrin OR trizophos in 10 litre of water OR spray 100 gm Beauveria bassiana powder and 20 ml prophenophos mix in 10 liter of water.</li> <li>➤ Install pink bollworm pheromone traps.</li> <li>➤ Picking of cotton should be carried out during morning hours.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</li> </ul>

<b>Pigeon pea</b>	<b>Pod borer, sucking pest, sterility mosaic virus</b>	<b>Vegetative / Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Use yellow sticky traps @ 4-5 trap/acre</li> <li>➤ Use light trap @ 1/acre.</li> <li>➤ Install pheromone traps @ 4-5/acre for monitoring adult moths activity (replace the lures with fresh lures after every 2-3 weeks)</li> <li>➤ To control the sterility mosaic virus, Spray Propergite 57 EC or Spiromesifen 22.9 SC 10 ml/10 l water in pigeon pea.</li> <li>➤ To spray of neem seed kernel extract 5 % or Bacillus thuringiensis sero var kurstaki WP @ 400-500 g/acre in 200-400 l of water.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</li> </ul>
<b>Castor</b>	<b>Tobacco caterpillar Semilooper</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To install pheromone traps @ 4-5/acre for monitoring adult moths activity (replace the lures with fresh lures after every 2-3 weeks).</li> <li>➤ Erecting of bird perches @ 20/acre for encouraging predatory birds such as King crow, common mynah etc.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</li> </ul>
<b>Vegetable crops</b>	-	<b>Sowing/ Flowering/ Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To apply fertilizer and any agro-chemicals to the crops during this period.</li> <li>➤ To the spray of agrochemicals during this period.</li> <li>➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out.</li> <li>➤ To apply irrigation to the crop at regular interval.</li> <li>➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.</li> </ul>

<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To provide adequate food &amp; clean water for drinking and keep the animals clean shed.</li> <li>➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.</li> <li>➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place.</li> <li>➤ Use chaff cutter for fodder.</li> <li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.</li> <li>➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.</li> </ul>
------------------	---	---	---

  <b>आजादी का अमृत महोत्सव</b>	<p><b>Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)</b>  <b>Agrometeorological Cell</b>  <b>Department of Agronomy</b>  <b>Junagadh Agricultural University</b>  <b>Junagadh-362001</b></p> <p>E-mail: <a href="mailto:amfujnd@yahoo.com">amfujnd@yahoo.com</a>      Phone: 0285-2670139</p>	 
---	---	---

**Agromet Advisory Service Bulletin for Porbandar District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone**  
**(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)**

**Day:- Tuesday**

**Date: 28-11-2023**

**Agromet Advisory Service bulletin. No:- 069 (2023-24)**

Observed Weather during last Five days (Dated 23 <sup>rd</sup> to 27 <sup>th</sup> November, 2023)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 29 <sup>th</sup> Nov. to 03 <sup>rd</sup> December, 2023) <u>until 08:30 hrs of 03-12-2023</u>				
23/10	24/10	25/10	26/11	27/11		Date	29/11	30/11	01/12	02/12
0	0	0	0	0	Rainfall(mm)	0	0	0	0	0
34.2	32.6	33.4	35.0	30.8	Tmax (°C)	29	30	31	32	33
18.2	17.6	22.4	23.4	18.2	Tmin (°C)	17	18	19	20	20
0	0	2	2	0	Cloud Cover	3	3	2	2	2
80	83	53	77	91	RH-I (%)	59	57	51	56	53
48	45	28	61	70	RH-II (%)	40	40	36	37	42

-	-	7.4	3.7	-	Wind speed (km/hr)	18.0	19.0	20.0	21.0	17.0
-	-	70	230	-	Wind direction	32	22	22	25	56

### Agro meteorological Advisories

<b>General Advice</b>	<b>Rain fall</b>	As per IMD Forecast, There is forecasting of <b>no rainfall</b> occurs during next five days. Sky will be remaining mainly clear to partly cloudy.
	<b>Temperature</b>	Maximum and minimum temperature likely to be in range of <b>29 - 33°C</b> and <b>17 - 20°C</b> , respectively.
	<b>RH (%)</b>	The Relative Humidity is likely to be in the range of <b>36 – 59 %</b> .
	<b>Wind Direction and Wind Speed</b>	Direction and speed of wind is to be <b>NE &amp; N</b> and <b>17.0 – 21.0 km/h</b> , respectively.

❖ **Standardized Precipitation Index:** - For the period **28<sup>th</sup> September to 25<sup>th</sup> October, 2023**.

Porbandar district considered under the mildly dry condition.

❖ **As per ERFS products, below normal rainfall and T<sub>max.</sub> & normal T<sub>min.</sub> may occur in Saurashtra & Kutch region during 03<sup>rd</sup> to 09<sup>th</sup> December, 2023.**

❖ **MEGHDOOT Mobile Application:** - **Download** the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.

**Click on the following link to download the MEGHDOOT application:**


**Android users:**<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

**IOS users:**<https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

❖ **To apply fertilizer and agro- bio-chemicals to the crops during forecast period.**

❖ **To complete the sowing operation timely.**

❖ **Carry out weeding and inter culturing operations in timely sown *Rabi* crops and to apply irrigation to the crops at regular interval.**



Crop	Variety/ Pest / Insect	Stage	Agro met Advisories
<b>Chickpea</b>	<b>Helicoverpa armigera</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Regular monitoring of gram pod borer during entire crop season.</li> <li>➤ To set up the bird perches 40-50 for pod borer.</li> <li>➤ Installation of pheromone trap 40/ha and light trap 1/ha.</li> <li>➤ To spraying of kadvi mehadi leaf extract or mamejva leaf extract or Jatropha leaf extract or 5 % neem leaf extract at 15 days interval from the date of pest infestation.</li> </ul>
<b>Wheat</b>	<b>Termite</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</li> <li>➤ If a termite infestation is observed in the standing crop of wheat, immediately apply Fipronil 5 SC @ 1.6 litres or Chlorpyrifos 20 EC @ 1.5 litres with 100 kg of sand or soil per hectare. then lightly irrigate the crop.</li> </ul>
<b>Coriander</b>	<b>Aphid</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Over irrigation should be avoided.</li> <li>➤ Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor aphid population.</li> <li>➤ Avoid to spray pesticides whenever predators like ladybird beetle, syrphid fly and chrysopa</li> </ul>

			are present in the field which are preying the aphids.
<b>Garlic</b>	<b>Thrips</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For management of thrips, apply schedule spraying of Beauveria bassiana 1.15 WP (min 2 x 106 cfu/g), first spray at initiation of pest infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) spray at 10 days interval.</li> <li>➤ Spray Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water).</li> </ul>
<b>Cotton</b>	<b>Pink bollworm, Leaf spot</b>	<b>Flowering / Boll development / Maturity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To apply fertilizer and any agro-chemicals to the crops during this period.</li> <li>➤ To Spray Propiconazole 25% EC 10 ml/10 l or Pyraclostrobin 20% WG 10 g/10 l or Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% w/w SC 10 g/10 l or Propineb 70% WP 25 g/10 l for the control of leaf spot.</li> <li>➤ For the control of pink bollworm, spray 10 ml deltamethrin OR trizophos in 10 litre of water OR spray 100 gm Beauveria bassiana powder and 20 ml prophenophos mix in 10 liter of water.</li> <li>➤ Install pink bollworm pheromone traps.</li> <li>➤ Picking of cotton should be carried out during morning hours.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</li> </ul>
<b>Pigeon pea</b>	<b>Pod borer, sucking pest,</b>	<b>Vegetative / Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Use yellow sticky traps @ 4-5 trap/acre</li> <li>➤ Use light trap @ 1/acre.</li> </ul>

	<b>sterility mosaic virus</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Install pheromone traps @ 4-5/acre for monitoring adult moths activity (replace the lures with fresh lures after every 2-3 weeks)</li> <li>➤ To control the sterility mosaic virus, Spray Propergite 57 EC or Spiromesifen 22.9 SC 10 ml/10 l water in pigeon pea.</li> <li>➤ To spray of neem seed kernel extract 5 % or Bacillus thuringiensis sero var kurstaki WP @ 400-500 g/acre in 200-400 l of water.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</li> </ul>
<b>Castor</b>	<b>Tobacco caterpillar Semilooper</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To install pheromone traps @ 4-5/acre for monitoring adult moths activity (replace the lures with fresh lures after every 2-3 weeks).</li> <li>➤ Erecting of bird perches @ 20/acre for encouraging predatory birds such as King crow, common mynah etc.</li> </ul>
<b>Vegetable crops</b>	-	<b>Sowing/ Flowering/ Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To apply fertilizer and any agro-chemicals to the crops during this period.</li> <li>➤ To the spray of agrochemicals during this period.</li> <li>➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out.</li> <li>➤ To apply irrigation to the crop at regular interval.</li> <li>➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To provide adequate food &amp; clean water for drinking and keep the animals clean shed.</li> </ul>

- Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.
- Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place.
- Feed silage & hay material along with concentrate feed.
- Use chaff cutter for fodder.
- For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.
- Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.



**Gramin Krushi Mausam Seva (GKMS)**  
**Agrometeorological Cell**  
**Department of Agronomy**  
**Junagadh Agricultural University**  
**Junagadh-362001**

E-mail: [amfujnd@yahoo.com](mailto:amfujnd@yahoo.com) Phone: 0285-2670139



**Agromet Advisory Service Bulletin for Gir Somnath District of South Saurashtra Agro-Climatic Zone**

(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

Day:- Tuesday

Date: 28-11-2023

**Agromet Advisory Service Bulletin. No:- 069 (2023-24)**

Observed Weather during last Five days (Dated 23 <sup>rd</sup> to 27 <sup>th</sup> November,2023)					Weather Parameters	Weather Forecast upcoming Five days (Valid for 29 <sup>th</sup> November to 03 <sup>rd</sup> Dec., 2023) until 08:30 hrs of 03-12-2023				
23/10	24/10	25/10	26/11	27/11	Date	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12
0	0	0	0	1.6	Rainfall(mm)	0	0	0	0	0
33.6	33.0	34.6	34.4	29.1	Tmax (°C)	30	30	31	32	33
21.4	20.4	22.6	20.8	19.9	Tmin (°C)	19	20	21	22	23
0	0	0	7	8	Cloud cover	3	3	2	2	1
65	57	69	98	95	RH-I (%)	67	57	59	73	56

57	51	54	74	84	RH-II (%)	42	38	37	41	44
-	3.7	5.6	-	5.6	Wind speed (km/hr)	10.0	12.0	12.0	12.0	16.0
-	20	50	-	20	Wind direction	22	26	22	60	90

### Agro meteorological Advisories

<b>General Advice</b>	<b>Rain fall</b>	As per IMD Forecast, There is forecasting of <b>no rainfall</b> occurs during next five days. Sky will be remaining mainly clear to partly cloudy.
	<b>Temperature</b>	Maximum and minimum temperature likely to be in range of <b>30 - 33 °C</b> and <b>19 - 23°C</b> , respectively.
	<b>RH (%)</b>	The Relative Humidity is likely to be in the range of <b>37 – 73 %</b> .
	<b>Wind Direction and Wind Speed</b>	Direction and speed of wind is to be <b>N, NE &amp; E</b> and around <b>10 - 16 km/h</b> , respectively.

 **Standardized Precipitation Index:** - For the period **28<sup>th</sup> September to 25<sup>th</sup> October, 2023**.

Gir Somnath district considered under the mildly wet condition.

 **As per ERFS products, below normal rainfall and T<sub>max</sub>. & normal T<sub>min</sub>. may occur in Saurashtra & Kutch region during 03<sup>rd</sup> to 05<sup>th</sup> December, 2023.**


 **MEGHDOOT Mobile Application:** **Download** the MEGHDOOT mobile application for Agromet Advisory Services and information on weather forecasting, which will provide weather based agricultural advice to farmers for their location, crops and livestock in their local language.

**Click on the following link to download the MEGHDOOT application:**

**Android users:** <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

**IOS users:** <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>

- ❖ **To apply fertilizer and agro- bio-chemicals to the crops during forecast period.**
- ❖ **To complete the sowing operation timely.**
- ❖ **Carry out weeding and inter culturing operations in timely sown *Rabi* crops and to apply irrigation to the crops at regular interval.**



Crop	Variety/ Pest / Insect	Stage	Agro met Advisories
<b>Chickpea</b>	<b>Helicoverpa armigera</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Regular monitoring of gram pod borer during entire crop season.</li> <li>➤ To set up the bird perches 40-50 for pod borer.</li> <li>➤ Installation of pheromone trap 40/ha and light trap 1/ha.</li> <li>➤ To spraying of kadvi mehadi leaf extract or mamejava leaf extract or Jatropha leaf extract or 5 % neem leaf extract at 15 days interval from the date of pest infestation.</li> <li>➤ Interculturing and hand weeding should be carried out in during vaspa condition.</li> </ul>
<b>Wheat</b>	<b>Termite</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</li> <li>➤ If a termite infestation is observed in the standing crop of wheat, immediately apply Fipronil 5 SC @ 1.6 litres or Chlorpyrifos 20 EC @ 1.5 litres with 100 kg of sand or soil per hectare. then lightly irrigate the crop.</li> </ul>
<b>Coriander</b>	<b>Aphid</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Over irrigation should be avoided.</li> <li>➤ Set up yellow stick trap @ 10/ha to monitor aphid population.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Avoid to spray pesticides whenever predators like ladybird beetle, syrphid fly and chrysopa are present in the field which are preying the aphids.</li> </ul>
<b>Garlic</b>	<b>Thrips</b>	<b>Vegetative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ For management of thrips, apply schedule spraying of Beauveria bassiana 1.15 WP (min 2 x 106 cfu/g), first spray at initiation of pest infestation 0.0035% (30 g/10 l of water). Subsequent second 0.007% (60 g/10 l of water) and third 0.009% (80 g/10 l of water) spray at 10 days interval.</li> <li>➤ Spray Dimethoate 30 EC (10 ml/10 l. of water) or Quinalphos 25 EC (20 ml/10 l. of water).</li> </ul>
<b>Cotton</b>	<b>Pink bollworm, Leaf spot</b>	<b>Flowering / Boll development / Maturity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To apply fertilizer and any agro-chemicals to the crops during this period.</li> <li>➤ To Spray Propiconazole 25% EC 10 ml/10 l or Pyraclostrobin 20% WG 10 g/10 l or Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% w/w SC 10 g/10 l or Propineb 70% WP 25 g/10 l for the control of leaf spot.</li> <li>➤ For the control of pink bollworm, spray 10 ml deltamethrin OR trizophos in 10 litre of water OR spray 100 gm Beauveria bassiana powder and 20 ml prophenophos mix in 10 liter of water.</li> <li>➤ Install pink bollworm pheromone traps.</li> <li>➤ Picking of cotton should be carried out during morning hours.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</li> </ul>

<b>Pigeon pea</b>	<b>Pod borer, sucking pest, sterility mosaic virus</b>	<b>Vegetative / Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Use yellow sticky traps @ 4-5 trap/acre</li> <li>➤ Use light trap @ 1/acre.</li> <li>➤ Install pheromone traps @ 4-5/acre for monitoring adult moths activity (replace the lures with fresh lures after every 2-3 weeks)</li> <li>➤ To control the sterility mosaic virus, Spray Propergite 57 EC or Spiromesifen 22.9 SC 10 ml/10 l water in pigeon pea.</li> <li>➤ To spray of neem seed kernel extract 5 % or Bacillus thuringiensis sero var kurstaki WP @ 400-500 g/acre in 200-400 l of water.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</li> </ul>
<b>Castor</b>	<b>blight and leaf spot, jassid &amp; Thrips</b>	<b>Vegetative / Flowering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To install pheromone traps @ 4-5/acre for monitoring adult moths activity (replace the lures with fresh lures after every 2-3 weeks).</li> <li>➤ To control blight and leaf spot in castor, Spray with Mancozeb 75 % WP 26 g/10 lit or copper oxichloride 50 % WP 40g/10 lit.</li> <li>➤ To spray dimethoate 30 EC (10 ml in 10 lit water) in castor for the control of jassid &amp; thrips.</li> <li>➤ Apply irrigation to the crop at regular interval.</li> </ul>
<b>Vegetable crops</b>	-	<b>Sowing/ Flowering/ Fruiting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To apply fertilizer and any agro-chemicals to the crops during this period.</li> <li>➤ To the spray of agrochemicals during this period.</li> <li>➤ Hand weeding and interculturing operation should be carry out.</li> <li>➤ To apply irrigation to the crop at regular interval.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keep vegetable crop weed free, apply irrigation regularly and send vegetable fruit to the market often grading.</li> </ul>
<b>Livestock</b>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To provide adequate food &amp; clean water for drinking and keep the animals clean shed.</li> <li>➤ Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.</li> <li>➤ Give stored fodder with mineral mixture. Fodder should be stored at safe place.</li> <li>➤ Feed silage &amp; hay material along with concentrate feed.</li> <li>➤ Use chaff cutter for fodder.</li> <li>➤ For the control of tick and other parasites, spray deltemethrin or aemitaz 2 ml in 1 litre of water.</li> <li>➤ Udder of milking animals must be properly clean with zinc oxide or boric powder.</li> </ul>

**Technical Officer**  
**Gramin Krishi Mausam Seva (GKMS)**  
**J.A.U., Junagadh**