

**હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ
તા. ૩૦-૦૫-૨૦૧૫ થી તા. ૦૩-૦૬-૨૦૧૫**

(ગ્રામીણ કૃષિ મૈસમ સેવા, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુ.કૃ.યુ.)

હવામાન આગાહી આધારીત બુલેટીન : ૨૦૧૫

પાછલા અઠવાડીયાનું જુનાગઢનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ આબોહવાકીય વિસ્તાર
વરસાદ (મીમી)	00.0
મહત્વમાન (સે.ગે.)	38.0
લઘુત્વમાન (સે.ગ્રે.)	26.3
ભોજ(%) (સવાર/ખપોરખાદ)	75-47
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	11.2

પત્રક-૬ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૦૩-૦૬-૧૫ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૩૦.૦૪.૧૫	૦	૦
	૩૧.૦૪.૧૫	૦	૦
	૦૧.૦૫.૧૫	૦	૦
	૦૨.૦૫.૧૫	૦	૦
	૦૩.૦૫.૧૫	૦	૦
મહત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૦.૦૪.૧૫	૩૯	૩૫
	૩૧.૦૪.૧૫	૩૯	૩૪
	૦૧.૦૫.૧૫	૩૯	૩૪
	૦૨.૦૫.૧૫	૩૮	૩૪
	૦૩.૦૫.૧૫	૩૮	૩૪
લઘુત્વમાન તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૦.૦૪.૧૫	૨૭	૨૮
	૩૧.૦૪.૧૫	૨૭	૨૮
	૦૧.૦૫.૧૫	૨૭	૨૮
	૦૨.૦૫.૧૫	૨૭	૨૮
	૦૩.૦૫.૧૫	૨૮	૨૮
વાદળની સ્થિતિ (ઓક્ટો)	૩૦.૦૪.૧૫	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૩૧.૦૪.૧૫	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૦૧.૦૫.૧૫	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૦૨.૦૫.૧૫	ચોખ્યુ	ચોખ્યુ
	૦૩.૦૫.૧૫	મોટેભાગે ચોખ્યુ	અશાંત: વાદળાયુ
મહત્વમાન લેજ (%)	૩૦.૦૪.૧૫	૮૬	૮૭
	૩૧.૦૪.૧૫	૮૩	૮૪
	૦૧.૦૫.૧૫	૮૩	૮૩
	૦૨.૦૫.૧૫	૮૪	૮૫
	૦૩.૦૫.૧૫	૮૪	૮૪
લઘુત્વમાન લેજ (%)	૩૦.૦૪.૧૫	૭૧	૭૨
	૩૧.૦૪.૧૫	૬૯	૭૦
	૦૧.૦૫.૧૫	૬૮	૬૮
	૦૨.૦૫.૧૫	૭૧	૭૧
	૦૩.૦૫.૧૫	૭૫	૭૪
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૩૦.૦૪.૧૫	૦૨૧	૦૨૦
	૩૧.૦૪.૧૫	૦૨૪	૦૨૪
	૦૧.૦૫.૧૫	૦૨૯	૦૨૮
	૦૨.૦૫.૧૫	૦૩૩	૦૩૨
	૦૩.૦૫.૧૫	૦૩૫	૦૩૩
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	૩૦.૦૪.૧૫	૨૮૦	૨૮૦
	૩૧.૦૪.૧૫	૩૦૦	૩૦૦
	૦૧.૦૫.૧૫	૨૭૦	૨૭૦
	૦૨.૦૫.૧૫	૨૪૦	૨૪૦
	૦૩.૦૫.૧૫	૨૪૦	૨૪૦

દક્ષિણ ખેત આબોહવાક્ય વિસ્તાર (જિલ્લાવાર ફૂષિ સલાહ)

પાકનું નામ	ફૂષિ સલાહ
નાળુ મગાફળી	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકમાં ચુસીયા પ્રકારની જીવાતોના અસરકારક નિયંત્રણ માટે ૧૭.૫ એસ.એલ. ઇમીડાકલોપ્રાઇટ ૫ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને દવાનો પ્રથમ છંટકાવ અને ૧૫ દિવસ બાદ બીજો છંટકાવ કરવો. ❖ પાનના ટપકાના રોગના નિયંત્રણ માટે ૩૦૦ ગ્રામ કાર્બેનડાઝીમ ૧૨ % + મેન્કોઝેબ ૬૩ % wp /એકર/ ૧૫૦ લીટર પાણીમાં બેળવી છટકાવ કરવો. ❖ પાકને જરૂરીયાત મુજબ પિયત આપવુ.
નાળુ તલ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાક નિષ્ઠળ જવામાં કુગથી થતો સુકારો અને મુળનો કોહવારો થાય છે. જેથી કોપર ઓક્સિકલોરાઇટ દવા ૪૦ ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૨૬ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં ગુચ્છપર્ણ રોગને ફેલાતો અટકાવવા માટે ૦.૦૩ % ડાઈમીથ્રોએટ ૧૦ મીલી અથવા ૦.૦૨૫ % મીથાઇલ ઓ ડેમેટોન ૧૦ મીલી/ ૧૦ લીટર પાણીમાં બેળવી છટકાવ કરવો.
નાળુ મગ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકને જરૂરીયાત મુજબ પિયત આપવુ. ❖ પાકમાં ચુસીયા પ્રકારની જીવાતોના અસરકારક નિયંત્રણ માટે ૧૭.૫ એસ.એલ. ઇમીડાકલોપ્રાઇટ ૫ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં શ્રીપસના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોફેસ ૨૦ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી ઓગાળીને છંટકાવ કરવો.
શાકભાજુ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ સ્પોટેડ વીલ્ટ વાયરસના નિયંત્રણ માટે પાકની રોપણી પણી ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે ૫ ગ્રામ કાર્બેનડાઝીમ (૫૦ % વે.પા.) ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી ને છાંટવુ જેથી રોગનું પ્રમાણ ઓછુ રહે છે અને ઉત્પાદન વધારે મળે છે. ❖ પાક એક થી દોઢ માસનો થાય ત્યારે ૫૦ % વે.પા. કાર્બેનડાઝીમ ૧૦ ગ્રામ અથવા ૭૫ % વે.પા. મેન્કોઝેબ ૨૫ ગ્રામ અથવા ૫૦ % તામ્બાયુક્ત દવા ૫૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી ત્રણ છંટકાવ કરવાથી પાનના ટપકા તથા ફળના સડાનો રોગનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે. ❖ શાકભાજુના પાકમાં શીંગા કોરી ખાનાર, ફળ ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે ફોઝેલોન ૨૦ મીલી. અથવા કિવિનાલફોસ ૨૦ મીલે અથવા ડી.ડી.વી.પી. ૫ મીલી દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં બેળવી છંટકાવ કરવો. ❖ પાકમાં ચુસીયાના નિયંત્રણ માટે મોથાઇલ ઓ ડેમેટોન અથવા ડાયમીથ્રોએટ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળે છટકાવ કરવો.

આબો	<ul style="list-style-type: none"> ❖ મધ્યાના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૫ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી ૧૦ દીવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા. ❖ પાકમાં ભુકીછારાના નિયંત્રણ માટે હેકાકોનાઝોલ ૧૫ મીલી દવાનો ૧૦ લીટર પાણી ભેળવીને છંટકાવ કરવો. ❖ અંબાના પાકમાં ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે ત્રણ વખત ૫૦ ઈ.સી. ફેંશ્રીઓન ૧૦ મીલી દવા અને મીથાઈલ યુજુનોલ ૧૦ મીલીનું મિશ્રણ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી દર બાર આડ વર્ચે આવેલ એક ઝડ પર બાકીના ૧૧ ઝડ પર ફક્ત ૫૦ ઈ.સી. ફેંશ્રીઓન ૧૦ મીલી દવા પાણીમાં ભેળવી છાટકાવ કરવો.
પશુ પાલન	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પશુઓને યોગ્ય આહાર આપવો. ❖ પશુઓમાં ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટાજ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાટવી. ❖ પશુમા ફુટ અને માઉથ રોગના આવે તે માટે જરૂરી રશીકરણ કરાવવું.

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 29-05-2015

(Period from 30 May to 03 June -2015)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	38.0-38.2
Minimum temperature °C	26.0-26.6
RH % (Morning/Afternoon)	75-47
Wind speed (Kmph)	10.6-12.5
Cloud cover	0-8

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 03-06-2015

Parameters	Day-1 30-05-15	Day-2 31-05-15	Day-3 01-06-15	Day-4 02-06-15	Day-5 03-06-15
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	39	39	39	38	38
Minimum temperature °C	27	27	27	27	28
Cloud cover (Okta)	0	0	0	0	2
RH % (Morning/After noon)	86-71	83-69	83-68	84-71	84-75
Wind speed (Kmph)	021	024	029	033	035
Wind direction(Deg)	280	300	270	240	240

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Groundnut	Pod development	<ul style="list-style-type: none"> For the control of sucking pest, first spray of 17.8 SL Imidacloprid @ 5 ml in 10 liter of water and after 15 days second spray. For the control of early leaf spot, spray 300gm Carbendenzim 12 + Mencozeb 63 % WP / acre/ 150 liter of water. Apply irrigation as and when required.
Summer Sesame	Harvesting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of root rot, spray copper oxychloride 40 gm or Mencozeb 26 gm in 10 liter of water. For the control Phailody, spray 0.03 % Dimethoate 10 ml in 10 liter of water.
Summer Mung	Pod formation	<ul style="list-style-type: none"> For the control of sucking pest, spray of 17.8 SL Imidacloprid @ 5 ml in 10 liter of water. For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 liter of water.
Vegetables	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval. For the control of fruit rot, three spray of 50 WP

		<p>carbrndenzim 10 gm or 75 WP Mencozeb 25 gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.</p> <ul style="list-style-type: none"> • For the control of larva, spray Fozelon 20 ml or Quinalphos 20 ml or DDVP 5 ml in 10 liter of water. • For the control of sucking pest, spray Dimethoate 10 ml in 10 liter of water.
Mango	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> • For the control of leaf hopper, spray Imidaclopride 5 ml in 10 liter of water. • For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol@50ml in 10 liter of water. • For the control of fruit fly, three spray of 50 % fenthion 10 ml or Methyl eugenol 10 ml in 10 liter of water.
Livestock	-	<ul style="list-style-type: none"> • Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other disease.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date :29-05-2015

(Period from 30 May to 03 June -2015)

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 03-06-2015

Parameters	Day-1 30-05-15	Day-2 31-05-15	Day-3 01-06-15	Day-4 02-06-15	Day-5 03-06-15
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	35	34	34	34	34
Minimum temperature °C	28	28	28	28	28
Cloud cover (Okta)	0	0	0	0	3
RH % (Morning/After noon)	87-72	84-70	83-68	85-71	84-74
Wind speed (Kmph)	020	024	028	032	033
Wind direction(Deg)	280	300	270	240	240

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Groundnut	Pod development	<ul style="list-style-type: none"> For the control of sucking pest, first spray of 17.8 SL Imidacloprid @ 5 ml in 10 liter of water and after 15 days second spray. For the control of early leaf spot, spray 300gm Carbendenzim 12 + Mencozeb 63 % WP / acre/ 150 liter of water. Apply irrigation as and when required.
Summer Sesame	Harvesting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of root rot, spray copper oxychloride 40 gm or Mencozeb 26 gm in 10 liter of water. For the control Phailody, spray 0.03 % Dimethoate 10 ml in 10 liter of water.
Summer Mung	Pod formation	<ul style="list-style-type: none"> For the control of sucking pest, spray of 17.8 SL Imidacloprid @ 5 ml in 10 liter of water. For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 liter of water.
Vegetables	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval. For the control of fruit rot, three spray of 50 WP carbndenzim 10 gm or 75 WP Mencozeb 25 gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval. For the control of larva, spray Fozelon 20 ml or Quinalphos 20 ml or DDVP 5 ml in 10 liter of water. For the control of sucking pest, spray Dimethoate 10 ml in 10 liter of water.
Mango	Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of leaf hopper, spray Imidaclopride 5 ml in 10 liter of water.

		<ul style="list-style-type: none"> ● For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol@50ml in 10 liter of water. ● For the control of fruit fly, three spray of 50 % fenthion 10 ml or Methyl eugenol 10 ml in 10 liter of water.
Livestock	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other disease.

JUNAGADH

Phone: 0285-2670139

Date:- 08-05-2015

(Period from 09 to 13 May -2015)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	41.0-42.5
Minimum temperature °C	19.5-21.0
RH % (Morning/Afternoon)	79-15
Wind speed (Kmph)	5.2-5.4
Cloud cover	0

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 13-05-2015

Parameters	Day-1 09-05-15	Day-2 10-05-15	Day-3 11-05-15	Day-4 12-05-15	Day-5 13-05-15
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	40	40	39	39	39
Minimum temperature °C	27	27	26	27	28
Cloud cover (Okta)	2	0	0	1	0
RH % (Morning/After noon)	74-58	82-57	82-62	84-68	85-66
Wind speed (Kmph)	021	017	017	020	024
Wind direction(Deg)	290	280	270	280	270

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Groundnut	Flowering	<ul style="list-style-type: none"> For the control of sucking pest, first spray of 17.8 SL Imidacloprid @ 5 ml in 10 liter of water and after 15 days second spray. For the control of early leaf spot, spray 300gm Carbendenzim 12 + Mencozeb 63 % WP / acre/ 150 liter of water. Apply irrigation as and when required. Interculturing and hand weeding should be carried out.
Summer Sesame	Flowering/Growth	<ul style="list-style-type: none"> Apply irrigation as and when required. For the control of root rot, spray copper oxychloride 40 gm or Mencozeb 26 gm in 10 liter of water. For the control Phailody, spray 0.03 % Dimethoate 10 ml and 0.025 % Methyl-o-demeton 10 ml in 10 liter of water.
Summer Mung	Growth	<ul style="list-style-type: none"> Interculturing and hand weeding should be carried out. For the control of sucking pest, spray of 17.8 SL Imidacloprid @ 5 ml in 10 liter of water. For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 liter of water.
Vegetables	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval. For the control of fruit rot, three spray of 50 WP carbndenzim 10 gm or 75 WP Mencozeb 25 gm in 10

		liter of water at 10 to 12 days interval.
Mango	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> ● For the control of leaf hopper, spray Imidaclopride 5 ml in 10 liter of water. ● For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol@50ml in 10 liter of water.
Livestock	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other disease.

PORBANDAR

Phone : 0285-2670139

Date :08-05-2015

(Period from 09 to 13 May -2015)

Weather forecast for Junagadh Dist. until 08:30 hrs of 13-05-2015

Parameters	Day-1 09-05-15	Day-2 10-05-15	Day-3 11-05-15	Day-4 12-05-15	Day-5 13-05-15
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	35	35	34	34	34
Minimum temperature °C	24	24	25	25	25
Cloud cover (Okta)	2	0	0	1	0
RH % (Morning/After noon)	76-58	83-57	82-68	84-69	85-66
Wind speed (Kmph)	021	018	016	019	022
Wind direction(Deg)	290	280	270	280	270

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Groundnut	Flowering	<ul style="list-style-type: none"> For the control of sucking pest, first spray of 17.8 SL Imidacloprid @ 5 ml in 10 liter of water and after 15 days second spray. For the control of early leaf spot, spray 300gm Carbendenzim 12 + Mencozeb 63 % WP / acre/ 150 liter of water. Apply irrigation as and when required. Interculturing and hand weeding should be carried out.
Summer Sesame	Flowering/Growth	<ul style="list-style-type: none"> Apply irrigation as and when required. For the control of root rot, spray copper oxychloride 40 gm or Mencozeb 26 gm in 10 liter of water. For the control Phailody, spray 0.03 % Dimethoate 10 ml and 0.025 % Methyl-o-demeton 10 ml in 10 liter of water.
Summer Mung	Growth	<ul style="list-style-type: none"> Interculturing and hand weeding should be carried out. For the control of sucking pest, spray of 17.8 SL Imidacloprid @ 5 ml in 10 liter of water. For the control of thrips, spray Profenophos 20ml in 10 liter of water.
Vegetables	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of spotted wilt virus, spray Carbendenzim (50 % WP) 5gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval. For the control of fruit rot, three spray of 50 WP carbendenzim 10 gm or 75 WP Mencozeb 25 gm in 10 liter of water at 10 to 12 days interval.
Mango	Flowering/Fruiting	<ul style="list-style-type: none"> For the control of leaf hopper, spray Imidaclopride 5 ml in 10 liter of water. For the control of powdery mildew, spray Hexaconazol@50ml in 10 liter of water.

Livestock	-	• Do vaccination in animal for the prevention of FMD and other disease.
------------------	---	---