



જીલ્લા કૃષિ હવામાન એકમ (DAMU)

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (GKMS)

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર

જુ.કુ.યુ., જામનગર- ૩૬૧૦૦૬

તા. ૧૨-૧૦-૨૦૨૨ થી તા. ૧૬-૧૦-૨૦૨૨

(#Azadi ka Uatsav-Amrit Mahotsav)

જામનગર જીલ્લા કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૮૦ (૨૦૨૨) તારીખ: ૧૧-૧૦-૨૦૨૨

(જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપદ્ધ)



પાછળા અઠવાડીયાનું જામનગર નું હવામાન

હવામાન પરિબળો		
વરસાદ(મી.મી)	0.0	
મહત્વાપમાન(સે.ગ્રે)	૩૨.૦-૩૩.૫	
લઘુત્વમાન(સે.ગ્રે)	૨૩.૦-૨૪.૫	
ભેજ(%)	સવાર	૭૨-૮૦
	બપોરબાદ	૪૪-૫૧
પવનનીગતિ (કિમી/કલાક)		૪.૮-૭.૦

હવામાન આગાહી

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર એત આબોહવાકીય વિભાગ - જામનગર જીલ્લાની હવામાન આગાહી

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૧૨-૧૦-૨૦૨૨	૧૩-૧૦-૨૦૨૨	૧૪-૧૦-૨૦૨૨	૧૫-૧૦-૨૦૨૨	૧૬-૧૦-૨૦૨૨
વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્વમાન (સે.ગ્રે)	૩૪	૩૩	૩૩	૩૩	૩૩
લઘુત્વમાન (સે.ગ્રે)	૨૫	૨૫	૨૫	૨૫	૨૪
મહત્વભેજ (%) સવાર	૫૮	૫૮	૫૬	૫૦	૫૭
લઘુત્વભેજ (%) બપોર બાદ	૩૨	૨૭	૩૦	૩૦	૨૮
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૨.૨	૧૨.૫	૧૨.૩	૧૬.૨	૧૫.૨

પવનની દિશા (ડીગ્રી)	વાયવ્ય	વાયવ્ય	પક્ષિમ	પક્ષિમ	પક્ષિમ
વાદળની સ્થિતિ	મુખ્યત્વે ચોખ્યું	આંશિક વાદળધાયું	આંશિક વાદળધાયું	આંશિક વાદળધાયું	આંશિક વાદળધાયું

નોંધ: આ આગાહી સમગ્ર જીલ્લાની સરેરાશ હોય છે એટલે તેને કોઈ પણ એક જગ્યા માટે લાગુ કરવી નહીં.

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા વિભાગ, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહાવાકીય વિસ્તારના

જામનગર જીલ્લામાં આગામી સપ્તાહ ૬૨મ્યાન હવામાન મુખ્યત્વે ચોખ્યુંથી આંશિક વાદળધાયું રહેશે અને વરસાદનું પ્રમાણ નહીંવત રહેશે.

તાપમાન: આ સમયગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૩૩-૩૪ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૪-૨૫ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

ભેજનું પ્રમાણ: સવારના સમયે ભેજનું પ્રમાણ ૫૭-૬૦ % રહેશે તથા બપોર પછીના ભેજનું પ્રમાણ ૨૭-૩૨ % રહેવાની શક્યતા છે.

પવનની દિશા અને ગતિ: પવનની દિશા મોટેભાગે પક્ષિમ-વાયવ્ય તરફથી રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૨.૨-૧૬.૨ રહેશે.

સામાન્ય કૃષિ સલાહ

- પરિપક્વ અવસ્થાએ મગફળી, બાજરો, તલ વગેરે જેવા પાકોના લણણી કર્યો હાથ ધરવા જોઈએ.
- શિયાળુ પાકોના વાવેતર માટેનું પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ, અને તેને અનુરૂપ જમીન તૈયાર કરવી જોઈએ.
- શિયાળુ પાકોનું વધારે વહેલું વાવેતર ન કરતા ૧૫ ઓક્ટોબર થી ૧૫ નવેમ્બર ની વચ્ચેના સમયગાળામાં જ કરવું જોઈએ, જ્યારે શિયાળાની શરૂઆત થાય.
- સમયાંતરે કપાસ, દિવેલા અને તુવેર જેવા પાકોમાં પુરક ખાતર આપવું.
- કપાસમાં ફાલ ખરે નહીં તે માટે નેથેલીન એસેટિક એસિડનું ૩૦ પીપીએમનું દ્રાવણ છાંટવું (પ્લાનોફિક્સ ૭.૫ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાંટવું).
- ચુસીયા પ્રકારની જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લીમડાની લીંબોળીના મીજં નો ભૂકો ૭૫૦ ગ્રામ ૫ ટકા અ)ડ્ક (અથવા લીંબોળીનું તેલ ૪૫ મિલી અથવા લીમડા આધારિત તૌયાર કરેલ કીટનાશક ૩૦ મિલી (૧ છસી) થી ૬૦ મિલી ૧૫.૦) છસી (પ્રતિ પંપ પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.
- ઇયળના ફુદાના નિયંત્રણ માટે એક હેક્ટર દીઠ એક પ્રકાશ પિંજર ગોઠવવા જોઈએ.



શિયાળું પાકોનું આગોતરું આયોજન

ઘઉસ	<ul style="list-style-type: none"> • ઘઉસના વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવી. • ટપક સિંચાય ની સગવડ હોય તો તેના દ્વારા જ પિયત આપવું જોઈએ. • સારી ગુણવત્તા વાળા બીજ વાવેતર માટે એકઠા કરી લેવા જોઈએ. • વાવેતર સમયને અનુરૂપ જતો પસંદ કરવી જેવીકે <ul style="list-style-type: none"> ✓ વહેલી વાવણી (૧૦ નવેમ્બર પહેલા): જુ.જે. ડબલ્યુ-૪૬૩ ✓ સમયસર વાવણી (૧૫ થી ૨૫ નવેમ્બર: લોક-૧, જુ.ડબલ્યુ -૩૬૬, ૪૫૧, ૪૬૬ ✓ મોડી વાવણી: (૨૬ નવેમ્બર થી ૧૦ ડિસેમ્બર): જુ.ડબલ્યુ-૧૭૩, ૧૧, લોક-૧૧
ચણા	<ul style="list-style-type: none"> • ચણાના વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવી. • ઓક્ટોબર મહિનાના અંતમાં વાવેતર કરવું. • વાવેતર માટે ગુજરાત ચણા -૩ અને ગુજરાત ચણા -૫ જેવી વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતો પસંદ કરવી.
જુરુ	<ul style="list-style-type: none"> • જુરુના વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવી. • નવેમ્બર મહિનામાં ઠંડીની શરૂઆત થયે વાવેતર કરવું. • વાવેતર માટે ગુજરાત જુરુ-૩ અને ગુજરાત જુરુ-૪ નામની જાતોનું વાવેતર કરવું.
ધાણા	<ul style="list-style-type: none"> • ધાણા ના વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવી. • નવેમ્બર મહિનામાં ઠંડીની શરૂઆત થયે વાવેતર કરવું. • વાવેતર માટે અને ગુજરાત ધાણા-૨જેવી ભલામણ કરેલ જાતોનું વાવેતર કરવું.
લસણ	<ul style="list-style-type: none"> • લસણ ના વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવી. • નવેમ્બર મહિનામાં ઠંડીની શરૂઆત થયે વાવેતર કરવું. • વાવેતર માટે ગુજરાત લસણ-૩, ગુજરાત લસણ-૪, ગુજરાત જૂનાગઢ લસણ-પભલામણ કરેલ જાતોનું વાવેતર કરવું.

પાક પ્રમાણે કૃષિ સલાહ

મુખ્યપાક	કૃષિસલાહ
મગાફળી	<ul style="list-style-type: none"> • વહેલું વાવેતર કરેલ અને ઉભાડી પ્રકારની મગાફળીને વરાપના સમયે ઉપાડવાની કામગીરી હાથ

	ધરવી.
કપાસ	<p>• ગુલાબી છયળ: કપાસમાં ગુલાબી છયળનો ઉપક્રમ જોવા મળેલ છે. ગુલાબી છયળના ઉપક્રમના મોનીટરીંગ માટે હેકટરે પતિ ૬ ફેરોમેન ટ્રેપ ગોઠવવા. કપાસમાં ગુલાબી ઈયળથી નુકશાન પામેલ કૂલ અને ચાપવા તોડીને જમીનમાં દાટી દેવા. વધુ નુકશાન હોયતો પ્રોફેનોફોસ ૫૦% ઇ.સી. ૨૦મી.લી. અથવા સાયપરમેથ્રીન ૧૦ મિલી સાથે બ્યુવેરીયા બાસીઆના ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p>  <ul style="list-style-type: none"> કપાસમાં થ્રીપ્સ અને લીલી પોપટીનો વધુ ઉપક્રમ જોવા મળે છે જેના નિયંત્રણ માટે એસીફેટ ૫૦ % + ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૧.૮ એસ.પી. ૧૦ મી.લી. અથવા ફલોનીકામીડ ૫૦ % વે.ગ્રે. ૩ ગ્રામ સાથે લીંબોળીનું ૧૫૦૦ પીપીએમ તેલ ૪૦ મીલી અથવા લીંબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. અલ્ટરનેરીઆ ફૂગનો પાનના ટપકાનો રોગ લાગે નહિ તે માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. બી.ટી. કપાસમાં ૪.૫ થી ૫ ફૂટની ઊંચાઈએ ઉપરની ટોચ કાપવી, જેથી સારો ફાલ લાગે. તેમજ કપાસમાં કૂલ ભમરી ખરતી અટકાવવા અને સારા ફાલ માટે નેથેલીન એસેટિકએસિડનું ૩૦ પીપીએમનું દ્રાવણ છાંટવું નેથેલીનએસેટિકએસીડનું ૩૦પીપીએમ દ્રાવણ છાંટવું (પ્લાનોફીક્સ ૭.૫ મિલી ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાંટવું).
દિવેલા	<p>• સુકારાના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્સિક્લોરોઇડ ૫૦-૬૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં બેળવી છોડની ફરતે પાવું.</p>  <ul style="list-style-type: none"> જમીનમાં લેજ સંગ્રહી રાખવા માટે આંતર ઘેડ કરવી અને નિંદામણ દુર કરવું. ચુસીયા પ્રકારની જીવતો: તડતડીયા, થ્રીપ્સ અને સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ .૧૫ મી (%03.૦)લી ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી ૧૫ .દિવસનાં અંતરે જરૂરીયાત મુજબ છંટકાવ કરવો. સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે એસીટામેપ્રાઇડ ૨૦ એસ.પી . ૩ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવો.

	<ul style="list-style-type: none"> ઘોડિયા ઈયળ અથવા લીલી ઈયળ: ઘોડિયા ઈયળ અથવા લીલી ઈયળ ના નિયંત્રણ માટે ડાયકલોરોવોસ ૭૬ ઇસી ૧૦ મિલી અથવા મિથાઈલ ઓ ડેમેટોન ૨૫ ઇસી ૧૫ મિલી ૧૫ લીટર પાણીમાં નાખીને વરાપે છંટકાવ કરવો.
	 
બાજરો	<ul style="list-style-type: none"> પરિપક્વ થયેલ કુંડાની લણણી કરી સલામત સ્થળે સૂકામાં સૂર્ય તાપ નીચે સૂકવવા.
તુવેર	<ul style="list-style-type: none"> વંધ્યત્વનો રોગ: તુવેરમાં સ્ટરીલીટી મોઝેક (વંધ્યત્વનો રોગ, કથીરી)ના નિયંત્રણ માટે પ્રોપરઝાઈટ ૫૭% ઇ.સી ૩૦-૪૦ મિલી/પંપ છંટકાવ કરવો. પુરતી ખાતર આપીને વરાપના સમયે પાળા બાંધવા અને પિયત આપવું.
ચોમાસું કુંગળી	<ul style="list-style-type: none"> પુરક ખાતરનો જથ્થો સમયાંતરે આપવો. કુંગળીમાં જાંબલી ધાબા અને સુકારાનો રોગ ન લાગે તે માટે ૧૫ દિવસના અંતરે મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અને કાર્બેન્ડાઈમ ૨૦ ગ્રામ ૧૫ લીટર પાણીના પમ્પમાં નાખીને ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા.
	 
શાકભાજુ પાકો	<ul style="list-style-type: none"> રોગિષ છોડને ખેતરમાંથી ઉપાડીને જમીનમાં દાટી દેવા જોઈએ. શાકભાજુ પાકોને નિંદણ મુક્ત રાખવા જોઈએ. પાન કોરીયુ: વેલાવાળા શાકભાજુ પાકમાં પાન કોરીયાનો ઉપક્રમટાળવા માટે ૧૫ મીલી મીથાઈલ-ઓ-ડેમેટોન (૨૫ ઇસી) અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ (૩૦ ઇસી) ૧૫ લીટર પાણીના પંપમાં નાખીને છંટકાવ કરવો.
	 
	<ul style="list-style-type: none"> શ્રીપ્સ: મરચીના પાકમાં શ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ૩૦ મીલી પ્રોફેનોફોસ ૧૫ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી છાંટવી. શ્રીપ્સનો વધુ ઉપક્રમ હોય તો સ્પીનોસાડ અથવા સ્પીનેટોરમ દવા ૭-૮ મીલી પ્રતિ પંપ છાંટવી.
	 
	<ul style="list-style-type: none"> ફળમાખી: ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે એસીટામીપ્રીડ ૨૦ ટકા ૧૫ ગ્રામ દવા ૧૫ લીટર પાણીમાં

	<p>ભેગવી છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> લીલી છયળ: ટામેટા અને રીંગણનાં પાકમાં લીલી છયળનો ઉપક્રમ વધુ જોવા મળે છે તેના નીચેની માટે ઇન્ડોકાર્બ ૨૫ ઇસી ૩૦ મિલી અથવા સ્પીનોસાડ ૪૫ ઇસી ૫ મિલી પ્રતિપંપછાંટવી.  <ul style="list-style-type: none"> પાનકશીરી: શાકભાજુ પાકોમાં પાનકશીરીનો ઉપક્રમ જોવા મળે તો ફેનાઝાકવિન ૧૦ ઇસી ૧૦ મિલી અથવા ડાયફેન્યુરોન ૫૦ ડબલ્યુ પી ૧૫ ગ્રામ ૧૫ લીટર પાણીમાં પંપમાં નાખીને છંટકાવ કરવો.  <ul style="list-style-type: none"> સફેદ માખી અને લીલી પોપટી: ભીડામાં સફેદ માખી અને લીલી પોપટીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું ટેલ ૫૦ મી.લી. અથવા લીંબોળીના મીજનું ૫ ટકા અંદર નું દ્રાવણ ૫૦૦ મી.લી. અને ડાયફેનથાયરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
પશુ	<ul style="list-style-type: none"> પશાઓમાં લંપી અને બીજા રોગોને અટકાવવાનું માટે રસીનો ડોઝ આપવો. વરસાદી વતાવરણ સમયે પશુઓને બંધ શેડમાં રાખવા જોઈએ. યોગ્ય માત્રામાં આવશ્યક ક્ષાર / ખનિજ મિશ્રણ ચારાસાથે ભેગવીને પ્રાણીઓને આપવું આવશ્યક છે. પશુઓના રહેઠાણની વ્યવસ્થિત સફાઈ રાખવી અને માખીઓના ઉપક્રમથી બચવા ફિનાઇલ છાંટવું અથવા લીમડાનાં પાનનો ધુમાડો કરવો. પશુનેક થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને પ્રતિ લીટર દુધની ઊપજ હોય તેમને નિયમિત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનિજ તત્ત્વોનું મિશ્રણ આપવું. ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેશ્નીન અથવા એમીટ્રાલ ૨ મી.લી. એક લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી.

District Agrometeorological Unit (DAMU)

GraminKrushi Mausam Seva (GKMS)

Krishi Vigyan kendra

Junagadh Agricultural University

Jamnagar-361006

Date: 12-10-2022 to 16-10-2022

(#Azadi ka Uatsav-Amrit Mahotsav)



Jamnagar District Agromet Advisory Service bulletin No. 80 (2022) Date: 11-10-2022

(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

Significant weather for the preceding week

weather parameter		
Rain fall (mm)		0.0
Maximum temperature (°C)		32.0-33.5
Minimum temperature (°C)		23.0-24.5
Relative Humidity (%)	Morning	72-80
	Afternoon	44-51
Wind speed (Kmph)		4.8-7.0

Weather forecasting for Jamnagar District

Date	Day-1 12-10-2022	Day-2 13-10-2022	Day-3 14-10-2022	Day-4 15-10-2022	Day-5 16-10-2022
Parameters					
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature (°C)	34	33	33	33	33
Minimum temperature (°C)	25	25	25	25	24
Relative Humidity-I (%)	58	58	59	60	57
Relative Humidity-II (%)	32	27	30	30	28
Wind speed (Km/h)	12.2	12.5	12.3	16.2	15.2
Wind Direction (deg.)	NW	NW	W	W	W
Cloud cover (Okta)	Mainly clear	Partly Cloudy	Partly Cloudy	Partly Cloudy	Partly Cloudy

Note: Above forecast is the average situation of whole district not for one particular place.

Gramin Krishi Mausam Seva, Krishi Vigyan Kendra, Jamnagar and Indian meteorological department announce upcoming five days weather forecast of

Jamnagar district have sky will be observed Mainly clear to Partly cloudy weather forecast in next five days.

Rain fall: In the next week no chances of rainfall.

Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range 33-34 °C and 24-25 °C, respectively.

Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 57-60 % & 27-32 %, respectively.

Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be W-NW and 12.2-16.2 km/h, respectively.

General Agricultural Advisory

- Harvest the crop like groundnut, bajara and sesame at maturity stage in clear sky condition.
- Carried out planning of Rabi crop sowing. On the basis of crop, prepare soil and carried out cultivation.
- Not plan to early sowing Rabi crop, sowing is occur at 15th October to 15th November at ideal date of Rabi crop sowing, when cold night is starting.
- Apply the supplementary dose of fertilizer to crop like Cotton, Castor and Red gram.
- Farmers are advised to spray 30 ppm Naphthalene Acetic Acid solution (planofix 7.5 ml/10 liter of water) to prevent dropping of flowering.
- Control of sucking pest and larva pest spray 100 gm Beauveria bassiana powder in 15 liter of water.
- Apply neem seed kernel extract @ 750 g or Neem oil @ 45 ml in 15 lit of water to control sucking pests due to prevailing cloudy weather.
- Control of larvae pest in all crop set the light trap par hector to control the adult of larvae.



If Kharif crop harvested then Planning for Rabi Crop Sowing

Wheat

- Prepare the soil for wheat crop cultivation
- If drip irrigation facility available then cultivate wheat crop in drip irrigation.
- Collect the wheat crop seed on the basis of requirement.
- Select the variety on the basis of date of sowing like
 - Early sowing: (before 10th November): GJW-463
 - Timely Sowing: (15 to 25 November): Lok-1, GW-366, 496
 - Late sowing: (26 November to 10 December): GW-173,11 and

	Lok-11
Chick pea	<ul style="list-style-type: none"> • Prepare the soil for Chick pea crop cultivation. • Sowing can be carried out in October month. • Select the high yielding variety like Gujarat chickpea-3 and Gujarat chickpea-5.
Cumin	<ul style="list-style-type: none"> • Prepare the soil for Chick pea crop cultivation. • Sowing can be carried out in November month when cold night starting. • Select the high yielding variety like Gujarat Cumin-3 and Gujarat Cumin -4.
Coriander	<ul style="list-style-type: none"> • Prepare the soil for Chick pea crop cultivation. • Sowing can be carried out in November month when cold night starting. • Select the recommended variety like Gujarat Coriander-2.
Garlic	<ul style="list-style-type: none"> • Prepare the soil for Chick pea crop cultivation. • Sowing can be carried out in November month. • Select the high yielding variety like Gujarat Garlic-3, Gujarat Garlic-4, Gujarat Junagadh Garlic-5.

Crop wise Advisory	
crop	Advisory
Kharif Groundnut	<ul style="list-style-type: none"> • Harvest the early sowing and bunch type groundnut in clear weather condition.
Cotton	<ul style="list-style-type: none"> • Pink ballwarm: Put the 5 pheromone trap per hectare and monitor the trap, if 8-10 adult observe in trap then spray 100 gm Beauveria bassiana powder and 20 ml prophenophos mix in 10 liter of water. <div style="text-align: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> • If thrips and jassids infestation observed in cotton, spray Acephate 50 % + Imidacloprid 1.8 % SP 10 ml or Flonicamid 3 gm with 1500 ppm neem oil 40 ml /10 litre of water. • Detopping of cotton should be done in crop having 4.5-5 feet height. • Under present weather, farmers are advised to spray 30 ppm Naphthalene Acetic Acid solution (planofix 7.5 ml/10 liter of water) to prevent dropping of flowering.
Castor	<ul style="list-style-type: none"> • For the control of wilt in castor drenching with copper oxychloride 50-60 gm per pump near affected plant.




- Apply supplementary dose fertilizer in crop.
- **Sucking pest:** Apply Dimethoate 0.03% @ 15 ml in 10 lit of water @ 15 days of interval. If there is more infestation of whitefly, spray acetamiprid 20 SP @ 3 g in 10 lit. of water.
- **semi looper and spodoptera:** For the control of semi looper and spodoptera spray dichlorovos 76 EC 10 ml or methyl o demeton 25 EC 15 ml mix in 15 liter water and spray alternate in clear weather condition.



pearl millet • Cut the mature ear head and sundry on safe place in rainy condition.

Red gram • **Starility mosaic Virus:** Red mite infestation and spread Starility mosaic virus, for control them spray properzait 57% EC 30-40 ml/pump.
• Apply supplementary dose fertilizer and prepare bund apply irrigation when required.

Kharif Onion • Apply Supplementary dose of fertilizer.
• For the control of purple blotch and fuserium wilt disease in kharif onion make 3 alternate spray of Mencozeb 40 gm and Carbendazim 15 gm in 15 litre of water at 10 days interval.



Vegetables • Infected plants should be uprooted and buried in the soil.
• Keep vegetable crop weed free.
• **leaf Webber:** For the control of leaf Webber in fruit leafy vegetable spray 15 ml methyl-O-demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 15 liter of water.



• **Thrips in chilli:** For the control of thrips in chilli, spray 30 ml profenophos in 15 litres of water. In case of heavy attack make spray of

spinosad or spinetoram 7-8 ml per 15 liter of water.



- **Fruit fly:** For the control of Fruit fly spray acetamiprid 20 % 15 gm per 15 liter water pump.
- **Fruit borer:** In brinjal and tomato crops control of fruit borer, spray reenaxipayar @ 5 ml in 15 lit of water. In tomato crops control of fruit borer, spray indoxacarb 25 EC 30 ml or spinosad 45 EC 5 ml per pump mix in water and spray.



- **Mite:** If mite infestation observe in vegetable then spray fenazaquin 10 EC 10 ml or diafenuron 50 WP 15 gm per 15 liter water pump and carried out alternate spray.



- **Whitefly & jassids in Okra:** For control of whitefly & jassids in Okra, spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml neem oil or acephate75 % SP@ 15 gm or imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 litre of water.

Animals

- Do vaccination in animal for the prevention of Lumpi and other diseases.
- Essential salts/mineral mixture in appropriate quantities must be mixed with feed and given to the animals.
- Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes.
- Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield.
- Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick.