



જલ્લા કૃષિ હવામાન એકમ (DAMU)

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (GKMS)

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર

જુ.કુ.યુ., જામનગર- ૩૬૧૦૦૬

તા. ૨૩-૧૨-૨૦૨૩ થી તા. ૨૭-૧૨-૨૦૨૩



જામનગર જલ્લા કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૧૦૧ (૨૦૨૩) તારીખ: ૨૨-૧૨-૨૦૨૩

(જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવર્સિટી અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

પાછલા અઠવાડીયાનું જામનગરનું હવામાન

હવામાનપરિબળો		
વરસાદ(મી.મી)		૦.૦
મહત્વમાયમાન (સે.ગ્રે)		૨૫.૨-૨૭.૪
લધુતમતાપમાન(સે.ગ્રે)		૧૪.૪-૧૯.૮
ભેજ(%)	સવાર	૫૮-૮૭
	બપોરબાદ	૨૮-૩૮
પવનનીગતિ (કિમી/કલાક)		૫.૭-૭.૮

હવામાન આગાહી

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાડીય વિભાગ - જામનગર જલ્લાની હવામાન આગાહી

તારીખ	દિવસ-૧ ૨૩-૧૨-૨૦૨૩	દિવસ-૨ ૨૪-૧૨-૨૦૨૩	દિવસ-૩ ૨૫-૧૨-૨૦૨૩	દિવસ-૪ ૨૬-૧૨-૨૦૨૩	દિવસ-૫ ૨૭-૧૨-૨૦૨૩
પેરામીટર					
વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્વમાયમાન (સે.ગ્રે)	૨૭	૨૮	૨૯	૩૦	૩૦
લધુતમતાપમાન (સે.ગ્રે)	૨૦	૨૦	૨૧	૨૧	૨૧
મહત્વમાયમાન (%) સવાર	૩૮	૩૮	૪૦	૪૧	૩૮
લધુતમતાપમાન (%) બપોર બાદ	૨૨	૨૫	૨૨	૨૩	૨૫
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૨	૧૬	૧૭	૧૬	૧૪
પવનની દિશા (ડિગ્રી)	ઈશાન	ઈશાન	ઈશાન	ઈશાન	ઈશાન
વાદળની સ્થિતિ	આંશિક વાદળછાયું	આંશિક વાદળછાયું	આંશિક વાદળછાયું	આંશિક વાદળછાયું	આંશિક વાદળછાયું

માન્ય તારીખ ૨૭-૧૨-૨૦૨૩, સવારના ૮:૩૦ વાગ્યા સુધી

આ આગાહી સમગ્ર જલ્લાની સરેરાશ હોય છે એટલે તેને કોઈ પણ એક જગ્યા માટે લાગુ કરવીનહીની.

ભારત સરકારની હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા વિભાગ, કૃષિ વિજ્ઞાન

કેન્દ્ર, જમનગર તરફથી જાણાવવામાં આવે છે કેઉતર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહાવાકીય વિસ્તારના.

જમનગર જળવામાં આગામી સપ્નાહમાં આકાશ આંશિક વાદળણાયું અને વરસાદનું પ્રમાણ નહિવત રહેશે.

તાપમાન: આ સમયગાળામાં મહત્વમાં તાપમાન દિવસ દરમાન ૨૭-૩૦ ડિગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમાન ૨૦-૨૧ ડિગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની શક્યતાછે.


ભેજનું પ્રમાણ: સવારના સમયે ભેજનું પ્રમાણ ૩૯-૪૧ % રહેશે તથા બપોર પછીના ભેજનું પ્રમાણ ૨૨-૨૫ % જેટલું રહેવાની શક્યતા છે.

પવનની હિંદુએ અને ગતિ: પવનની હિંદુ મોટેભાગે ઈશાન તરફથી રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૨-૧૭ કિમી/કલાક રહેશે.

સામાન્ય કૃષિ સલાહ

- વાદળણાયા હવામાનને કારણે શિયાળું પાકમાં રોગ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધવાની શક્યતા હોય પાકનું સતત નિરિક્ષણ કરતા રહેવું આર્થિક ક્ષમ્યમાત્રા કરતા વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો ભલામણ મુજબ નિયંત્રણના પગલા લેવા.
- રાત્રીના સમયે પશુને હંડીથી બચવા માટે બંધ રહેઠાણમાં રાખવા જોઈએ.
- પાકમાં જરૂરિયાત કરતા વધારે પિયત આપવાથી રોગ અને જીવાતનો ઉપદ્રવ વધે છે, જેથી જરૂરીયાત મુજબ જ પિયત આપવું.
- શાકભાજના પાકમાં થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોક્લોસ ૨૦ મિલી અથવા સ્પીનોસાદ ઉમિલી ૧૦લીટર પાણીમાં ઓગળીનને ૧૦ થી ૧૫ દિવસના ગાળે છાંટવી.
- શિયાળું પાકોમાં પુરુક ખાતર પિયત સાથે અથવા પિયત આપ્યા પછી આપવું. ચાળાના પાકમાં નિંદણ ના નિયંત્રણ માટે આંતરખેડ કરવી. જો કોઈ શિયાળું પાકોમાં રોગ-જીવત નો ઉપદ્રવ જણાય તો તેના નિયંત્રણના પગલા વહેલી તક લેવા જોઈએ.
- ચાળા અને ધાળાના પાકોમાં મોલોના નિયંત્રણ માટે થાયોમિથોક્ઝામ પ. ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
- કપાસમાં વધારે પડતો રોગ જીવાતનો ઉપદ્રવ હોય અને નિયંત્રણ થઈ શકે એમ નાં હોય અથવા સમયસર વીળી થઈ ગઈ હોય તો, વહેલી તક કપાસના પાકને કાઢી જેની વધારે પડતી માંગ હોય તેવા શાકભાજ પાકોનું વાવેતર કરવું જેથી વધારે નક્કે મેળવી શકાય.. કપાસની સાંદીઓ/કરાઠીઓનો બાળીને નાશ કરવાની જગ્યાએ શ્રેદર વડે તેના નાના ટુકડાઓ કરી કમ્પોસ્ટ (સેન્ટ્રીય ખાતર) બનાવવા ઉપયોગ કરવો.

પાક પ્રમાણે કૃષિ સલાહ

ધઉં	<ul style="list-style-type: none"> ઉધ્યય: ઉધ્યયનો ઉપદ્રવ રહેતો હોય ત્યાં કલોરપાયરીક્લોસ ૨૦ ટકા એ.સી. પ લીટર દવા પિયત પાણી સાથે આપવી. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> પિયત: મફુટ/તંતુંમૂળ અવસ્થાએ ૧૩૦ કી.ગ્રા. યુરીયા અને પિયત આપવું. ઉંદર: જો ધઉના પાકમાં ઉંદરનું નુકશાન જોવામળે તો જીક ફોસ્ફોરાઇડ, બેરીયમ કાર્బોનેટ અને રેડ સ્ક્વેલ ખોરાક સાથે બેળવીને મુકવાની ઉંદરના ત્રાસ સામે નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે. રાતડો અને ગેરુ: રોગની શરૂઆતમાં મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા ૪૦ ગ્રામ ૧૫ લીટર પાણીમાં બેળવી ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા.
ચાળા	<ul style="list-style-type: none"> સુકરો: વાવેતર ના ૧૫-૨૦ દિવસ પછી ટ્રાયકોડર્મા ફૂળનાશક પાવડર પ-૬ કિગ્રા/હેક્ટારે જમીનમાં આપવું જેથી જમીનજન્ય રોગોથી થતું નુકશાન અટકાવી શકાય છે. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">    </div>

- પિયત:** ચણામાં વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ અને ડાળ ફૂટની અવસ્થાએ પિયત આપવું. ચણાના ઉગાવા બાદ ત્રીજુ પિયત આંતર ખેડ કરીને આપવું.
- લીલી ઈયળ:** લીલી ઈયળનો ઉપદ્રવ આર્થિક કષમ્યમાત્રા કરતાવધુ જોવા મળે ત્યારે કવીનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીછંટકાવ કરવો.



- સટંટ વાઈરસ:** રોગ મોલોમશી મારફતે ફેલાતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે કીટનાશક જેવી કે મીથાઈલ-ઓ-ડિમેટોન ૧૨ મીલી અથવા ડાયમીથોઓટ ૧૦ મીલી ૧૫ લીટર પાણીમાં ભેળવી જરૂરીયાત મુજબ છંટકાવ કરવો.



૪૩

- સુકારો:** વાવેતર ના ૧૫-૨૦ દિવસ પછી ટ્રાયકોડર્માં ફૂગનાશક પાવડર ૫-૬ કિગ્રા/હેક્ટરે જમીનમાં આપવું જેથી જમીનજન્ય રોગોથી થતું નુકસાન અટકાવી શકાય છે.



- પિયત:** સુકારો અને ફૂગના રોગને રોકવા માટે વધુ પિયત ન કરો. જમીનની પરત મુજબ માત્રાને માત્ર ૩-૪ પિયત જ આપવા..

- કાળી ચરમી:** જરૂના પાકમાં જાકળ વધુ પ્રમાણમાં આવે તો પિયત મુલતવી રાખવું. તેમજ કાળી ચરમી અને રાખોડીનો ઉપદ્રવ થાય નહિ તે માટે હેકાકોનોઝોલ ૨૫ મિલી દવા ૧ પંચપમાં નાખીને છંટકાવ કરવો.



- ભૂકીછારો:** ભૂકીછારા રોગના નિયંત્રણ માટે વહેલી સવારે ૩૦૦ મૈશનો ગંધક પાવડર હેક્ટરે ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. અથવા પ્રોપીકોનેઝોલ અથવા હેકાકોનેઝોલ ૧૦ મી.લી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.



ધાળા

- સુકારો:** વાવેતર ના ૧૫-૨૦ દિવસ પછી ટ્રાયકોડર્માં ફૂગનાશક પાવડર ૫-૬ કિગ્રા/હેક્ટરે જમીનમાં આપવું જેથી જમીનજન્ય રોગોથી થતું નુકસાન અટકાવી શકાય છે.



- પિયત:** સુકારો અને ફૂગના રોગને રોકવા માટે વધુ પિયત ન કરો.

	<ul style="list-style-type: none"> મોલો: મોલોના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૨૦ મિલી અથવાઈમીડાક્લોપ્રીડ ત મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
લસાળ	<ul style="list-style-type: none"> ચુસીયા પ્રકારની જીવાત: ચુસીયા પ્રકારની જીવાત ના નીયંત્રણ માટે ફોસ્ફોરિટ ૧૫ મિલી અથવા મીથાઈલ-ઓ-ટેમેટોન ૧૫ મિલી દવાને ૧૫ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા.  <ul style="list-style-type: none"> પીળા પાન: પાન પીળા પડતા અટકાવવા મેન્કોઝેબ ૪૦ગ્રામ અથવા હેક્ઝાકોનાઓલ ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં નાખીને છંટકાવ કરવો.  <ul style="list-style-type: none"> પૂર્તિ ખાતર: લસાળના પાકમાં વાવેતર બાદ ૩૦-૩૫ દિવસે પર કી.ગ્રા. યુરીયા ખાતર આપવું.
દુંગળી	<ul style="list-style-type: none"> ચુસીયા પ્રકારની જીવાત: ચુસીયા પ્રકારની જીવાત ના નીયંત્રણ માટે ફોસ્ફોરિટ ૧૫ મિલી અથવા મીથાઈલ-ઓ-ટેમેટોન ૧૫ મિલી દવાને ૧૫ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા. અંબલી ધાબાનો રોગ: દુંગળીમાં અંબલી ધાબાનો રોગ લાગે નહિ તે માટે પ્રોપીકોનાઓલ, મેન્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અને કાર્બેન્ડાજીમ ૧૫ ગ્રામ ૧ પંપમાં વારા ફરતી કોઈપણ એક દવા નાખીને ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવા. 
કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> વીણી: સમયસર વીણી હાથ ધરવી. છેલ્લી વીણી પછી બકરા, ઘટાં ચરાવવા જેથી ખુલ્યા વગરના ગુલાબી ઈયળના નુકસાન વાળા જીવા અને અન્ય કચરો નાશ પામે. ત્યારબાદ કરાંઢી સળગાવવી નહિ પરંતુ રોટાવેટર અથવા મોભાઈલ ચોપરથી નાના ટુકડા કરી જમીનમાંદાઠી દેવા જેથી જમીનમાં સેન્ટ્રીય તત્વનો ઉમેરો થવાથી સૂક્ષ્મ જીવોની સંખ્યા વધશે અને જમીનના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. અથવા કરાંઢી ભેગી કરી શ્રેડરથીનાનાટુકડા કરીને છાળું, યુરીયા, કમ્પોસ્ટ કલ્ચર ઉમેરી દેશી(સેન્ટ્રીય) ખાતર બનાવવું. પાક નિષ્ફળ ગયેલ હોય તો શિયાળું પાકના વાવેતરનું આપોજન કરવું.
દિવેલા	<ul style="list-style-type: none"> ધોડિયા ઈયળ અથવા લીલી ઈયળ: ધોડિયા ઈયળ અથવા લીલી ઈયળ ના નિયંત્રણ માટે ડાયક્લોરોવોસ ૭૬ ઈસી ૧૦ મિલી અથવા મિથાઈલ ઓ-ટેમેટોન ૨૫ ઈસી ૧૫ મિલી ૧૫ લીટર પાણીમાં નાખીને વરાપે છંટકાવ કરવો. 
તુવેર	<ul style="list-style-type: none"> ચુસીયા પ્રકારની જીવાતો: તુવેરના પાકમાં ૫૦% કુલ બેસવાની અવસ્થાયે ચુસીયા જીવાતના નિયંત્રણ માટે ૧૫ મિલી પોલીરીન અથવા ૨૦ ગ્રામ એસીફ્રિટ અથવા ૫ મિલી ઈન્ડોક્ષાકાર્બ અથવા ૨૫ મિલી પ્રોફેનોફોસ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં લેળવી છંટકાવ કરવો.

- **શીગ માખી અને શીગ કોરી ખાનાર ઈયળ:** તુવેશમાં શીગ માખીનો વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો કવીનાલફ્કોસ અથવા પ્રોફેનોફ્લોસ ૨૦ મી.લી. પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. શીગ કોરી ખાનાર ઈયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો સ્પીનોસાડ ૪ મી.લી. અથવા એમામેક્ટીન બેન્જોએટ ૭ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.



- **પિયત:** ફૂલ અવસ્થાએ અને શીગો ભરાવવાની અવસ્થાએ પાણીની ખેચ ના પડે તેમ પિયત આપવું.

શાકભાજુ પાકો

- રોગીષ છોડને ખેતરમાંથી ઉપાડિને જમીનમાં દાટી દેવા જોઈએ.
- શાકભાજુ પાકોને નિંદણ મુક્ત રાખવા જોઈએ.
- **પાન કોરીયુ:** વેલાવળા શાકભાજુ પાકમાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવટાળવા માટે ૧૫ મીલી મીથાઈલ-ઓ-ટેમેટોન (૨૫૮૮૩) અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ (૩૦ ઈસ્સી) ૧૫ લીટરપાણીના પંપમાં નાખીને વરાપે છંટકાવ કરવો.



- **શ્રીપ્સ:** મરચીના પાકમાં શ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ૩૦ મીલીપ્રોફેનોફ્લોસ ૧૫ લીટરપાણીમાં મિશ્રણ કરી છાંટવી. શ્રીપ્સનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાડ અથવા સ્પીનેટોરમ દવાઓ-૮મીલી પ્રતિ પંપ વરાપે છાંટવી.



- **ફળમાખી:** ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે એસીટામીપ્રીડ ૨૦ ટકા ૧૫ ગ્રામ દવા ૧૫ લીટર પાણીમાં ભેળવી વરાપે છંટકાવ કરવો.



- **લીલી ઈયળ:** ટામેટોના પાકમાં લીલી ઈયળનો ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે છે તેના નીયંત્રણ માટે ઈન્ટોક્ઝાકાર્બ ૨૫ ઈસી ૩૦ મીલી અથવા સ્પીનોસાડ ૪૫ ઈસી પ મિલી પ્રતિ પંપ વરાપે છાંટવી.

- રીગણના પાકમાં જો ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો રીનાક્ષીપાયર ૧૮.૫ એસ.સી દવા પ મીલી ૧૫ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છંટકાવ કરવો.



	<ul style="list-style-type: none"> પાનકથીરી: શાકભાજી પાકોમાં પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો ફેનાઝાકવિન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિલી અથવા ડાયફેન્યુરોન ૫૦ ડબલ્યુ પી ૧૫ ગ્રામ ૧૫ લીટર પાણીમાં પંપમાં નાખીને વરાપે છંટકાવ કરવો.
પશુ	<ul style="list-style-type: none"> તાપમાનમાં અચાનક ઘટાડો થતાં પ્રાણીઓને બચાવવા માટે, રાત્રે પ્રાણીઓને ઢંકાયેલ શેડ / વિસ્તારમાં રાખો. યોગ્ય માત્રામાં આવશ્યક ક્ષાર / ખનિજ મિશ્રાણ ચારા સાથે બેળવીને પ્રાણીઓને આપવું આવશ્યક છે. પશુઓના રહેઠાણની જગ્યાની વ્યવસ્થિત સફાઈ રાખવી અને માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા હિનાઈલ છાંટવું અથવા લીમડાનાં પાનનો ધૂમાડો કરવો. પશુને દ થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને પ્રતિ લીટર દુધની ઊપજ હોય તેમને નિયમિત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્ત્વોનું મિશ્રાણ આપવું. ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેવટામેશ્રીન અથવા એમીટ્રાલ ૨ મી.લી. એક લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી.

જમનગર જલ્લીનાં તાલુકાઓમુજબની હવામાન આધારીત કૃપિ સલાહ માટે વોટસએપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે નીચે આપેલાં નકશામાં તમારાં તાલુકા પર ટચ કરીને તમારાં તાલુકાનાં વોટસએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો.





District Agrometeorological Unit (DAMU)
GraminKrishi Mausam Seva (GKMS)
Krishi Vigyan kendra
Junagadh Agricultural University
Jamnagar-361006
Date: 23-12-2023 to 27-12-2023



Jamnagar District Agromet Advisory Service bulletin No. 101 (2023) Date: 22-12-2023

(Issued jointly by Junagadh Agricultural University and India Meteorological Department)

Significant weather for the preceding week

weather parameter	
Rain fall (mm)	0.0
Maximum temperature (°C)	25.2-27.4
Minimum temperature (°C)	14.4-19.8
Relative Humidity (%)	Morning
	Afternoon
Wind speed (Kmph)	5.7-7.8

Weather forecasting for Jamnagar District

Date	Day-1 23-12-2023	Day-2 24-12-2023	Day-3 25-12-2023	Day-4 26-12-2023	Day-5 27-12-2023
Parameters					
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature (°C)	27	28	29	30	30
Minimum temperature (°C)	20	20	21	21	21
Relative Humidity-I (%)	39	39	40	41	39
Relative Humidity-II (%)	22	25	22	23	25
Wind speed (Km/h)	12	16	17	16	14
Wind Direction (deg.)	NE	NE	NE	NE	NE
Cloud cover (Okta)	Partly cloudy				

Valid 08:30 hrs of 27-12-2023

Note: Above forecast is the average situation of whole district not for one particular place.

Gramin Krishi MausamSeva, Krishi Vigyan Kendra, Jamnagar and Indian meteorological department announce upcoming five days weather forecast of

Jamnagar district have sky will be observed partly cloudy and no chances of rainfall.

Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range 27-30 °C and 20-21 °C, respectively.

Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 39-41 % & 22-25 %,

respectively.

Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NE and 12-17 km/h, respectively.

General Advice

- Due to cloudy weather, pest infestation may increase in Rabi crops, so monitor the crops, if infestation is above ETL then take control measures as per advisory given.
- Protect the animals in shade at night time due to cold waves.
- Over irrigation increase pest and diseases in crops, so apply irrigation as per requirement.
- Apply spray of profenophos 20 ml or spinosad 3 ml mix in 10 liter of water for the control of thrips in vegetable crops by 10 to 15 days of interval.
- Apply the supplementary dose of fertilizer in all Rabi crop with or after irrigation. Interculturing in chick pea crop to prevent the weed growth and better development. If pest-disease infestation is observed, then apply the related control measures.
- To control aphid infestation in chickpea and coriander to spray thiamethoxam 5 gm/ 10 liter of water.
- If there is a high infestation of pests and difficult to control or timely picked of cotton then sowing of demanded vegetable crop for get more benefit as soon as possible. Instead of burning cotton stalks, use of cotton shredder to make compost of it.

Crop wise Advisory

Wheat

- **Termite:** Application of Chlorpyriphos (20 EC) @ 5 litres per hectare with irrigation in the fields having perennial problem of termite infestation.



- **Irrigation:** Irrigate crop at CRI stage without stress. Apply 130 kg urea/ha at crown root initiation.
- **Rodent:** If rodent attack seen in wheat crop, make the food availability with poison like Zinc phosphide, Barium carbonate and Red squill.
- **Leaf blight and rust:** To control leaf blight and rust in wheat, at the beginning of the disease Apply a spray of Mancozeb 75 WP 40 gm in 15 litres of water twice at 15 days of interval.



Chick pea

- **Wilt:** After sowing 15-20 days apply tricoderma fungicide 5-6 kg/ha to prevent the wilt related disease in cumin.



- **Irrigation:** Apply irrigation at Vegetative and branching stage. After interculturing 3rd irrigation should be given.
- **Heliothis:** If incidence of Heliothis cross ETL, spray Quinalphos 25 EC 20 ml in 10 litres of water.



- **Stunt virus:** As the disease is spread through aphid, systemic insecticide like Methyl-O-dimeton @18 ml Or dimethoate @ 15 ml Mix in 15 liters of water and spray as required.



Cumin


- **Wilt:** After sowing 15-20 days apply tricoderma fungicide 5-6 kg/ha to prevent the wilt related disease in cumin.



- **Irrigation:** Do not over irrigate to prevent wilt and fungal disease. Apply only 3-4 irrigation on the basis of soil type.
- **Alternaria blight:** Postponed the irrigation in cumin crop in case of dew. Apply Hexaconazole 25 ml/pump for the Alternaria blight and wilt control.



- **powdery mildew:** Apply spray of Propiconazole @ 10 ml/10 liter in water or Hexaconazole or Supher @ 15-20 kg/ha for control of powdery mildew.



Coriander	<ul style="list-style-type: none"> Wilt: After sowing 15-20 days apply tricoderma fungicide 5-6 kg/ha to prevent the wilt related disease in cumin.  <ul style="list-style-type: none"> Irrigation: Do not over irrigate to prevent wilt and fungal disease. Aphid: Spray Diamethoate 20 ml or Imidacloprid 3 ml in 10 liters of water.
Garlic	<ul style="list-style-type: none"> Sucking pest: For the control of thrips, spray Phoshamidon 5 ml or Dimethoate 15 ml or Methay-o- Demeton 15 ml in 15 liter of water at 15 days interval.  <ul style="list-style-type: none"> Leaf blight: Carry out spraying of Mencozeb 75 % WP 40 gm/10 lit or hexaconazole 15ml/10 lit of water to prevent leaf blight disease in garlic crop.  <ul style="list-style-type: none"> Supplementary dose Fertilizer: Apply supplementary dose of nitrogen as urea @ 54 kg/ha at 30-35 days after sowing in garlic.
Onion	<ul style="list-style-type: none"> Sucking pest: For the control of thrips, spray Phoshamidon 5 ml or Dimethoate 15 ml or Methay-o- Demeton 15 ml in 15 liter of water at 15 days interval. purple blotch: For the control of purple blotch blight and fusarium wilt disease in onion make 3 alternate sprays of Mancozeb 40 gm and Carbendazim 15 gm in 15 litres of water. 
Cotton	<ul style="list-style-type: none"> Picking & pulling of cotton stalk: Carry out picking in time. Animals like goats,sheep among others, should be allowed to graze on unopened bolls and plant debris in the cotton fields after the last picking to prevent infestation in subsequent year. After grazing,don't burn cotton stalk but do in-situ chopping & burying of cotton stalk in soil by mobile chopper and rotavator to improve soil biomass and health.

	<ul style="list-style-type: none"> If crop is fail/ dry then planning for other crop sowing like Rabi crop.
Castor	<ul style="list-style-type: none"> semi looper and spodoptera: For the control of semi looper and spodoptera spray dichlorovos 76 EC 10 ml or methyl o demeton 25 EC 15 ml mix in 15 liter water and spray alternate in clear weather condition. 
Red gram	<ul style="list-style-type: none"> Sucking pest: For the control of sucking pest at 50 % flowering, spray 15 ml politrin OR 20 gm acephate OR 50 ml endoxacarb OR 25 ml profenophos in 10 liter of water. Pod fly and Pod borer: Monitor the crop for infestation of pod fly and pod borers due to cloudy weather if infestation observed spray quinalphos or profenofos 20 ml/10 liter of water for control of pod fly and Spinosad 4 ml or emamectin benzoate 7 gm/10 liter of water for the control of pod borer complex. 
Vegetables	<ul style="list-style-type: none"> Infected plants should be uprooted and buried in the soil. Keep vegetable crop weed free. leaf Webber: For the control of leaf Webber in fruit leafy vegetable spray 15 ml methyl-O-demeton (25 EC) Or 10 ml diamethoate (30 EC) in 15 liter of water in clear weather condition. 
	<ul style="list-style-type: none"> Thrips in chilli: For the control of thrips in chilli, spray 30 ml profenophos in 15 litres of water. In case of heavy attack make spray of spinosad or spinetoram 7-8 ml per 15 liter of water in clear weather condition. 
	<ul style="list-style-type: none"> Fruit fly: For the control of Fruit fly spray acetamiprid 20 % 15 gm per 15 liter water pump in clear weather condition.



- **Fruit borer:** In brinjal and tomato crops control of fruit borer, spray reenaxipayar @ 5 ml in 15 lit of water. In tomato crops control of fruit borer, spray indoxacarb 25 EC 30 ml or spinosad 45 EC 5 ml per pump mix in water and spray in clear weather condition.



- **Mite:** If mite infestation observe in vegetable then spray fenazaquin 10 EC 10 ml or diafenuron 50 WP 15 gm per 15 liter water pump and carried out alternate spray in clear weather condition.



- **Whitefly & jassids in Okra:** For control of whitefly & jassids in Okra, spray 500 ml of 5 % neem seed extract or 50 ml neem oil or acephate 75 % SP@ 15 gm or imidacloprid 17.8 SL 3 ml/10 liter of water in clear weather condition.

Animals

- To protect animals from sudden drop in temperature, keep the animals in a covered shed/ area during the night.
- Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes.
- Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield.
- Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick.