



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा  
हवामान आगाही आधारित कृषि सलाह ब्रुवेटीन  
उत्तर सौराष्ट्र भेतआबोहवाकीय विभाग  
जुनागढ कृषि युनीवर्सिटी, तरघडिया-3६००२3  
मो.नं. ८४२६८3८२3५



ता.२८-0१-२०२3 थी ता.0१-0२-२०२3



(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, सूकीभेती संशोधन केन्द्र, जु.कृ.यु.,तरघडिया अने भारत मौसम विभाग द्वारा संपन्न)  
गुजरातना उत्तर सौराष्ट्रना जिल्वाओनुं कृषि हवामान ब्रुवेटीन नं. ८७/२०२२

पाछवा अहवाडीयानुं राजकोटनुं हवामान

हवामान परिबणी	
वरसाह(मी.मी)	0.0-0.0
महतम तापमान(से.ग्रे)	22.8-24.5
वधुतम तापमान(से.ग्रे)	6.3-8.1
भेज (%)सवार	37-71
भेज (%)बपोरबाह	19-34
पवननीगति (किमी/कलाक)	5.0-6.7

हवामान आगाही :पत्रक-क

उत्तर सौराष्ट्र भेतआबोहवाकीय विभाग-हवामान आगाही ०१-०२-२०२3 सवारना ८.3० सुधी

ता.२८-०१-२०२3 थी ०१-०२-२०२3

कृषिसलाह :

- ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા વિભાગ ,જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ,તરઘડીયા તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે ,ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

રાજકોટ :

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૨૮-૦૧-૨૦૨૩	૨૯-૦૧-૨૦૨૩	૩૦-૦૧-૨૦૨૩	૩૧-૦૧-૨૦૨૩	૦૧-૦૨-૨૦૨૩
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	27	28	27	27	28
લઘુત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	13	13	10	10	12
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	45	42	45	30	48
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	33	28	18	11	17
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	22	14	16	19	23
પવનની દિશા(ડીગ્રી)	36	340	338	25	58
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	0	0	0	0	0

- રાજકોટ જીલ્લામાં આગામી તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૩ થી તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૩ દરમિયાન સૂકુ, ઠંડુ અને યોખ્ખું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૨૭-૨૮ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમિયાન ૧૦-૧૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૩૦-૪૮ અને ૧૧-૩૩ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન અને ઉત્તરની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૪ થી ૨૩ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે

મોરબી:

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૨૮-૦૧-૨૦૨૩	૨૯-૦૧-૨૦૨૩	૩૦-૦૧-૨૦૨૩	૩૧-૦૧-૨૦૨૩	૦૧-૦૨-૨૦૨૩
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	27	28	27	27	28
લઘુત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	13	13	10	10	12
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	45	47	44	36	49
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	32	31	18	12	18
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	22	15	15	19	22
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	32	340	338	28	45
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	0	0	0	0	0

- મોરબી જીલ્લામાં આગામી તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૩ થી તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૩ દરમિયાન સૂકુ, ઠંડુ અને યોખ્ખું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૨૭-૨૮ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ

તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૦-૧૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.

- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૩૬-૪૯ અને ૧૨-૩૨ ટકા રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન અને ઉતરની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૫ થી ૨૨ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે

#### દેવભૂમિદ્વારકા;

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૨૮-૦૧-૨૦૨૩	૨૯-૦૧-૨૦૨૩	૩૦-૦૧-૨૦૨૩	૩૧-૦૧-૨૦૨૩	૦૧-૦૨-૨૦૨૩
વરસાદ(મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	૨૫	૨૬	૨૫	૨૬	૨૭
લઘુત્તમ તાપમાન( સે.ગ્રે)	૧૫	૧૫	૧૪	૧૫	૧૬
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	૪૮	૪૬	૭૩	૪૬	૫૨
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૩૮	૩૯	૨૩	૨૩	૨૫
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	૨૮	૨૦	૨૦	૨૧	૨૯
પવનનીદિશા (ડીગ્રી)	૨૨	૩૪૫	૩૩૩	૨૪	૩૨
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૦	૦	૦	૦	૦

- દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં આગામી તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૩ થી તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૩ દરમ્યાન સૂકું, ઠંડું અને યોષ્ઠું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૫-૨૭ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૪-૧૬ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૪૬-૭૩ અને ૨૩-૩૯ રહેશે.
- પવનની દિશા ઉતર, વાયવ્ય અને ઈશાનની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૨૦ થી ૨૯ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

#### સુરેન્દ્રનગર :

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૨૮-૦૧-૨૦૨૩	૨૯-૦૧-૨૦૨૩	૩૦-૦૧-૨૦૨૩	૩૧-૦૧-૨૦૨૩	૦૧-૦૨-૨૦૨૩
વરસાદ (મી.મી.)	૦	૦	૦	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	૨૭	૨૮	૨૭	૨૭	૨૮
લઘુત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	૧૩	૧૩	૧૦	૧૦	૧૨
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	૪૮	૪૮	૩૪	૩૩	૫૦
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	૩૫	૩૩	૨૬	૧૬	૨૧
પવનની ગતિ( કિમી/કલાક)	૨૦	૧૪	૧૭	૧૯	૨૧
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૪૫	૩૦૦	૩૨૪	૨૨	૫૮
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	૦	૦	૦	૦	૦

- સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૩ થી તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૩ દરમ્યાન સૂકું, ઠંડું અને ચોખ્ખું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૭-૨૮ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૦-૧૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૩૩-૫૦ અને ૧૬-૩૫ રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન, વાયવ્ય અને ઉતરની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૪-૨૧ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

#### અમરેલી :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૮-૦૧-૨૦૨૩	દિવસ-૨ ૨૯-૦૧-૨૦૨૩	દિવસ-૩ ૩૦-૦૧-૨૦૨૩	દિવસ-૪ ૩૧-૦૧-૨૦૨૩	દિવસ-૫ ૦૧-૦૨-૨૦૨૩
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	27	29	27	26	26
લઘુત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	13	13	10	10	13
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	51	48	29	28	49
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	36	27	19	12	21
પવનની ગતિ( કિમી/કલાક)	17	13	15	19	23
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	73	341	332	25	45
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	0	0	0	0	1

- અમરેલી જીલ્લામાં આગામી તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૩ થી તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૩ દરમ્યાન સૂકું, ઠંડું અને ચોખ્ખું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૬-૨૯ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૦-૧૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૨૮-૫૧ અને ૧૨-૩૬ રહેશે.
- પવનની દિશા પૂર્વ, ઉતર, વાયવ્ય અને ઈશાનની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૩ થી ૨૩ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

#### જામનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૨૮-૦૧-૨૦૨૩	દિવસ-૨ ૨૯-૦૧-૨૦૨૩	દિવસ-૩ ૩૦-૦૧-૨૦૨૩	દિવસ-૪ ૩૧-૦૧-૨૦૨૩	દિવસ-૫ ૦૧-૦૨-૨૦૨૩
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	24	26	24	23	23
લઘુત્તમ તાપમાન ( સે.ગ્રે)	16	16	13	13	15
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	43	44	59	38	49




લઘુતમ ભેજ (%) બપોરબાદ	35	35	21	18	20
પવનની ગતિ( કિમી/કલાક)	26	19	17	21	26
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	24	342	338	22	32
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	0	0	0	0	0






- જામનગર જીલ્લામા આગામી તા.૨૮-૦૧-૨૦૨૩ થી તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૩ દરમ્યાન સૂકુ, ઠંડુ અને યોખ્ખું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.
- આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમ્યાન ૨૩-૨૬ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૩-૧૬ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે.
- આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુતમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૩૮-૫૯ અને ૧૮-૩૫ રહેશે.
- પવનની દિશા ઈશાન અને ઉતરની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૧૭ થી ૨૬ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.

તા.૨૮ જાન્યુઆરી થી ૦૧-ફેબ્રુઆરી શીત/હિમ લહેર પડવાની શક્યતા હોવાથી





- ઉનના ગરમ કપડા પહેરવા.
- હુંફાળું ગરમ પાણી અને ગરમ પીણું ચા-કોફી પીવા.
- માથું, નાક, કાન, ગળું, હાથ અને પગ વ્યવસ્થિત રીતે ગરમ કપડાથી ઢાકવા
- બાળકો અને વૃદ્ધોને ઘરની અંદર રહેવા જણાવવું .
- ઘર વિહોણા નાગરિકોને સલામત રહેઠાણ અને ગરમ વસ્ત્રોની વ્યવસ્થા કરવી.
- શીત લહેરના કારણે શિયાળુ પાકોમાં હિમની અસર ના થાય તે માટે સાંજના સમયે પિયત આપવું અને આવરણ કરવું.
- હાલની હવામાન પરિસ્થિતિમાં લસણ, ડુંગળી, જીરૂ અને ધાણા ના પાકમાં થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મિલી ૧૫ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.
- ઉનાળુ મગફળી, તલ, મગ, અડદ અને શાકભાજીના વાવેતર માટે ખાલી થયેલ જમીન ખેડીને તૈયાર કરવી અને પસંદગીના પાકનું સારી જાતનું પ્રમાણિત બિયારણ મેળવી લેવું.
- તા. ૦૧ થી ૦૬-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૩: હવામાન આગોતરો વરતારો : તા. ૦૧ થી ૦૬-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૩ દરમ્યાન સૂકુ, ઠંડુ અને યોખ્ખું હવામાન રહેવાની સંભાવના છે.
- હવામાન ચેતવણી : સૂકુ, ઠંડુ અને હિમ પડવાની સંભાવના છે.  
મોબાઈલ સંદેશ : જીરૂ અને ધાણામાં ચરમી અને રાખોડીનો ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે ડાયથેન એમ ૪૫, ૨૭ ગ્રામ અને હેકઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી દવા વારાફરતી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને ૧૫ દિવસના અન્તરે છંટકાવ કરવો.

મુખ્યપાક	પાકઅવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિસલાહ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી )
----------	-----------	---------------	--




<p><b>લસણ</b></p>	<p>વૃદ્ધિ/વિકાસ</p> 	<p>પાનનો સુકારો પીળિયો</p> <p>શ્રીપ્સ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગ આવે નહિ તે માટે વધુ પડતું પિયત આપવું નહિ.</li> <li>• લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગના નિયંત્રણ માટે એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન ૧૧.૪ ટકા + ટેબ્યુકોનાઝોલ ૧૮.૩ ટકા એસ.સી. ૧૦ મીલી/૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છાન્ટવી.</li> <li>• શ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મિલી અથવા લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૧૪ મિલી દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વારાફરતી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
<p><b>ચણા</b></p>	<p>ફૂલ/પોપટા બંધાવા/પોપટામાં દાણા ભરાવવા</p>	<p>લીલી/લશ્કરી ઈયળ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ચણાના પાકને ફૂલ અને પોપટા બંધાવવાની અવસ્થાએ પિયત આપવું.</li> <li>• ચણાના પાકમાં લીલી અને લશ્કરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે પક્ષીઓને બેસવા માટે 'T' આકારના બેલાખડા મુકવા. જો વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો સ્પીનોસાઇ ૪૫ એસ.સી ૪ મિલી અથવા ઇન્ડોક્ઝાકાર્બ ૭ મિલિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. તેમજ લીબોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં કરીને છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
<p><b>રાયડો</b></p>	<p>ફૂલ/શીંગ બેસવી/ દાણા ભરાવવા</p>	<p>મોલો, શ્રીપ્સ</p> <p>ભૂકી છારો અને સફેદ ગેરુ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• યુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોક્ઝામ ૨૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>• રાયડામાં ભૂકીછારો/રાખોડી અને તળછારોના નિયંત્રણ માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંકાવ કરવો.</li> </ul>
<p><b>ધાણા</b></p>	<p>ફૂલ /બીજ બંધાવવા</p>	<p>મોલો, શ્રીપ્સ</p> <p>રાખોડી/ભૂકી છારો</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• યુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોક્ઝામ ૨૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીબોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>• ધાણાના પાકમાં ભૂકીછારો/રાખોડી અને કાળી ચરમી નો</li> </ul>



		અને કાળી ચરમી	<p>ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે હેકઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ધાણાનો વધુ પડતો વાનસ્પતિક વિકાસ ના થાય તે માટે પિયત નિયંત્રિત આપવું.</li> </ul>
જીરું	ફૂલ /બીજ બંધાવવા	યુસિયા જીવાતો  ચરમી અને રાખોડી	<ul style="list-style-type: none"> <li>• યુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૧૪ મિલી દવા સાથે લીંબોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> <li>• તેમજ ચરમી અને રાખોડીનો ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે ડાયથેન એમ ૪૫, ૨૭ ગ્રામ અને હેકઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી દવા વારાફરતી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને ૧૫ દિવસના અન્તરે છંટકાવ કરવો.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
ઘઉં	નીઘલ/ફૂલ/દુધિયા દાણા અવસ્થા	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ફૂલ અવસ્થાએ પિયત આપવું.</li> <li>• ઘઉંમાં ગેરુના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૭૫ ટકા વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
કપાસ	કપાસની વીણી અને સાંઠી કાઢવી	ગુલાબી ઇયળ	<p>➤ છેલ્લી વીણી પછી ઘેટા બકરા ચરાવવા. જેથી ખુલ્યા વગરના ગુલાબી ઇયળના નુકશાનવાળા જીંડવા અને અન્ય કચરો નાશ પામે. ત્યારબાદ કરાંઠી સળગાવવી નહિ પરંતુ રોટાવેટર / મોબાઇલ ચોપરથી નાના ટુકડા કરી જમીનમાં દાંટી દેવા જેથી જમીન સેન્દ્રિય તત્વનો ઉમેરો થવાથી સુંક્ષ્મ જીવોની સંખ્યા વધશે અને જમીનના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. અથવા કરાંઠી ભેગી કરી શ્રેડરથી નાના ટુકડા કરીને છાણ, યુરીયા, કમ્પોસ્ટ કલ્ચર ઉમેરી દેશી (સેન્દ્રિય) ખાતર બનાવવું.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>
તુવેર	તુવેર	શીંગ પરિપક્વતા	• -
દિવેલા	દિવેલા	ડોડવા અવસ્થા	• -



ડુંગળી ચોમાસું	ફેર ચોપણી/વૃદ્ધિ	થ્રીપ્સ	ડુંગળીના પાકમાં થ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો
રીંગણી	કુલ/ફળ	સફેદ માખી  ડુંખ અને→ ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ  પાન કથીરી	<p>➤ રીંગણીમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને ડાયફેન્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી ૨૫ મિ.લી. દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</p> <p>➤ ફળ અને ડોકાની ઇયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં દાંટી દેવા અને ક્લોરાનટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</p> <p>• રીંગણમાં જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૫૦ ટકા ઇસી ૧૫ મિલી અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઇ.સી. ૧૫ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.</p>
મરચી	વૃદ્ધિ/કુલ/ફળ	થ્રીપ્સ, સફેદ માખી  કાલવણ →  વાયરસથી થતો પાનનો કોક્કવા  	<p>પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અને લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીબોળીના મીજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મિલી ૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. થ્રીપ્સનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાદ અથવા સ્પીનેટોરમ દવા ૫ મિલી. પ્રતિ પંપ છાંટવી.</p> <p>➤ કાલવણ રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ દિવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવા.</p> <p>વાયરસના કારણે પીળા થઈ કુકડાય ગયેલ છોડ ઉપાડી તેનો જમીનમાં દાટી નાશ કરવો. તે સફેદ માખીથી ફેલાતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે હોસ્ટાથીયોન દવા ૨૦ મી.લી./૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</p>



લીંબુ	-	<p>પાન કથીરી</p>  <p>સાયલા અને શ્રીપ્સ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>લીંબુના બગીચામાં પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ વધુ હોય તો તેના નિયંત્રણ માટે પ્રોપરગાઈટ દવા ૧૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>તેના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી અને લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> </ul>
આંબો	ફૂલ	<p>બદામી ટપકાં</p> <p>પાનકોરીયુ</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>બદામી ટપકાના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ ૪૦ ગ્રામ અને ૧.૫ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીન/૧૦ લીટર પાણીમાં બે છંટકાવ ૧૫ દિવસના ગળે કરવા.</li> <li>પાનકોરીયુના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છાંટવી.</li> </ul> <p>મધીયો અને મગીયાની ઈયળ</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>આંબામાં મધીયો અને મગીયાની ઈયળના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</li> <li>આંબામાં ભુકીછારો/રાખોડી નિયંત્રણ માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ ૧૫</li> </ul>

			<p><b>મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>કેરી લખોટી જેવડા કદની થાય ત્યારે ૨ ગ્રામ નેપ્થેલીન એસેટીક એસીડ અને ૨ કી.ગ્રામ યુરીયાને ૧૦૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો જેથી કેરીનું ખરણ ઓછું થાય.</li> </ul>
<p>પશુ/ મરઘા</p> 	<p>પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી. ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટ્રાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. કરમિયાની દવા આપવી તથા ઉછરતા પશુઓમાં બૃસેલ્વા કાફવુંડનું રસીકરણ કરાવવું. નાના પશુઓને રાત્રી દરમ્યાન ઠંડીથી બચાવવા શેડમાં રાખવા. પશુને ૬ થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને પ્રતિ લીટર દુધની ઊપજ હોય તેમને નિયમિત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્ત્વોનું મિશ્રણ આપવું.તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફીનાઈલ છાંટવું.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>પશુઓને ગરમ હુંફાળું પીવાનું પાણી આપવું.</li> <li>નાના પશુઓને રાત્રી દરમ્યાન ઠંડીથી બચાવવા શેડમાં રાખવા.</li> </ul> <p>મરઘા ઘરમાં જરૂરી હવા ઉજાસ રાખી દીવાલ પર કંતાન અથવા પ્લાસ્ટીક કપડું બાંધવું. તેમજ ઇલેક્ટ્રીક બલ્બ ચાલુ રાખવા.</p>		
નોંધ	<p><b>નીચેની એપ ડાઉનલોડ કરો</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>મૌસમ એપ</b> જીલ્લા પ્રમાણે હવામાન આગાહી અને ચેતવણી માટે.</li> <li><b>મેઘદ્રૂત એપ</b> હવામાન આધારિત કૃષિસલાહ બુલેટીન માટે.</li> <li><b>દામીની એપ</b> વરસાદી વીજળીની ચેતવણી માટે.</li> </ul>		

જા.નં.જુક્યુ/સૂ.ખે./એગ્રોમેટ/બુલેટીન/ / ૨૦૨૩,  
તરઘડિયા(રાજકોટ), તારીખ: ૨૭/૦૧/૨૦૨૩.

તંત્રીશ્રી/ડાયરેક્ટરશ્રી,  
રાજકોટ,

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં ,રેડીયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ધ કરાવવા નમ્ર વિનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

ટેકનીકલ ઓફિસર  
સુકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર  
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી  
તરઘડિયા



**Gramin Krushi Mausam Seva**  
**Main Dry Farming Research Station**  
**Junagadh Agricultural University**  
**AMFU-Targhadia (Rajkot) - 360 023**  
**Cell :94269 38235**



**Agromet Advisory Service bulletin No. 87 for North Saurashtradistricts(Gujarat)**

**(Issued jointly by AMFU-DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)**

**(Period for 28-January to 01-February-2023)**

**Significant past weather for the preceding week of Rajkot**

Rainfall (mm)	0.0-0.0
Maximum temperature (°C )	22.8-24.5
Minimum temperature (°C )	6.3-8.1
Relative Humidity (%) I	37-71
Relative Humidity (%) II	19-34
Wind speed (Kmph)	5.0-6.7

**Weather forecast until 08-30 hrs. of 01/02/2023**

**(1) RAJKOT DISTRICT:**

	28/01/2023	29/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	27	28	27	27	28
Min.Temp.(°C)	13	13	10	10	12
RH-I (%)	45	42	45	30	48
RH-II (%)	33	28	18	11	17
Wind Speed (kmph)	22	14	16	19	23
Wind Direction(deg.)	36	340	338	25	58
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **General weather:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Rainfall :** Not forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 27-28°C and 10-13, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 30-48 % & 11-33,

respectively.

- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, N and 14-23 km/h, respectively.

## (2) MORBI DISTRICT:

	28/01/2023	29/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	27	28	27	27	28
Min.Temp.(°C)	13	13	10	10	12
RH-I (%)	45	47	44	36	49
RH-II (%)	32	31	18	12	18
Wind Speed (kmph)	22	15	15	19	22
Wind Direction(deg.)	32	340	338	28	45
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **General weather:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Rainfall :** Not forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 27-28°C and 10-13°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 36-49 % & 12-32, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, N and 15-22 km/h, respectively.

## (3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT:

	28/01/2023	29/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	25	26	25	26	27
Min.Temp.(°C)	15	15	14	15	16
RH-I (%)	48	46	73	46	52
RH-II (%)	38	39	23	23	25
Wind Speed (kmph)	28	20	20	21	29
Wind Direction(deg.)	22	345	333	24	32
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **General weather:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Rainfall :** Not forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 25-27°C and 14-16°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 46-73 % & 23-39, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be N, NW, NE and 20-29 km/h, respectively.

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	28/01/2023	29/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	27	28	27	27	28
Min.Temp.(°C)	13	13	10	10	12
RH-I (%)	48	48	34	33	50
RH-II (%)	35	33	26	16	21
Wind Speed (kmph)	20	14	17	19	21
Wind Direction(deg.)	45	300	324	22	58
Total CC (octa)	0	0	0	0	0

- **General weather:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Rainfall :** Not forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 27-28°C and 10-13°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 33-50 % & 16-35, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, NW, N and 14-21 km/h, respectively.

(5) AMRELI DISTRICT:

	28/01/2023	29/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	27	29	27	26	26
Min.Temp.(°C)	13	13	10	10	13
RH-I (%)	51	48	29	28	49
RH-II (%)	36	27	19	12	21
Wind Speed (kmph)	17	13	15	19	23
Wind Direction(deg.)	73	341	332	25	45
Total CC (octa)	0	0	0	0	1

- **General weather:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Rainfall :** Not forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 26-29°C and 10-13°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 28-51 % & 12-36 respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be E, N, NW, NE and 13-23 km/h, respectively.

(6) JAMNAGAR DISTRICT:

	28/01/2023	29/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	01/02/2023
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	24	26	24	23	23
Min.Temp.(°C)	16	16	13	13	15
RH-I (%)	43	44	59	38	49
RH-II (%)	35	35	21	18	20

Wind Speed (kmph)	26	19	17	21	26
Wind Direction(deg.)	24	342	338	22	32
Total CC (octa)	0	0	0	0	0




- **General weather:** Dry, cool and clear weather forecasted for next five days.
- **Rainfall :** Not forecasted.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 23-26°C and 13-16°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 38-59 % & 18-35, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be NE, N and 17-26 km/h, respectively.




### Agro meteorological Advisories:






<b>General Advice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Due to prevailing cold wave following cares to be taken</b></li> <li>• <b>Wear several layers of loose warm woolen clothing.</b></li> <li>• <b>Drink warm water and hot drinks tea, coffee etc.</b></li> <li>• <b>Cover head, nose, ears, hands and toes as majority of body heat loss occurs through these body parts.</b></li> <li>• <b>Keeps children and elderly people inside home.</b></li> <li>• <b>Provide a comfortable stay with basic facilities for homeless residents.</b></li> <li>• <b>Put up shelters at a strategic potential location for meeting the requirement of shelterless</b></li> <li>• <b>Due to prevailing cold weather apply irrigation during evening hours and do mulching to protect the crops &amp; vegetables from chilling injury.</b></li> <li>• <b>Under prevailing weather condition heavy attack of thrips observed in garlic, onion, cumin and coriander crops. For control of thrips in these crops spray neem seed extract 5% with lambda-cyhalothrin 14 ml in 10 liters of water at 10 days interval..</b></li> <li>• <b>Field preparation by cultivator and harrowing for sowing of summer crops i.e. groundnut, sesame, green gram, black gram and procure good quality seeds.</b></li> <li>• <b>Weather outlook for subsequent week: As per extended range forecast dry, cool and clear weather likely to observe during 01 to 06-February-2023.</b></li> <li>• <b>Alerts &amp; Warning: Cold wave</b></li> </ul>
-----------------------	---






**Sms : Spray Hexaconazole 15 ml/10 liters of water to prevent blight and powdery mildew infestation in cumin & coriander .**

Crops	Stage	Insect/Pest/ Variety	Advisory
<b>Garlic</b>	Growing	Alternaria leaf blight  Thrips  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apply supplementary dose of nitrogen as urea @ 54 kg/ha at 30-35 days after sowing</li> <li>• Apply irrigation as per need. Do not over irrigate to prevent leaf blight (yellowing) disease in garlic.</li> <li>• To prevent blight disease incidence in garlic, Spray Azoxystrobin 11.4 % + Tebuconazole 18.3 % SC 10 ml in 10 liters of water.</li> <li>• <b>For thrips control spray neem seed extract 5% and make alternative sprays of profenofos 20 ml and lambda-cyhalothrin 14 ml in 10 liters of water at 10 days interval.</b></li> <li>•</li> </ul>
<b>Chick pea</b>	Flowering and pod formation-development	Heliothis  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apply irrigation at flowering and pod formation and development stages</li> <li>• <b>“T” shaped bird perches in and around crop field to be installed for natural controlling the insect population.</b></li> <li>• <b>If infestation of Heliothis found above ETL, spray Spinosad 45 SC 4 ml or Indoxacarb 7ml in 10 litres of water.</b></li> </ul>
<b>Mustard</b>	Flowering/ Pod formation/de velopment	Aphid, Thrips  Powdery mildew & white rust  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor the crop for infestation of Aphid, if infestation observe above ETL then carry out spraying of <b>500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water under clear weather.</b></li> <li>• Spray 15 ml <b>hexaconazole</b> in 10 liters of water to prevent powdery mildew and white rust diseases in mustard.</li> <li>• <b>Irrigate mustard crop at flowering and pod formation stages.</b></li> </ul>
<b>Coriander</b>	Flowering/seed formation-development	Aphid/thrips	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>For thrips control in cumin spray neem seed extract 5% and make alternative sprays of profenofos 20 ml and lambda-cyhalothrin 14 ml in 10 liters of water at 10 days interval.</b></li> <li>• <b>To prevent excessive growth apply control irrigation and not to apply excess urea fertilizer</b></li> </ul>

			<p>in coriander.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To prevent powdery mildew disease in coriander spray Hexaconazole 15 ml/10 litre of water.</li> </ul>
<b>Cumin</b>	Flowering/seed formation-development	<p><b>Aphid and thrips</b></p> <p><b>Blight and Powery mildew</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For thrips control spray neem seed extract 5% and make alternative sprays of profenofos 20 ml and lambda-cyhalothrin 14 ml in 10 liters of water at 10 days interval.</li> <li>• Under present weather condition spray Hexaconazole 15 ml/10 liters of water to prevent blight and powdery mildew infestation in cumin.</li> </ul> 
<b>Wheat</b>	Flowering/milking	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apply irrigation as per need.</li> </ul>
<b>Cotton</b>	Plucking & pulling of cotton stalk	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Animals like goats, sheep among others, It should be allowed to graze on unopened bolls and plant debris in the cotton fields after the last picking to prevent infestation of pink ball worm in subsequent year. After grazing, don't burn cotton stalk but do in situ chopping &amp; burying of cotton stalk in soil by mobile chopper and rotavator to improve soil biomass and health.</li> </ul> 
<b>Pigeon pea</b>	Pod Maturity	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harvest the mature pods.</li> </ul>
<b>Castor</b>	Capsule development, maturity	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Give irrigation as per crop need under clear sky.</li> <li>• Harvest mature spike in time to prevent shedding of mature capsule.</li> </ul>
<b>Onion Kharif</b>	Transplanting /growth	Thrips	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infestation of thrips observed in onion. For the control of thrips in onion spray profenofos 20 ml in 10 lit of water.</li> </ul>
<b>Brinjal</b>	Flowering/fruiting	<b>Sucking pest</b> →	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of</li> </ul>

		<p><b>Shoot &amp; Fruit borer</b></p>	<p><b>water under clear weather condition.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In brinjal and tomato crops, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal and tomato crops, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If insect population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml ml/10 litre of water under clear weather condition is advised.</b></li> <li>•</li> </ul>
<b>Chili</b>	Flowering & fruiting	<p><b>Thrips</b> →</p>  <p><b>Anthracnose</b> →</p>  <p><b>Leaf curling Virus</b> →</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Under present weather conditions, severe attack of thrips has been reported. Spray Profenofos 20 ml with 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml in 10 litres of water. In case of heavy attack make spray of spinosad or spinetoram 3 ml per 10 liter of water.</b></li> <li>• For the control of Anthracnose spray <b>Mencozeb 27gm OR Chlorothalonil 27 gram OR Fosetyl 20 gm</b> in 10 liters of water at 15 days interval.</li> <li>• In present weather conditions, rouging of viral infested crop should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of Hostathion 20 ml per 10 litre of water is advised for control the vector white fly.</li> </ul> 
<b>Lemon</b>	Flowering	<p><b>Psylla and thrips</b></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• To prevent damage of psylla &amp; thrips spray <b>imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit of water.</b></li> </ul>

		<p><b>Citrus canker</b></p> <p><b>Leaf minor</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spray copper oxychloride 40 gm or streptocyclin 1.5 gm in 10 litre of water.</b></li> <li>• <b>Spray Imidacloprid 17.8 % SL 5 ml or Quinalphos 20 ml in 10 litres of water for control of leaf minor in lemon.</b></li> </ul>
<b>Mango</b>	Flowering	<p><b>Blossom midge and Leaf hopper</b> →</p>  <p><b>Powdery Mildew</b> →</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To prevent damage of leaf hopper in mango spray <b>imidacloprid 5 ml/10 litres of water</b> under clear sky.</li> <li>• For the control of powdery mildew in mango spray 15 ml <b>Hexaconazole</b> in 10 liters of water to prevent powdery mildew disease.</li> <li>• To prevent dropping of immature fruits in mango spray 2 gm NAA and 2 kg Urea in 100 litres of water.</li> </ul>
<b>Livestock &amp; poultry</b> 	<p>Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. Carry out Brucella and other infectious &amp; reproductive diseases evaluation. Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes.</p> <p>Provide ad lib warm water to lactating animals. <b>Keep young calves indoors during night time to avoid cold stress.</b> Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Provide ad lib warm water to lactating animals. Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In poultry house gunny bags or plastic sheet curtains can be installed on the side walls of shed with require ventilation.</li> <li>• Provision to switch on light bulbs in the laying hen sheds to maintain temperature.</li> </ul>		
<b>Note</b>	<p><b>Kindly download</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MAUSAM App</b> for location specific forecast &amp; warning.</li> <li>• <b>MEGHDOOT App</b> for Agromet advisory.</li> <li>• <b>DAMINI App</b> for lighting warning.</li> </ul>		

**Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia.**

