



ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેતઆબોહવાકીય વિભાગ
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરઘડિયા-૩૬૦૦૨૩
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૫ થી તા.૦૪-૦૧-૨૦૨૬



(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, સૂકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જુ.ક.યુ., તરઘડિયા અને ભારત મૌસમ વિભાગ દ્વારા સંપન્ન)

ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓનું કૃષિ હવામાન બુલેટીન નં. ૭૯/૨૦૨૫

પાછલા અઠવાડિયાનું રાજકોટનું હવામાન

હવામાન પરિબળો	
વરસાદ(મી.મી)	0.0
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	28.4-30.3
લઘુતમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	11.6-14.9
ભેજ (%)સવાર	56-83
ભેજ (%)બપોરબાદ	33-36
પવનનીગતિ (કિમી/કલાક)	1.2-2.5

હવામાન આગાહી :પત્રક-ક

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિભાગ-હવામાન આગાહી ૦૪-૦૧-૨૦૨૬ સવારના ૮.૩૦ સુધી

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૫ થી ૦૪-૦૧-૨૦૨૬

કૃષિસલાહ :

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માહિતી અનુસાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા વિભાગ, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, તરઘડિયા તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના

રાજકોટ :

તારીખ	દિવસ-૧	દિવસ-૨	દિવસ-૩	દિવસ-૪	દિવસ-૫
પેરામીટર	૩૧-૧૨-૨૦૨૫	૦૧-૦૧-૨૦૨૬	૦૨-૦૧-૨૦૨૬	૦૩-૦૧-૨૦૨૬	૦૪-૦૧-૨૦૨૬
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	31	30	29	30	31
લઘુતમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	14	14	13	12	13
મહત્તમભેજ (%)સવાર	80	90	95	75	75
લઘુતમભેજ (%) બપોરબાદ	30	40	40	30	35
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	6	9	10	13	13
પવનની દિશા(ડિગ્રી)	4	315	335	21	19

વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	3	3	3	3	3
હવામાન આગાહી સારાંશ : - રાજકોટ જીલ્લામાં આગામી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૫ થી તા.૦૪-૦૧-૨૦૨૬ દરમિયાન સુકું અને મધ્યમ વાદળછાયું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે. - આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૨૯-૩૧ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમિયાન ૧૨-૧૪ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. - આ સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૭૫-૯૫ અને ૩૦-૪૦ ટકા રહેશે. - પવનની દિશા ઉત્તર, વાયવ્ય અને ઈશાનની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૬ થી ૧૩ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે					

મોરબી:

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૩૧-૧૨-૨૦૨૫	દિવસ-૨ ૦૧-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૩ ૦૨-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૪ ૦૩-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૫ ૦૪-૦૧-૨૦૨૬
વરસાદ(મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	31	30	29	30	31
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	14	14	13	12	13
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	80	90	95	75	75
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	30	40	40	30	35
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	3	10	11	14	14
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	34	297	321	15	18
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	3	3	3	3	3
હવામાન આગાહી સારાંશ : - મોરબી જીલ્લામાં આગામી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૫ થી તા.૦૪-૦૧-૨૦૨૬ દરમિયાન સુકું અને મધ્યમ વાદળછાયું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે. - આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૨૯-૩૧ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમિયાન ૧૨-૧૪ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. - આ સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૭૫-૯૫ અને ૩૦-૪૦ ટકા રહેશે. - પવનની દિશા ઈશાન, વાયવ્ય અને ઉત્તરની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૩ થી ૧૪ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે					

દેવભૂમિદ્વારકા :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૩૧-૧૨-૨૦૨૫	દિવસ-૨ ૦૧-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૩ ૦૨-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૪ ૦૩-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૫ ૦૪-૦૧-૨૦૨૬
વરસાદ(મી.મી.)	0	5	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	28	27	27	28	28
લઘુત્તમ તાપમાન(સે.ગ્રે)	18	18	17	18	18
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	80	90	90	80	80
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	50	60	55	40	40

પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	6	11	13	13	17
પવનનીદિશા (ડીગ્રી)	340	312	327	29	29
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	3	5	3	3	3
હવામાન આગાહી સારાંશ : - દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં આગામી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૫ થી તા.૦૪-૦૧-૨૦૨૬ દરમિયાન સુકું અને મધ્યમ વાદળછાયું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે. તા. ૦૧-જાન્યુઆરી ના રોજ છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવા વરસાદી છાંટા થવાની શક્યતા છે. - આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૨૭-૩૦ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમિયાન ૧૭-૧૮ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. - આ સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૦-૮૦ અને ૪૦-૬૦ ટકા રહેશે. - પવનની દિશા ઉત્તર, વાયવ્ય અને ઈશાનની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૬ થી ૧૭ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે					

સુરેન્દ્રનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૩૧-૧૨-૨૦૨૫	દિવસ-૨ ૦૧-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૩ ૦૨-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૪ ૦૩-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૫ ૦૪-૦૧-૨૦૨૬
વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	31	30	29	30	31
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	14	14	13	12	13
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	80	90	95	75	75
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	30	40	40	30	35
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	6	9	11	13	13
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	38	307	320	6	12
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	3	3	3	3	3
હવામાન આગાહી સારાંશ : - સુરેન્દ્રનગર જીલ્લામાં આગામી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૫ થી તા.૦૪-૦૧-૨૦૨૬ સુકું અને મધ્યમ વાદળછાયું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે. - આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૨૯-૩૧ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમિયાન ૧૨-૧૪ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. - આ સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૭૫-૮૫ અને ૩૦-૪૦ ટકા રહેશે. - પવનની દિશા ઈશાન, વાયવ્ય અને ઉત્તરની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૬ થી ૧૩ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે					

અમરેલી :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૩૧-૧૨-૨૦૨૫	દિવસ-૨ ૦૧-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૩ ૦૨-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૪ ૦૩-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૫ ૦૪-૦૧-૨૦૨૬

વરસાદ (મી.મી.)	0	0	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	31	30	29	30	31
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	13	13	12	12	13
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	70	70	80	70	70
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	30	40	40	35	30
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	7	11	11	12	13
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	339	312	327	10	5
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	3	3	3	3	3
હવામાન આગાહી સારાંશ : - અમરેલી જિલ્લામાં આગામી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૫ થી તા.૦૪-૦૧-૨૦૨૬ દરમિયાન સુકું અને મધ્યમ વાદળછાયું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે. - આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૨૯-૩૧ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમિયાન ૧૨-૧૩ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. - આ સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૭૦-૮૦ અને ૩૦-૪૦ ટકા રહેશે. - પવનની દિશા ઉત્તર અને વાયવ્યની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૭ થી ૧૩ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે					

જામનગર :

તારીખ પેરામીટર	દિવસ-૧ ૩૧-૧૨-૨૦૨૫	દિવસ-૨ ૦૧-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૩ ૦૨-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૪ ૦૩-૦૧-૨૦૨૬	દિવસ-૫ ૦૪-૦૧-૨૦૨૬
વરસાદ (મી.મી.)	0	5	0	0	0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	28	27	27	28	28
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે)	18	17	18	17	17
મહત્તમ ભેજ (%)સવાર	85	95	95	85	80
લઘુત્તમ ભેજ (%) બપોરબાદ	50	75	60	45	50
પવનની ગતિ(કિમી/કલાક)	4	12	12	14	16
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	350	306	334	24	27
વાદળની સ્થિતિ(ઓકટા)	3	5	3	3	3
હવામાન આગાહી સારાંશ : જામનગર જિલ્લામાં આગામી તા.૩૦-૧૨-૨૦૨૫ થી તા.૦૪-૦૧-૨૦૨૬ દરમિયાન સુકું અને મધ્યમ વાદળછાયું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે. તા. ૦૧-જાન્યુઆરી ના રોજ છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં હળવા વરસાદી છાંટા થવાની શક્યતા છે. - આ સમય ગાળામાં મહત્તમ તાપમાન દિવસ દરમિયાન ૨૭-૨૮ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન રાત્રી દરમિયાન ૧૭-૧૮ ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. - આ સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૦-૯૫ અને ૪૫-૭૫ ટકા રહેશે. - પવનની દિશા ઉત્તર, વાયવ્ય અને ઈશાનની રહેવાની અને પવનની ઝડપ ૪ થી ૧૬ કીમી/કલાક રહેવાની					

હવામાન ચેતવણી : નથી

હવામાન ચેતવણીની કૃષિ પર સંભવિત અસર અને તે અનુસંધાને કૃષિ સલાહ : નથી


સામાન્ય કૃષિ સલાહ :

- તુવેરમાં શીંગ માખી અને ચણાના પાકમાં લીલી ઈયળ ના ઉપદ્રવ માટે સતત નિરિક્ષણ કરતા રહેવું, જો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રા કરતા વધારે હોય તો ભલામણ મુજબ નિયંત્રણના પગલા લેવા.
- કપાસ, તુવેર, દિવેલા અને શાકભાજી પાકોમાં જરૂરિયાત મુજબ નિદામણ કાર્ય કરવું અને પિયત આપવું.
- શિયાળુ પાકોમાં જરૂરીયાત મુજબ નિદામણ કરવું.

હવામાન આગોતરો વરતારો : તા. ૦૪ થી ૦૮-જાન્યુઆરી-૨૦૨૬ દરમિયાન સુકું અને ચોખ્ખું હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.

- **મોબાઈલ સંદેશ :** ઘઉંમાં ઉગવાના ૩૦ થી ૩૫ દિવસ પછી ૨.૪ ડી. ઈથાઈલ એસ્ટર ૨૦ મિલિ અથવા મેટસલફ્યુરોન ૦.૮ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.

મુખ્યપાક	પાક અવસ્થા	રોગ/જીવાત/જાત	કૃષિસલાહ (૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાંટવી)
લસણ	વૃદ્ધિ/વિકાસ 	પાનનો સુકારો પીળિયો શ્રીપ્સ 	• લસણના પાકમાં વાવેતર બાદ ૩૦-૩૫ દિવસે ૫૪ કી.ગ્રા./હે. યુરિઆ આપવું. • લસણના ઉગાવા બાદ જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગ આવે નહિ તે માટે વધુ પડતું પિયત આપવું નહિ. • લસણમાં પાનનો પીળિયો રોગના નિયંત્રણ માટે એઝોક્ષીસ્ટ્રોબીન ૧૧.૪ ટકા + ટેબ્યુકોનાઝોલ ૧૮.૩ ટકા એસ.સી. ૧૦ મીલી/૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છાંટવી. • શ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે લીબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અને પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મિલી અથવા લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૧૪ મિલી દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વારાફરતી છંટકાવ કરવો.
ચણા	ફૂલ, પોપટા બંધાવા અને દાણા ભરાવા	લીલી/લશ્કરી ઈયળ	• ચણાના ઉગાવા બાદ ત્રીજું પિયત આંતર ખેડ કરીને પછી ૨૦-૨૫ દિવસે આપવું. • ચણાના પાકમાં લીલી અને લશ્કરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે

			પક્ષીઓને બેસવા માટે 'T' આકારના બેલાખડા મુકવા. જો વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો સ્પીનોસાઇ ૪૫ એસ.સી ૪ મિલી અથવા ઇન્ડોક્ઝાકાર્બ ૭ મિલિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. - તેમજ લીંબોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં કરીને છંટકાવ કરવો. - ફૂલ અને પોપટા બંધાવાની અવસ્થાએ પિયત આપવું. - વાદળછાયા અને ગરમ હવામાનના કારણે આગતર વાવેતર કરેલ યણાના પાકમાં લશ્કરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે પક્ષીઓને બેસવા માટે 'T' આકારના બેલાખડા મુકવા. જો વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ % દાણાદાર ૭ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
રાયડો	ફૂલ / શીંગ	મોલો, થ્રીપ્સ ભુકીછારો	- યુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોક્ઝામ ૨૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીંબોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. - રાયડાના પાકમાં ભુકીછારાનો ઉપદ્રવ થાય નહિ તે માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ ૨૫ મિલી/પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
ઘઉં	ફૂટ/ગાભા નીંધલ/નીંધલ અવસ્થા	- પહોળા પાનવાળા નિંદામણ 	- ફૂટ/ગાભા નીંધલ/નીંધલ અવસ્થાએ પિયત આપવું. - ઘઉંમાં ઉગવાના ૩૦ થી ૩૫ દિવસ પછી ૨,૪ ડી. ઈથાઇલ એસ્ટર ૨૦ મિલિ અથવા મેટસલફ્યુરોન ૦.૮ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
ધાણા	વૃદ્ધિ/ફૂલ/ દાણા બંધાવવા	મોલો, થ્રીપ્સ ભુકીછારા	- યુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે થાયોમીથોક્ઝામ ૨૫ ટકા મમરી ૫ ગ્રામ સાથે લીંબોળીનું તેલ ૫૦મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. - ધાણાની વધુ પડતી વૃદ્ધિ નાં થાય તે માટે નાઈટ્રોજન યુક્ત ખાતર અને પિયત પાણીનો નિયંત્રિત/ભલામણ મુજબ ઉપયોગ કરવો. - ધાણાના પાકમાં ભુકીછારાનો ઉપદ્રવ થાય નહિ તે માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ ૨૫ મિલી/પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જીરું	ડાળી/ફૂલ	યુસિયા જીવાતો ચરમી અને રાખોડી	યુસિયા જીવાતોના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાકલોપ્રીડ ૩ મિલી અથવા એસીટામીપ્રીડ ૪ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.

			તેમજ ચરમી અને રાખોડીનો ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે ડાયથેન એમ ૪૫, ૨૭ ગ્રામ અને હેકઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી દવા વારાફરતી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવો.  
કપાસ	કપાસની વીણી અને સાંઠી કાઢવી	ગુલાબી ઇયળ	- કપાસના પાકમાં ગુલાબી ઇયળનો ભારે ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. - છેલ્લી વીણી પછી ઘેટા બકરા ચરાવવા. જેથી ખુલ્લા વગરના ગુલાબી ઇયળના નુકશાનવાળા જીંડવા અને અન્ય કચરો નાશ પામે. ત્યારબાદ કરાંઠી સળગાવવી નહિ પરંતુ રોટાવેટર / મોબાઈલ ચોપરથી નાના ટુકડા કરી જમીનમાં દાંટી દેવા જેથી જમીન સેન્દ્રિય તત્વનો ઉમેરો થવાથી સુંક્ષ્મ જીવોની સંખ્યા વધશે અને જમીનના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. અથવા કરાંઠી ભેગી કરી શ્રેડરથી નાના ટુકડા કરીને છાણ, યુરીયા, કમ્પોસ્ટ કલ્ચર ઉમેરી દેશી (સેન્દ્રિય) ખાતર બનાવવું.   
તુવેર	ફૂલ/શીંગ	-	- જરૂરીયાત મુજબ પિયત આપવું. - તુવેરમાં શીંગ માખી વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો કવીનાલફોસ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી. પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. - તુવેરમાં શીંગ કોરી ખાનાર ઇયળનો વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો સ્પીનોસાઈ ૪ મી.લી. અથવા એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૭ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
દિવેલા	ફૂલ અને ગળ બંધાવવા અને માળ પરિપક્વતા	ડોડવા કોરી ખાનાર ઇયળ	- જરૂરીયાત મુજબ નિદામણ કરવું અને પિયત આપવું. - ડોડવા કોરી ખાનાર ઇયળનો વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળે તો સ્પીનોસાઈ ૪ મી.લી. અથવા એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૭ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. - પાકી ગયેલ માળની સમયસર લણણી કરવી.
રીંગણી	ફૂલ/ફળ	સફેદમાખી	રીંગણીમાં સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલિ અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦

		ડુંખ અને→ ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ	મીલી અને ડાયફેન્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ➤ ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ અને ડોકા તોડીને જમીનમાં દાંટી દેવા અને ક્લોરાનટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
મરચી	વૃદ્ધિ/ફુલ/ફળ	શ્રીપ્સ, સફેદમાખી  પાન કથીરી	➤ પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અને લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિલી અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મિલી ૧૦લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. શ્રીપ્સનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાદ અથવા સ્પીનેટોરમ દવા ૭ મિલી. અથવા ફ્લુક્ષા મેટા માઈડ ૧૦ % ઈ.સી. ૧૬ મી.લી. પ્રતિ પંપ છાંટવી. ➤ મરચીમાં જો પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા ઇસી ૧૫ મિલી અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૦ મિલી પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. ➤ વાયરસના કારણે કોક્કડાયેલ મરચીના છોડ ઉપાડીને જમીનમાં દાંટી દેવા અને ઉભા પાકમાં ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૩ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.
લીંબુ	ફળનો વિકાસ	સાયલા અને શ્રીપ્સ બદામી ટપકાં પાનકોરીયુ	લીંબુમાં સાયલા અને શ્રીપ્સના નિયંત્રણ માટે ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ મીલી અને લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મીલી અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫ ટકા અર્કનું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી વરાપે છંટકાવ કરવો.  બદામી ટપકાના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ ૪૦ ગ્રામ અને ૧.૫ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીનના બે વરાપે છંટકાવ ૧૫ દિવસના ગાળે કરવા. • પાનકોરીયુના નિયંત્રણ માટે ક્વીનાલફોસ ૨૦ મી.લી. ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને વરાપે છાંટવી.

આંબો	ફૂલ	મધીયો અને મગીયાની ઈયળ	● આંબામાં મધીયો અને મગીયાની ઈયળના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.  ● આંબામાં ભુકીછારો/રાખોડીના નિયંત્રણ માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિલી ૧૦ લી.પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 
પશુ/મરઘા 	પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી. ઈતરડીના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટ્રાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. વિટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. કરમિયાની દવા આપવી તથા ઉછરતા પશુઓમાં બૃસેલ્વા કાફવુંડનું રસીકરણ કરાવવું. નાના પશુઓને રાત્રી દરમિયાન ઠંડીથી બચાવવા શેડમાં રાખવા. પશુને ૬ થી ૮ કી.ગ્રા. સુકો અને ૧૫ થી ૨૦ કી.ગ્રા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને પ્રતિ લીટર દુધની ઊપજ હોય તેમને નિયમિત ૧ કી.ગ્રા. ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્વોનું મિશ્રણ આપવું.તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફીનાઇલ છાંટવું. ● પશુઓને ગરમ હુંફાળું પીવાનું પાણી આપવું. ● પશુઓને રાત્રી દરમિયાન ઠંડીથી બચાવવા શેડમાં રાખવા. ● મરઘા ઘરમાં જરૂરી હવા ઉજાસ રાખી દીવાલ પર કંતાન અથવા પ્લાસ્ટીક કપડું બાંધવું. તેમજ ઈલેક્ટ્રીક બલ્બ ચાલુ રાખવા.		
નોંધ	નીચેની એપ ડાઉનલોડ કરો ● મૌસમ એપ જીલ્લા પ્રમાણે હવામાન આગાહી અને ચેતવણી માટે. ● મેઘદૂત એપ હવામાન આધારિત કૃષિસલાહ બુલેટીન માટે. ● દામીની એપ વરસાદી વીજળીની ચેતવણી માટે.		

જા.નં.જુફયુ/સૂ.ખે./એગ્રોમેટ/બુલેટીન/ / ૨૦૨૫,
તરઘડિયા(રાજકોટ), તારીખ: ૩૦/૧૨/૨૦૨૫.

તંત્રીશ્રી/ડાયરેક્ટરશ્રી,
રાજકોટ,

ઉપરોક્ત માહિતી આપના દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં ,રેડીયોમાં ગામના ચોરાના કાર્યક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાર્યક્રમમાં વિનામૂલ્યે પ્રસિધ્ધ કરાવવા નમ્ર વિનંતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર.

ટેકનીકલ ઓફિસર

સુકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
તરઘડીયા



Gramin Krushi Mausam Seva
Main Dry Farming Research Station
Junagadh Agricultural University
AMFU-Targhadia (Rajkot) - 360 023



Agromet Advisory Service bulletin No.79 for North Saurashtra districts (Gujarat)

(Issued jointly by AMFU-DERS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)

(Period for 31-December-2025 to 04-January-2026)

Significant past weather for the preceding week of Rajkot

Rainfall (mm)	0.0
Maximum temperature (°C)	28.4-30.3
Minimum temperature (°C)	11.6-14.9
Relative Humidity (%) I	56-83
Relative Humidity (%) II	33-36
Wind speed (Kmph)	1.2-2.5

Weather forecast until 08-30 hrs. of 04/01/2026

(1) RAJKOT DISTRICT:

	31/12/2025	01/01/2026	02/01/2026	03/01/2026	04/01/2026
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	31	30	29	30	31
Min.Temp.(°C)	14	14	13	12	13
RH-I (%)	80	90	95	75	75
RH-II (%)	30	40	40	30	35
Wind Speed (kmph)	6	9	10	13	13
Wind Direction(deg.)	4	315	335	21	19
Total CC (octa)	3	3	3	3	3

Forecast Summary: As per the forecast received from India Meteorological Department

- **General weather:** Dry and Partly cloudy weather forecasted for next five days.
- **Rainfall:** No rainfall forecasted for next five days.
- **Temperature:** Maximum and minimum temperature likely to be in range of 29-31°C and 12-14°C, respectively.
- **Relative Humidity:** The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 75-95% & 30-40, respectively.
- **Wind Direction and Speed:** Direction and speed of wind is likely to be N, NW, NE and 6-13 km/h, respectively.

(2) MORBI DISTRICT:

	31/12/2025	01/01/2026	02/01/2026	03/01/2026	04/01/2026
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	31	30	29	30	31
Min.Temp.(°C)	14	14	13	12	13
RH-I (%)	80	90	95	75	75
RH-II (%)	30	40	40	30	35
Wind Speed (kmph)	3	10	11	14	14
Wind Direction(deg.)	34	297	321	15	18
Total CC (octa)	3	3	3	3	3
Forecast Summary: As per the forecast received from India Meteorological Department • General weather: Dry and Partly cloudy weather forecasted for next five days. • Rainfall: No rainfall forecasted for next five days. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 29-31°C and 12-14°C, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 75-95% & 30-40, respectively. • Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NE, NW, N and 3-14 km/h, respectively.					

(3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT:

	31/12/2025	01/01/2026	02/01/2026	03/01/2026	04/01/2026
Rainfall (mm)	0	5	0	0	0
Max.Temp.(°C)	28	27	27	28	28
Min.Temp.(°C)	18	18	17	18	18
RH-I (%)	80	90	90	80	80
RH-II (%)	50	60	55	40	40
Wind Speed (kmph)	6	11	13	13	17
Wind Direction(deg.)	340	312	327	29	29
Total CC (octa)	3	5	3	3	3
Forecast Summary: As per the forecast received from India Meteorological Department • General weather: Dry and Partly cloudy to generally cloudy weather forecasted for next five days. • Rainfall: Light Rainfall at isolated place forecasted on 01-January-2026. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 27-30°C and 17-18°C, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 80-90% & 40-60, respectively. Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be N, NW, NE and 6-17 km/h, respectively.					

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT:

	31/12/2025	01/01/2026	02/01/2026	03/01/2026	04/01/2026
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0

Max.Temp.(°C)	31	30	29	30	31
Min.Temp.(°C)	14	14	13	12	13
RH-I (%)	80	90	95	75	75
RH-II (%)	30	40	40	30	35
Wind Speed (kmph)	6	9	11	13	13
Wind Direction(deg.)	38	307	320	6	12
Total CC (octa)	3	3	3	3	3
Forecast Summary: As per the forecast received from India Meteorological Department • General weather: Dry and Partly cloudy weather forecasted for next five days. • Rainfall: No rainfall forecasted for next five days. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 29-31°C and 12-14°C, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 75-95% & 30-40, respectively. • Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NE, NW, N and 6-13 km/h, respectively.					

(5) AMRELI DISTRICT:

	31/12/2025	01/01/2026	02/01/2026	03/01/2026	04/01/2026
Rainfall (mm)	0	0	0	0	0
Max.Temp.(°C)	31	30	29	30	31
Min.Temp.(°C)	13	13	12	12	13
RH-I (%)	70	70	80	70	70
RH-II (%)	30	40	40	35	30
Wind Speed (kmph)	7	11	11	12	13
Wind Direction(deg.)	339	312	327	10	5
Total CC (octa)	3	3	3	3	3
Forecast Summary: As per the forecast received from India Meteorological Department • General weather: Dry and Partly cloudy weather forecasted for next five days. • Rainfall: No rainfall forecasted for next five days. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 29-31°C and 12-13°C, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 70-80% & 30-40, respectively. Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be N, NW and 7-13 km/h, respectively.					

(6) JAMNAGAR DISTRICT:

	31/12/2025	01/01/2026	02/01/2026	03/01/2026	04/01/2026
Rainfall (mm)	0	5	0	0	0
Max.Temp.(°C)	28	27	27	28	28
Min.Temp.(°C)	18	17	18	17	17
RH-I (%)	85	95	95	85	80
RH-II (%)	50	75	60	45	50
Wind Speed (kmph)	4	12	12	14	16


Wind Direction(deg.)	350	306	334	24	27
Total CC (octa)	3	5	3	3	3
Forecast Summary: As per the forecast received from India Meteorological Department • General weather: Dry and Partly cloudy to generally cloudy weather forecasted for next five days. • Rainfall: Light Rainfall at isolated place forecasted on 01-January-2026. • Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 27-28°C and 17-18°C, respectively. • Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 80-95% & 45-75, respectively. Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be N, NW, NE and 4-16 km/h, respectively.					

Agro meteorological Advisories:

Weather Warning : NIL			
Likely impacts of weather warnings on Agriculture and associated Agromet advisories : NIL			
General Advisory • Monitor the Pigeon pea and chick pea crops for infestation of pod fly and pod borer infestation, respectively, if infestation found above economic threshold level take control measures as per recommendation. • Apply light irrigation to cotton, castor, pigeon pea and vegetable crops as per need. • Carry out weeding as per need in rabi crops.			
• Weather outlook for subsequent week: As per extended range forecast Dry, mainly clear likely to observe during 04 to 09-January-2026.			
• Sms : At 30-35 days after sowing, Spray 2-4-D ethyl ester 20 ml or Metsulfuron 0.8 gm/10 liters of water for the control broad leafy weeds in wheat crop.			
Crops	Stage	Insect/Pest/ Variety	Advisory
Garlic	Growing 	Alternaria leaf blight	• Apply supplementary dose of nitrogen as urea @ 54 kg/ha at 30-35 days after sowing • Apply irrigation as per need. Do not over irrigate to prevent leaf blight (yellowing) disease in garlic. • To prevent leaf blight disease incidence in

		Thrips 	garlic, Spray Azoxystrobin 11.4 % + Tebuconazole 18.3 % SC 10 ml in 10 liters of water. • For thrips control spray neem seed extract 5% and make alternative sprays of profenofos 20 ml and lambda-cyhalothrin 14 ml in 10 liters of water at 10 days interval.
Chick pea	Flowering, Pod formation & development	Prodenia & Heliothis 	• “T” shaped bird perches in and around crop field to be installed for natural controlling the insect population. Due to present weather condition infestation of prodenia found above ETL in early sown chick pea, spray Emamectin Benzoate 5 % SG 7 gm in 10 litres of water. • If infestation of Heliothis found above ETL, spray Spinosad 45 SC 4 ml or Indoxacarb 7ml in 10 litres of water. • Apply irrigation at flowering and pod formation stages.
Mustard	Flowering, pod formation & development	Ahid	• Monitor the crop for infestation of Aphid, if infestation observe above ETL then carry out spraying of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water. • Spray 20 ml Hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew disease in mustard.
Wheat	Jointing/booting/heading	Broad leafy weeds 	• Irrigate wheat crop at CRI stage without stress. • Apply 130 kg urea/ha at crown root initiation. • At 30-35 days after sowing, Spray 2-4-D ethyl ester 20 ml or Metsulfuron 0.8 gm/10 liters of water for the control broad leafy weeds.
Coriander	Growing/flowering	Aphid/thrips Powdery mildew	• Monitor the crop for infestation of Aphid & thrips, if infestation observe above ETL then carry out spraying of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water. • To prevent excessive growth apply control irrigation and not to apply excess urea fertilizer in coriander. • To prevent powdery mildew infestation in coriander spray Hexaconazole 5 % SC 15 ml/10 liter of water.

Cumin	Branching	Aphid/thrips Blight & Powdery mildew	• Monitor the crop for infestation of Aphid & thrips, if infestation observe above ETL then carry out spraying of 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml or Thiomethoxam 25 % WG @ 5 gm / 10 lit of water. • Also spray Mencozeb 27 gm or Hexaconazole 15 ml in 10 liters of water at 10 days interval as precautionary measure against blight and powdery mildew diseases.
Cotton	Last picking	Pink ball worm	• Animals like goats, sheep among others, It should be allowed to graze on unopened bolls and plant debris in the cotton fields after the last picking to prevent infestation in subsequent year. After grazing, don't burn cotton stalk but do in situ chopping & burying of cotton stalk in soil by mobile chopper and rotavator to improve soil biomass and health or prepare exsitu compost. 
Pigeon pea	Flowering/ pod formation- development	Pod fly/borer 	• Monitor the crop for infestation of pod fly and pod borers due to cloudy weather if infestation observed spray quinalphos or profenofos 20 ml/10 litre of water for control of pod fly and Spinosad 4 ml or emamectin benzoate 7 gm/10 litre of water for the control of pod borer complex. • Carry out weeding & apply irrigation as per need.
Castor	Flowering/ capsule formation & development/ spike maturity	Capsule borer→	• Spray Spinosad 45 SC @ 4.0 ml/ 10 lit of water. • Apply irrigation as per need. • Harvest mature spikes in time.
Brinjal	Flowering/ fruiting	White fly→	• To minimize population of whitefly, Spray 500 ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml with Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of water.

		Shoot & Fruit borer	In brinjal, monitoring of borers by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. For control of shoot and fruit borer in brinjal, infested fruits and shoots should be collected and buried into the soil. If fruits and shoot borer population is above ETL then spraying of chlorantraniliprole 18.5 % SC 3.0 ml /10 litre of water is advised.
Chili	Flowering & fruiting	Thrips →  Mites Viral leaf curling	- For control of thrips, spray Profenofos 20 ml with 500 ml of 5 % neem seed extract or neem seed oil 50 ml in 10 litres of water. In case of severe attack, spray Spinosad or Spinetoram 3 or Fluxametamide 10 % EC 11 ml per 10 liter of water. - If infestation of mite observed in chilli, then spray Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water. - Under weather conditions, rouging of viral infested plants should be done in chilli. Infected plants should be uprooted and buried in the soil. After rouging, spraying of Imidacloprid @ 3 ml per 10 litre of water is advised to control the vector.
Lemon	Fruit development/ripening	Psylla and thrips Citrus canker Leaf minor	 - To prevent damage of psylla & thrips spray imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit of water under clear weather. - Spray copper oxychloride 40 gm or streptocyclin 1.5 gm in 10 litre of water under clear sky. - Spray Quinalphos 20 ml in 10 litres of water for control of leaf minor under clear sky.
Mango	Flowering	Blossom midge and Leaf hopper →	To prevent damage spray imidacloprid 3 ml/10 litres of water.

		 Powdery Mildew → 	Spray 15 ml Hexaconazole in 10 liters of water to prevent powdery mildew disease in mango.
Livestock & poultry 	Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick. Carry out Brucella and other infectious & reproductive diseases evaluation. Provide ad lib warm water to lactating animals. Keep young calves indoors during night time and provide dry bedding to avoid cold stress. Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. Spray phenyl in the animal shed to avoid flies and mosquitoes. Keep animal shed hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. For milch animals, regularly follow schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed. Avoid transportation of poultry birds during noon time. • In poultry house gunny bags or plastic sheet curtains should be installed on the side walls of shed with require ventilation. • Provision to switch on light bulbs in the laying hen sheds to maintain temperature.		
Note	Kindly download • MAUSAM App for location specific forecast & warning. • MEGHDOOT App for Agromet advisory. • DAMINI App for lighting warning.		

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia.