

કપાસમાં આવતી ગુલાબી ઈયળનું નિયંત્રણ

ફૂલમાં નુકશાન



ગુલાબી ઈયળ



ફેરોમેન ટ્રેપ



ગુલાબી ઈયળનાં નિયંત્રણ માટે આટલું કરો

- ઉનાળામાં ઉડી ખેડ કરવી.
- બીટી બીજના પેકેટમાં રાખેલ નોન બીટી બિયારણનું (રેફ્યુજી)નું વાવેતર કરવું.
- કપાસનું વહેલુ (આગોતરું) વાવેતર ન કરવું.
- જમીન ઉપર ખરેલા ફૂલ, ચાંપવા અને જીંડવાને વીણી નાશ કરવો.
- વીધા દીઠ બે ગુલાબી ઈયળની લ્યુરનાં ફેરોમેન ટ્રેપ ગોઠવવા.
- પ્રોફેનોફોસ (૫૦ ઈસી) ૧૦ મીલી અથવા કિવનાલફોસ (૨૫ ઈસી) ૨૦ મીલી અથવા થાયોડીકાર્બ(૭૫ વે.પા.)૨૦ ગ્રામ અથવા ઈન્ડોક્ઝાકાર્બ (૧૫.૮ ઈસી) ૫ મીલી અથવા સ્પીનોસાડ (૪૫ એસસી) ૩ મીલી અથવા રાયનેક્સીપાયર ૩ મીલી (૨૦ એસસી) દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
- બીવેરીયા બાસીયાના ૬૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
- છેલ્લી વીણી પુરી થયા બાદ ખેતરમાં ઘેટા-બકરા ચરાવવા.
- છેલ્લી વીણી પુરી થયા બાદ તુરંત જ સાંઠીઓનો નાશ કરવો.

સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (કપાસ), કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ

વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરવો : ૦૨૮૫-૨૬૭૪૧૫૦