

ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો

વર્ષ - ૨૦૨૪



સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ



ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો

વર્ષ - ૨૦૨૪

:: સંકલન ::

ડૉ. એન. બી. જાદવ

ડૉ. એમ. કે. જાડેજા

કુ. પી. બી. અસવાર



સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ

ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણો: વર્ષ - ૨૦૨૪

પ્રકાશન વર્ષ : ૨૦૨૪-૨૫

કૃષિ વિસ્તરણ શિક્ષણ પ્રકાશન શ્રેણી : ૩-૧-૩૨

નકલ : ૩૦૦

પ્રકાશક :

સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ

મુદ્રક :

મેટ્રો ઓફસેટ

દોલતપરા, જૂનાગઢ.

મો. ૯૮૨૫૨ ૨૦૩૭૯





ડૉ. વી. પી. ચોવટીયા

કુલપતિશ્રી,
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી,
જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
ફોન: ઓ : ૦૨૮૫-૨૬૭૧૭૮૪
તા. ૨૫/૦૨/૨૦૨૫

શુભેચ્છા સંદેશ

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોઈપણ ક્ષેત્રનો વિકાસ તેના સંશોધન પર આધાર રાખે છે. તે પ્રમાણે કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે પણ તેને લગતા સંશોધનો અત્યંત આવશ્યક છે. ખેતીના વિકાસમાં કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા થયેલ સંશોધનોનો ફાળો ખૂબ જ મોટો છે. કૃષિ સંશોધનોમાં જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીનું નોંધપાત્ર યોગદાન રહ્યું છે. સને ૨૦૦૪ થી સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોની જરૂરિયાતને ધ્યાને લઈ જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી તેના સંશોધન કેન્દ્રો દ્વારા સંશોધનો હાથ ધરેલ છે. લાંબા ગાળાના અખતરાઓના સફળ પરિણામોને અલગ તારવી સંશોધનોની વિવિધ સમિતિઓની બેઠકમાં તેની ચર્ચા કરવામાં આવે છે. ચર્ચાના અંતે ખેડૂતોને ઉપયોગી થાય તેવા તારણો અલગ તારવી સંશોધનોની સંયુક્ત બેઠકમાં આ ભલામણો મંજૂર કરવા રજૂ કરવામાં આવે છે.

આ પુસ્તિકામાં સમાવિષ્ટ સંશોધન આધારીત ભલામણો બદલાતા સમયની માંગને ધ્યાનમાં રાખી કરેલ હોય, વિસ્તરણ અધિકારીઓ અને ખેડૂતોના આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે ફાયદાકારક બની રહેશે તેવી મને આશા છે.

રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓની વર્ષ ૨૦૨૪ માં મળેલ ૨૦ મી સંયુક્ત કૃષિ સંશોધન ઉપસમિતિ (એગ્રેસ્કો) માં ભલામણો ખેડૂતો માટે સ્વીકારવામાં આવેલ છે. આ ભલામણોને ખેડૂતો તેમજ વિસ્તરણ કાર્યકરો સમજી શકે તેવી સરળ ભાષામાં સંકલિત કરી પ્રકાશિત કરવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ ડૉ.એન.બી.જાદવ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રી, સંશોધનકર્તા તમામ કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓ તેમજ સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્રના સમગ્ર સ્ટાફને અભિનંદન પાઠવું છું.

(વી. પી. ચોવટીયા)





ડૉ. એન. બી. જાદવ

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
જૂનાગઢ
ફોન: ઓ : ૦૨૮૫-૨૬૭૧ ૬૬૯
તા. ૨૫/૦૨/૨૦૨૫

શુભેચ્છા સંદેશ

રાજ્યનાં જુદા જુદા ખેત હવામાન વિભાગો પૈકી ઉત્તર અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર તથા ઉત્તર-પશ્ચિમ ગુજરાત ખેત હવામાનના કેટલાક ભાગ મુજબ જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા કૃષિ સંશોધનની કામગીરી સઘન રીતે કરી રહી છે. વર્ષ ૨૦૨૪ ની ૨૦ મી સંયુક્ત કૃષિ સંશોધન ઉપસમિતિ (એગ્રેસ્કો) માં જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીની કુલ ૨૨ સંશોધન ભલામણો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. આ ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણોને સંકલિત કરી વિસ્તરણ કાર્યકરો અને ખેડૂત સમુદાય સરળ રીતે સમજી શકે તેવી સરળ ભાષામાં તૈયાર કરી, "ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો ૨૦૨૪" પુસ્તિકારૂપે પ્રકાશિત કરવાનો નમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે. આ પુસ્તિકા માટે જરૂરી માહિતી સંલગ્ન સંશોધન વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓ તેમજ સંશોધન પરિષદની પેટા સમિતિઓના કન્વીનરશ્રીઓ પાસેથી મેળવેલ છે.

આ પુસ્તિકામાં સમાવિષ્ટ તાજેતરમાં થયેલ સંશોધનોને પુસ્તિકાના સ્વરૂપમાં ફળ સ્વરૂપે ખેડૂતોને અને વિસ્તરણ કાર્યકરોમાં જરૂર માર્ગદર્શક બની રહેશે.

આ પુસ્તિકામાં આપવામાં આવેલ માહિતીનું વ્યવસ્થિત સંકલન કરી તૈયાર કરવામાં વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્રના સમગ્ર સ્ટાફે પ્રશંસનીય કામગીરી કરેલ છે. તેઓને અભિનંદન પાઠવું છું.

(એન. બી. જાદવ)

અનુક્રમણિકા

ક્રમ	પાકનું નામ	પાના નં.
૧	વિવિધ પાકોની સુધારેલી/સંકર જાતોની માહિતી	૬
૨	ધાન્ય પાકો	૯
૩	રોકડીયા પાકો	૧૦
૪	તેલીબિયાં પાકો	૧૨
૫	શાકભાજી પાકો	૧૬
૬	બાગાયતી પાકો	૧૮
૭	કૃષિ ઈજનેરી	૧૮
૮	અન્ય	૨૩
૯	આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની ભલામણો	૨૪
૧૦	નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની ભલામણો	૩૪
૧૧	દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીની ભલામણો	૫૨

ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો : વર્ષ - ૨૦૨૪

૧. વિવિધ પાકોની સુધારેલી/ સંકર જાતોની માહિતી

૧.૧ ગુજરાત મગફળી - ૧૦૧ (જીજી ૧૦૧: સોરઠ કેશવ)

ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસું ઋતુમાં મગફળી ઉગાડતા ખેડૂતોને વધુ ઉત્પાદન આપતી ઉભડી પ્રકારની મગફળીની જાત ગુજરાત મગફળી ૧૦૧ (જીજી ૧૦૧: સોરઠ કેશવ) નું વાવેતર કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ જાતના ડોડવાનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૨૮૬૦ કિ.ગ્રા./હે. મળેલ છે, જે અંકુશ જાતો જીજી ૯ (૨૧૩૫ કિ.ગ્રા./હે.) અને ટીજી ૩૭ એ (૨૩૦૧ કિ.ગ્રા./હે.) કરતા અનુક્રમે ૩૩.૯૬ અને ૨૪.૨૬ ટકા વધારે માલુમ પડેલ છે. અંકુશ જાતોની સરખામણીએ આ જાતમાં દાણાનું ઉત્પાદન પણ વધારે મળેલ છે. આ જાતમાં પાનના ટપકા, ગેરૂ, થડનો સુકારો, ઉગસુકના રોગોનું પ્રમાણ અને પાન ખાનાર ઈયળથી થતું નુકસાન અંકુશ જાતો જેટલું જોવા મળે છે.



(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (મગફળી), મુખ્ય તેલીભિયાં સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)

૧.૨ ગુજરાત મગફળી - ૨૪ (જીજી ૨૪: સોરઠ ઉર્જા)

ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસું ઋતુમાં મગફળી ઉગાડતા ખેડૂતોને અર્ધ વેલડી પ્રકારની મગફળીની જાત ગુજરાત મગફળી ૨૪ (જીજી ૨૪: સોરઠ ઉર્જા)નું વાવેતર કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ જાતના

ડોડવાનું સરેરાસ ઉત્પાદન ૨૬૦૦ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર મળેલ છે, જે અંકુશ જાત જીજી ૨૨ (૨૧૫૭ કિ.ગ્રા./હે), જીજી ૨૦ (૨૧૨૬ કિ.ગ્રા./હે) અને કોશલ (૧૬૬૭ કિ.ગ્રા./હે) કરતા અનુક્રમે ૨૦.૫૦, ૨૨.૨૮ અને ૫૫.૮૭ ટકા વધારે માલુમ પડેલ છે અંકુશ જાતોની સરખામણીએ આ જાતમાં દાણાનું ઉત્પાદન, તેલનું ઉત્પાદન અને તેલની ટકાવારી પણ વધારે મળેલ છે. આ જાતમાં પાનના ટપકા, ગેરૂ, થડના સુકારો, ઉગસુકના રોગોનું પ્રમાણ અને પાન ખાનારી ઇયળથી થતું નુકસાન અંકુશ જાતો જેટલું જોવા મળેલ છે.



(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (મગફળી), મુખ્ય તેલીભિયાં સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)

૧.૩ ગુજરાત મગફળી - ૪૨ (જીજી ૪૨: સોરઠ શાન)

ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસું ઋતુમાં મગફળી ઉગાડતા ખેડૂતોને વેલડી પ્રકારની મગફળીની જાત ગુજરાત મગફળી ૪૨ (જીજી ૪૨: સોરઠ શાન) નું



વાવેતર કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ જાતના ડોડવાનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૨૩૯૩ કિ.ગ્રા./હે. મળેલ છે, જે અંકુશ જાત જીજી ૪૧ (૨૧૨૭ કિ.ગ્રા./હે.), જીજી ૧૭ (૧૮૮૩ કિ.ગ્રા./હે.) અને સોમનાથ(૧૫૮૫ કિ.ગ્રા./હે.) કરતા અનુક્રમે ૧૨.૫૧, ૨૭.૧૪ અને ૫૦.૯૮ ટકા વધારે માલુમ પડેલ છે. અંકુશ જાતોની સરખામણીએ આ જાતના દાણાનું ઉત્પાદન, તેલનું ઉત્પાદન, છોડ દીઠ ડોડવાની સંખ્યા અને દાણાનો ઉતારો પણ વધારે જોવા મળેલ છે. આ જાતમાં પાનના ટપકા, ગેરૂ, થડનો સુકારો, ઉગસુકના રોગોનું પ્રમાણ અને પાન ખાનાર ઇચિળથી થતું નુકસાન અંકુશ જાતો જેટલું જોવા મળે છે.

(સંશોધન યૈજ્ઞાનિક (મગફળી), મુખ્ય તેલીબિયાં સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)


૧.૪ ગુજરાત તુવેર - ૧૧૧ (જીટી ૧૧૧ : સોરઠ રતન)

ગુજરાત રાજ્યના તુવેર ઉગાડતા ખેડૂતોને મધ્યમ પાકતી (૧૭૭ દિવસ) ગુજરાત તુવેર ૧૧૧ (જીટી ૧૧૧: સોરઠ રતન) જાત નું વાવેતર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ જાતના દાણાનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૨૧૯૭ કિ.ગ્રા./હે. મળેલ છે, જે અંકુશ જાતો જીજીપી ૧, એજીટી ૨, બીડીએન ૨ અને જીટી ૧૦૪ કરતાં ૬.૬, ૧૮.૩, ૧૪.૫ અને ૧૫.૯ ટકા વધુ છે. આ જાતના દાણા કીમ કલરના અને મોટા કદના (૧૨.૮૮ ગ્રામ/૧૦૦ દાણા) છે. આ જાતના સુકારા સામે મધ્યમ પ્રતિકારકતા; વંધ્યત્વ અને થડના સડા સામે પ્રતિકારકતા તેમજ શીંગ કોરી ખાનાર ઇચિળ અને શીંગ માખીને કારણે ઓછું નુકસાન જોવા મળેલ છે.

(સંશોધન યૈજ્ઞાનિક (ચણા), કઠોળ સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)

૧.૫ બાજરા હાયબ્રીડ : જીએચબી ૧૨૯૪ (મરૂ મોતી)

ગુજરાત રાજ્યમાં ખરીફ ઋતુમાં બાજરાનું વાવેતર કરતાં ખેડૂતોને વહેલી પાકતી સંકર જાત જીએચબી ૧૨૯૪ (મરૂ મોતી) નું વાવેતર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ જાતના દાણાનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૨૭૧૭ કિ.ગ્રા./હે. મળેલ છે, જે અંકુશ સંકર જાત જીએચબી-૫૩૮ કરતા ૨૦.૦ ટકા વધારે છે. તેમજ સુકાચારાનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૭૩૦૬ કિ.ગ્રા./હે. મળેલ છે, જે અંકુશ સંકર જાત જીએચબી-૫૩૮ કરતા ૪૬.૮ ટકા વધારે છે. આ સંકર જાત રોગો જેવા કે કુતુલ, પાનના ટપકાં, ગેરૂ સામે




પ્રતિકારકતા તેમજ જીવાતો જેવી કે, સાંઠાની માખી, ગાભમારાની ઇયળ અને ડુંડા કોરી ખાનાર ઇયળ સામે સહનશીલતા ધરાવે છે.

(સંશોધન પેજાનિક (બાજરા), બાજરા સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.કૃ.યુ., જામનગર)

૨. ધાન્ય પાકો

૨.૧ મકાઈમાં ચાર ટપકવાની લશ્કરી ઇયળ સામે જુદી-જુદી વિષ પ્રલોભીકાની દવાઓની અસર

ગુજરાતમાં મકાઈની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, પૂછડે ચાર ટપકા વાળી લશ્કરી ઇયળના અસરકારક નિયંત્રણ માટે થાયોડીકાર્બ ૭૫ ડબલ્યુપી ૨૫૦ ગ્રામ અથવા એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ એસજી ૧૦૦ ગ્રામ દવાને પ્રતિ હેક્ટર દીઠ ૫ કિ.ગ્રા. ગોળ અને ૨૫ કિગ્રા મકાઈના લોટ સાથે ૮ લિટર પાણીમાં ભેળવી વિષ પ્રલોભિકા બનાવીને



છોડની ભૂંગળીમાં આપવી, પ્રથમ માવજત જીવાતનો ઉપદ્રવ શરૂ થયે અને બીજી માવજત પ્રથમ માવજતના ૨૦ દિવસ બાદ કરવી.

સી. આઈ. બી. અને આર. સી. ફોર્મેટ

વર્ષ	પાક	જીવાત	જંતુદ્વં / જૈવિક જંતુનું શ્રેયોદેશન	પ્રમાણ				દાવણનો જથ્થો / જમીન સુધારકો ની જરૂરિયાત (કિગ્રા અથવા લી/હે)	વાપરવાની પદ્ધતિ	વેઈટીંગ પિરિયડ / પી. એચ. આઈ. (દિવસ)	નોંધ
				સક્રિય તત્વ (ગ્રામ/હે)	શ્રેયોદેશ નનો જથ્થો આમ અથવા મિલી/કિગ્રા બીજ, કિગ્રા અથવા લી/હે	સાંદ્રતા (%)	૧૦ લિટર પાણીમાં શ્રેયોદેશનનો જથ્થો (ગ્રામ અથવા મિલી)				
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨
૨૦૨૪	મકાઈ	પૂછડે ચાર તાપકાવાળી લશ્કરી ઈયળ	થયોડીકાર્બ ૭૫ ડબલ્યુ પી	-	૨૫૦ ગ્રામ	-	-	-	પ્રથમ માવજત જીવાતનો ઉપદ્રવ શરૂ થયે અને બીજી માવજત પ્રથમ માવજતના ૨૦ દિવસ બાદ કરવી	-	-
			એમામેકટીન બેન્ઝોથેટ ૫ એસ જી	-	૧૦૦ ગ્રામ	-	-			-	-

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, કિટકશાસ્ત્ર વિભાગ, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)

૩. રોકડીયા પાકો

૩.૧ બીટી કપાસ (ગોસીપીયમ હીસ્પીડમ)માં ઉત્પાદન પ્રણાલીની સંશોધનનો ઉપયોગ નફાકારકતા અને ટકાઉપણું વધારવા માટે બહુ સ્તરીય પાક પદ્ધતિ

દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત અબોહાવાકીય વિસ્તારમાં બીટી કપાસનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને વધુ ચોખ્ખી આવક મેળવવા કપાસનું જોડિયા હાર પદ્ધતિમાં (૮૦:૧૬૦:૮૦ સે.મી.) અને બીટી કપાસની બે જોડિયા વચ્ચે આંતરપાક તરીકે બે હારમાં મગફળીનું (૪૦ સે.મી. અંતરે) અથવા બે હારમાં સોયાબીનનું (૪૦ સે.મી. અંતરે) અથવા એક હાર સોયાબીન અને

એક હાર મગફળીનું (૪૦ સે.મી. અંતરે) વાવેતર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (કપાસ), કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)

૩.૨ વરસાદ આધારિત પરિસ્થિતિ હેઠળ બીટી કપાસમાં પોષણ વ્યવસ્થાપન (વલ્લભીપુર)

ભાલ વિસ્તારમાં વરસાદ આધારિત પરિસ્થિતિમાં કપાસનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને વધારે ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મેળવવા માટે પ્રતિ હેક્ટરે ૮૦-૪૦-૮૦-૨૦ કિ.ગ્રા. ના-ફો-પો-સલ્ફર આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. નાઇટ્રોજન ત્રણ ભાગમાં એટલે કે ૨૫ % પાયાના ખાતર તરીકે વાવેતર સમયે, બાકીનો ૫૦ % અને ૨૫ % પૂર્તિ ખાતર તરીકે વાવેતર પછી અનુક્રમે ૩૫-૪૦ અને ૬૦-૬૫ દિવસે ૧૦ સે.મી.ની ઊંડાઇએ જમીનમાં ઓરીને આપવું.



(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (સુ.ખે.), મુખ્ય સુકી ખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.ફ.યુ., તરઘડીયા અને મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, સુકી ખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.ફ.યુ., વલ્લભીપુર)

૩.૩ કપાસની સાઠીઓનું રીસાયકલીંગ અને ઉત્પાદન અને જમીનના સ્વાસ્થ્ય ઉપર તેની અસર

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકિય વિસ્તારમાં કપાસનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને વધારે ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મેળવવા તેમજ જમીનના આરોગ્યની જાળવણી માટે શ્રેડર મશીનનો ઉપયોગ કરીને કપાસની સાંઠીના ટુકડા કરી ખાતર બનાવી આપવું અને ૧૦ કિ.ગ્રા. નાઇટ્રોજન ચુરીયા દ્વારા + કમ્પોસ્ટ કલ્ચર ૫ કિ.ગ્રા. વાવણી વખતે આપવું તેમજ સાથે પ્રતિ હેક્ટરે ૮૦ કિ.ગ્રા. નાઇટ્રોજન + ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફોરસ + ૨૫૦ કિ.ગ્રા. ઝીપ્સમ આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. નાઇટ્રોજન ત્રણ





ભાગમાં એટલે કે ૨૫ % પાયાના ખાતર તરીકે વાવેતર સમયે બાકીનો ૫૦ % અને ૨૫ % પૂર્તિ ખાતર તરીકે વાવેતર પછી અનુક્રમે ૩૫-૪૦ દિવસે અને ૬૦-૬૫ દિવસે ૧૦ સે.મી.ની ઉંડાઈએ જમીનમાં ઓરીને આપવું.

અથવા

સાંઠીના ટુકડા કરવાના મશીનનો ઉપયોગ કરીને કપાસની સાંઠીને જમીનમાં ભેળવવી અને સડવા માટે એક પિચત આપવું તેમજ સાથે પ્રતિ હેક્ટરે ૮૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન + ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફોરસ + ૨૫૦ કિ.ગ્રા. ઝીન્કસમ આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. નાઈટ્રોજન ત્રણ ભાગમાં એટલે કે ૨૫ % પાયાના ખાતર તરીકે વાવેતર સમયે, બાકીનો ૫૦ % અને ૨૫ % પૂર્તિ ખાતર તરીકે વાવેતર પછી અનુક્રમે ૩૫-૪૦ દિવસે અને ૬૦-૬૫ દિવસે ૧૦ સે.મી.ની ઉંડાઈએ જમીનમાં ઓરીને આપવું.

કપાસની સાંઠીમાંથી કમ્પોસ્ટ ખાતર બનાવવાની પદ્ધતિ:

કપાસની સાંઠીને ખેતરમાં બાળી નાખવી અથવા શેઢેપાળે ફેંકી દેવાને બદલે કોટન શ્રેડરથી ૫-૬ સે.મી.ના નાના ટુકડા કરી, એક ટન કપાસની સાંઠી દીઠ ૫૦૦ ગ્રામ કમ્પોસ્ટ કલ્ચર અને ચુરીયા (૦.૫ % નાઈટ્રોજન) તથા ૨૦ % છાણ તેમજ પ્રથમવાર ફેરવતી વખતે એઝેટોબેક્ટર+ફોસ્ફો બેક્ટેરીયા એક ટન કપાસની સાંઠી દીઠ ૫૦૦ ગ્રામ પ્રમાણે ઉમેરી, કમ્પોસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવે તો ૧૨૦ દિવસમાં દરેક પોષક તત્વોના વધુ જથ્થા વાળું સેન્દ્રિય કમ્પોસ્ટ બનાવી શકાય.

(સંશોધન યૈજ્ઞાનિક (સુ.ખે.), મુખ્ય સુકી ખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.ફૂ.યુ., તરઘડીયા)

૪. તેલીબિયાં પાકો

૪.૧ ચોમાસું મગફળીમાં વધુ ઉત્પાદન માટે પાણીમાં દ્રવ્ય ખાતરની અગત્યતા

દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારમાં ચોમાસું ઋતુમાં



મગફળી ઉગાડતા ખેડૂતોને વધુ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખી આવક મેળવવા માટે ભલામણ કરેલ રાસાયણિક ખાતર ૭૫ ટકા) ૯.૩૭-૧૮.૭૫-૩૭.૫૦ કિ.ગ્રા. ના:ફો:પો/હે.) નો જથ્થો આપવો તેમજ ૧.૫ % (૧૫૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં) દ્રાવ્ય ખાતર (૧૯-૧૯-૧૯ ના:ફો:પો) વાવેતર બાદ ૪૫ અને ૬૦ દિવસે છંટકાવ કરવો અને ૧.૦ % (૧૦૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં) મલ્ટી માઈક્રો મિશ્ર ગ્રેડ-૪ (જસત ૬.૦ %, લોહ-૪.૦ %, કોપર-૦.૫ %, મેંગેનીઝ-૧.૦ % અને બોરોન-૦.૫ %) વાવેતર બાદ ૫૦ અને ૬૫ દિવસે છંટકાવ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.



75% RDF +1.5% WSF at 45 and 60
DAS + 1.0 % Multi-micro. mixture
Grade -IV at 50 and 65 DAS

100% RDF +1.5% WSF at 45 and 60
DAS + 1.0 % Multi-micro. mixture
Grade -IV at 50 and 65 DAS

(સંશોધન પૈજાનિક (મગફળી), મુખ્ય તેલીબિયા સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)

૪.૨ મગફળીના પાકમાં જમીનજન્ય અને બીજ જન્ય રોગોના નિયંત્રણ માટે તૈયાર મિશ્રિત ફૂગનાશકોની ચકાસણી

ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસું મગફળીની ખેતી કરતા ખેડૂતોને અફ્લારોટ, ઉગસુક તેમજ થડ અને ડોડવાના કોહવારા રોગના અસરકારક વ્યવસ્થાપન માટે ફૂગનાશકના તૈયાર મિશ્રણ કાર્બોક્સીન ૩૭.૫ + થાયરમ ૩૭.૫ ડબલ્યુએસ ૩ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ ૨૫ +મેન્કોઝેબ ૫૦ ડબલ્યુએસ ૩ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ અથવા પેન્ડ્લુફેન ૧૩.૨૮+ ટ્રાયફ્લોકસીસ્ટ્રોબીન ૧૩.૨૮ એફએસ ૩ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ મુજબ બીજ

માવજત આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

સી. આઈ. બી. અને આર. સી. ફોર્મેટ

વર્ષ	પાક	જીવાત	જંતુખન / જૈવિક જંતુખનનું ફોર્મ્યુલેશન	પ્રમાણ				બ્રવણનો જથ્થો / પાણીમાં જમીન સુધારકોની જરૂરિયાત (કિગ્રા અથવા લી/હે)	વાપરવાની પદ્ધતિ	વેઈટીંગ / પી. એચ. આઈ. (દિવસ)	નોંધ
				સક્રિય તત્વ (ગ્રામ/ હે)	ફોર્મ્યુલેશન નો જથ્થો ગ્રામ અથવા મિલી/કિગ્રા બીજા કિગ્રા અથવા લી/હે	સંક્રાંતિ (%)	૧૦ લિટર પાણીમાં ફોર્મ્યુલેશન નો જથ્થો (ગ્રામ અથવા મિલી)				
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨
૨૦ ૨૪	મગફળી	અફલા રોટ, ઉગસુંક, થડ અને ડોડવા નો કોહવારો	કાર્બોફેન્થીન ૩૭.૫ + થાઈરમ ૩૭.૫ ડબલ્યુ એસ	-	૩ ગ્રામ	--	--	-	વાવેતર પહેલા બીજ માવજત આપવી	-	મગફળીના આફલા રોટ, મુળનો કોહવારો અને મુળના સડાના રોગના નિયંત્રણ માટે આ દવાઓ સીઆઈબી-આરસીમાં નોંધાયેલ છે.
			કાર્બેન્ડેઝીમ ૨૫ + મેન્કોઝેબ ૫૦ ડબલ્યુ એસ	-	૩ ગ્રામ	--	--	-		-	
			પેન્ફલુફેન ૧૩.૨૮ + ટ્રાઇફ્લોક્સી સ્ટ્રોબીન ૧૩.૨૮ એફ એસ	-	૩ મીલી	--	--	-		-	

(સંશોધન પૈજાનિક (મગફળી), મુખ્ય તેલીબિયા સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.ફૂ.યુ., જૂનાગઢ)

૪.૩ જમીનમાં ભેજ સંરક્ષણની પરિસ્થિતિમાં : મગફળીના ઉત્પાદન માટે વરસાદી પાણીનો ઉપયોગ અને વ્યવસ્થાપન

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના સુકી ખેતીની પરિસ્થિતિમાં મગફળીનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને જમીનમાં ભેજ જાળવવા અને વરસાદના પાણીની મહત્તમ કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવા તેમજ વધારે ઉત્પાદન અને આર્થિક વળતર મેળવવા માટે પાળા પર વાવેતર સાથે પાળા

બંધી અને કૃષિ કચરા (મગફળીની ફોતરી ૧.૫ ટન/હે.) ને મત્સ્ય તરીકે ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.



(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (સુ.ખે.), મુખ્ય સુકી ખેતી સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.ફ.યુ., તરઘડીયા)

૪.૪ ગુણવત્તાયુક્ત તલસ્પ્રેડ બનાવવા અને તેની જાણવણી અંગેની ભલામણ

ભાગ-૧:

તલ સ્પ્રેડ ઉત્પાદકોને ગુણવત્તાયુક્ત તલ સ્પ્રેડ બનાવવા જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ પદ્ધતિ અપનાવવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં પ્રથમ ફોતરી કાઢેલા તલને ૧૪૭° સે. તાપમાને ૨૭ મિનીટ અને ૩૦ સેકન્ડ માટે શેકવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, ઠંડા પડેલ શેકેલા તલને ૮.૫૦ % ગોળ, ૬.૨૦ % હાઈડ્રોજીનેટેડ વેજિટેબલ ઓઈલ તેમજ ૧.૩૦ % ગુવાર ગમ પાવડર અને ૧.૦૦ % મીઠા સાથે ઉમેરી બારીકાઈથી પીસવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ અપનાવવાથી સારી ગુણવત્તા ધરાવતું તલસ્પ્રેડ તૈયાર કરી શકાય છે.

ભાગ-૨:

તલ સ્પ્રેડ ઉત્પાદકોને આવી રીતે તૈયાર થયેલ તલસ્પ્રેડને ત્રણ મહિના

સુધી યોગ્ય ગુણવત્તા સાથે જાળવવા માટે પી.ઈ.ટી. (પોલિઇથીલીન ટેરેફ્થાલેટ) કન્ટેનરમાં રેફ્રીજરેટેડ તાપમાને (૮° સે.) સંગ્રહ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી વિકસિત આ સ્ટોરેજ પદ્ધતિ દ્વારા તલસ્પ્રેડની ઓકિસિડેટીવ અને માઇક્રોબાયલ સ્થિરતા સાથે ઉચ્ચ બાયોકેમિકલ, રિઓલોજિકલ અને સંવેદનાત્મક ગુણવત્તા ત્રણ મહિના સુધી જાળવી શકાય છે.


(સંશોધન પેજાનિક, કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.કૃ.યુ., અમરેલી)

૫. શાકભાજી પાકો

૫.૧ સજીવ ખેતીમાં ગાય આધારીત બાયો-વર્ધકોની અસરથી ડુંગળીના પાકમાં વિકાસ અને મૂલ્યાંકન

દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારમાં શિયાળુ ડુંગળીની સેન્દ્રિય ખેતી કરતાં ખેડૂતોને વધું ઉત્પાદન અને વળતર મેળવવા માટે છાણીયુ ખાતર ૧૦ ટન પ્રતિ હેક્ટર આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ગાય આધારિત ખેતીમાં રસ ધરાવતા ખેડૂતોને છાણીયુ ખાતર ૫ ટન પ્રતિ હેક્ટરે અને પંચગવ્ય ૩ ટકાનો છંટકાવ વાવણી બાદ ૩૦, ૪૫ અને ૬૦ દિવસે અથવા છાણીયુ ખાતર ૫ ટન પ્રતિ હેક્ટરે અને જીવામૃત ૫૦૦ લીટર પ્રતિ હેક્ટરે વાવેતર સમયે તેમજ ૩૦ અને ૪૫ દિવસે પિચત પાણી સાથે આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.



(પ્રાધ્યાપક અને વડા, કૃષિ વિજ્ઞાન વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જૂ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ)

૫.૨ ગાયના છાણની રબડીનું લસણના પાકમાં ઉત્પાદન ઉપર અસર

દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારમાં લસણનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, લસણના પાકમાં ૧૫૦૦

કિ.ગ્રા./હે. ગાયના તાજા છાણની (પાંચ દિવસ સુધીનું) રબડી (તાજુ છાણ: પાણી- ૧:૩) પિયત પાણીની સાથે વાવેતર સમયે આપવાથી વધુ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મળે છે, તેમજ જમીનની ફળદ્રુપતા વધે છે.

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણશાસ્ત્ર વિભાગ, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ અને (સંશોધન પેજાનિક (લ.કુ.), શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)

૫.૩ ટામેટામાં અલગ અલગ મુલકાંડનો ક્ષારવાળા પાણીની સિંચાઈની સ્થિતિ હેઠળનો પ્રતિભાવ

દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારમાં ટામેટાની ખેતી કરતાં ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, ટમેટાના મૂળકાંડ અર્કા વિકાસ ઉપર કલમ કરેલ જીટી-૬ જાતની ટામેટીને ૨.૦ ડીએસ/મી. ઇસી સુધીનું ક્ષારવાળું પાણી વાપરવાથી વધુ ઉત્પાદન અને નફો મળે છે.



(આચાર્ય અને ડીન, બાગાયત મહાવિદ્યાલય, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)

૫.૪ પોલીહાઉસ હેઠળ ટમેટામાં પોષકતત્વોનું સંચાલન

પોલીહાઉસમાં ટમેટાની ખેતી કરતા ગુજરાતના ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ટમેટાને ભલામણ મુજબના ખાતરો ૨૫-૧૨.૫૦-૧૨.૫૦ ના-ફો-પો/કિગ્રા / ૧૦૦૦ ચો.મી. સાથે પંચગવ્ય ૩ % ના ત્રણ છંટકાવ ફેરોપણી કર્યા પછીના ૪૫, ૬૦ અને ૭૫ દિવસે કરવાથી વધુ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મળે છે.



(આચાર્ય અને ડીન, બાગાયત મહાવિદ્યાલય, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)



૬. બાગાયતી પાકો

૬.૧ આંબાની ફળમાખીના વ્યવસ્થાપન માટે ફેરોમેનટ્રેપની સંખ્યાની ચકાસણી

દક્ષિણ સોરાષ્ટ્રમાં આંબાના બગીચા ધરાવતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, ફળ માખીના અસરકારક નિયંત્રણ માટે વટાણા જેવડી કેરીની અવસ્થાએ ૩૦ મીથાઈલ યુગ્તનોલ પેરાફેરોમોન ટ્રેપ પ્રતિ હેક્ટરે જમીનથી ત્રણ મીટર ઉંચાઈએ લગાવવા તથા ત્યારબાદ લ્યુર ૪૦ દિવસના અંતરે ત્રણ વખત બદલાવવી.



(પ્રાધ્યાપક અને વડા, કિટકશાસ્ત્ર વિભાગ, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)

૭. કૃષિ ઈજનેરી

૭.૧ ઘઉં અને ઉનાળુ મગમાં ટપક પદ્ધતિ દ્વારા પિયત પાણી અને ખાતર વ્યવસ્થાપન

દક્ષિણ સોરાષ્ટ્ર ખેત-આબોહવાકીય વિસ્તારમાં ઘઉંનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને વધુ ઉત્પાદન અને વળતર મેળવવા માટે ભલામણ થયેલ રસાયણિક ખાતર (નાઈટ્રોજન: ફોસ્ફોરસ: પોટાશ ૧૨૦:૬૦:૬૦ કિ.ગ્રા./ હેક્ટર) નાં ૭૫ % ખાતર નીચે મુજબની ડ્રીપ પદ્ધતિ અને પિયત સમયપત્રક મુજબ વાવેતરનાં ૧૨ દિવસ બાદ ૬ દિવસ નાં અંતરે એક સરખા ૮ હેક્ટરમાં આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ડ્રીપ પદ્ધતિ અને પિયત સમયપત્રકની વિગત

ડ્રીપ પિયત પદ્ધતિની વિગત	શિયાળામાં ઘઉંનાં પાક માટે પિયત ઊંડાઈ, સંખ્યા અને ડ્રીપ પદ્ધતિ સંચાલન સમય			
	વાવેતર બાદ (દીવસો)	પિયત સંખ્યા	પિયત ઊંડાઈ (મીમી)	સંચાલન સમય
લેટરલ પ્રકાર = ઇનલાઇન. ઇનલાઇન ડ્રીપ સાઈઝ = ૧૬ મીમી.	૦	૧	૪૦	૩ કલાક & ૨૩ મીનીટ
ડ્રીપર પ્રવાહ = ૪ લી/કલાક.	૦-૧૦	૧	૩૦	૨ કલાક & ૩૨ મીનીટ
ડ્રીપર અંતર = ૦.૫ મી.	૧૧-૪૦	૫	૨૦	૧ કલાક & ૪૧ મીનીટ
ઇનલાઇન અંતર = ૦.૬૭૫ મી.	૪૧-૭૦	૫	૨૨	૧ કલાક & ૫૧ મીનીટ
દરેક ઇનલાઇન ડ્રીપ દીઠ હારોની સંખ્યા = ૩	૭૧-૮૦	૩	૨૪	૧ કલાક
	૮૦ બાદ	૨	૨૬	૨ કલાક & ૧૨ મીનીટ

તેમજ ઘઉંનાં પાકની કાપણી બાદ એક પણ ખેડ કાર્ય કર્યા વિના સીધા જ મગનાં પાકને જોડીયા હાર (૦.૩ મી. × ૦.૩૭૫ મી.) પદ્ધતિમાં વાવેતર કરીને ભલામણ ખાતર (નાઈટ્રોજન:ફોસ્ફોરસ:પોટાશ ૨૦:૪૦:૦૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર) નાં ૭૫ % ફોસ્ફોરસ પાયાના ખાતર તરીકે અને ૭૫ % નાઈટ્રોજન વાવેતરના ૧૨ દિવસ બાદ ૬ દિવસ નાં અંતરે એક સરખા પ હસામાં નીચે મુજબની ટપક પિયત પદ્ધતિથી આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે જેનાથી વધુ ઉત્પાદન અને વળતર મેળવી શકાય છે.

ડ્રીપ પિયત પદ્ધતિની વિગત	ઉનાળામાં મગનાં પાક માટે પિયત ઊંડાઈ, સંખ્યા અને ડ્રીપ પદ્ધતિ સંચાલન સમય			
	વાવેતર બાદ (દીવસો)	પિયત સંખ્યા	પિયત ઊંડાઈ (મીમી)	સંચાલન સમય
લેટરલ પ્રકાર = ઇનલાઇન	૦	૧	૨૦	૧ કલાક & ૪૧ મીનીટ
ઇનલાઇન ડ્રીપ સાઈઝ = ૧૬ મિમી.	૦-૧૦	૧	૧૫	૧ કલાક & ૧૬ મીનીટ
ડ્રીપર પ્રવાહ = ૪ લી/કલાક.	૧૧-૩૦	૫	૨૧	૧ કલાક & ૪૬ મીનીટ
ડ્રીપર અંતર = ૦.૫ મી.	૩૧-૭૦	૬	૨૩	૧ કલાક & ૫૬ મીનીટ
ઇનલાઇન અંતર = ૦.૬૭૫ મી.	૭૦ બાદ	૧	૨૨	૧ કલાક & ૫૧ મીનીટ
દરેક ઇનલાઇન ડ્રીપ દીઠ હારોની સંખ્યા = ૨				

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, સિંચાઈ અને ટ્રેનેજ ઇજનેરી વિભાગ, કૃષિ ઇજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, જૂ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ)

૭.૨ બેટરી ઓપરેટેડ લાઈટ વેઈટ આંતરખેડ / નિંદણ ચંત્ર

ખેડૂતો અને ચંત્ર ઉત્પાદકોને શાકભાજી/બાગાયતી પાકોમાં જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસાવાયેલ એક માણસથી ચલાવી શકાય તેવા બેટરી સંચાલિત આંતરખેડ/નિંદણ ચંત્ર (જેમાં રોટરી બ્લેડ હોય છે, જે ૧૨ વોલ્ટ-૭૪ એમ્પી.ની લીડ-એસીડ રીચાર્જેબલ બેટરીથી ચાલે છે) નો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ ચંત્રથી ૩૦ સેમી. પહોળાઈમાં ૦.૦૨-૦.૦૩ હે/કલાકની કાર્યક્ષમતા અને ૮૪-૯૦ % જેટલી નિંદણક્ષમતા મળે છે. આ ચંત્રથી ૮૫ % સુધી સમયનો, ૩૫% સુધી શક્તિ વપરાશનો અને ૭૮% સુધી ખર્ચની બચત થાય છે.



(પ્રાધ્યાપક અને વડા, ફાર્મ મશીનરી અને પાવર ઈજનેરી વિભાગ, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, કેન્દ્ર, જૂ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ)

૭.૩ મીની ટ્રેક્ટર સંચાલિત જુદા-જુદા પાક વચ્ચેના નિંદામણને વધારે સારી રીતે પલટાવવા વાળા વિડર સાથેના રોલરનો વિકાસ અને કામગીરીનું મુલ્યાંકન

આથી ખેતરમાંથી જુદાજુદા પાક વચ્ચેના નિંદામણને વધારે સારી રીતે દૂર કરવા, સમય અને નાણાની બચત હેતુસર જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ મીની ટ્રેક્ટર સંચાલિત મલ્ટી કોપ સ્વીપ બ્લેડ વીડરનો સામાન્ય રીતે વપરાશમાં લેવાતી રાપની જગ્યાએ ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.



(પ્રાધ્યાપક અને વડા, ફાર્મ એન્જીનીયરીંગ વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જૂ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ)



૭.૪ મીની ટ્રેક્ટર સંચાલિત જુદા-જુદા પાક વચ્ચેના નિંદામણને વધારે સારી રીતે દુર કરવાવાળા સ્વીપ બ્લેડ વિડરનો વિકાસ અને કામગીરીનું મુલ્યાંકન

આથી ખેતરમાંથી જુદાજુદા પાક વચ્ચેના નિંદામણને વધારે સારી રીતે દુર કરવા, પલટાવવા અને સમયની બચત હેતુસર જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ મીની ટ્રેક્ટર સંચાલિત વીડર સાથેના રોલરનો સામાન્ય રીતે વપરાશમાં લેવાતી રાપની જગ્યાએ ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.



(પ્રાધ્યાપક અને વડા, ફાર્મ એન્જીનીયરીંગ વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જૂ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ)

૭.૫ સ્થાનિક મસાલા પાકોની સુકવણી માટેનું વિકસાવેલ સોલાર ટનલ ડ્રાયર

મરીમસાલા પાકોનું ઉત્પાદન લેતા ખેડુતો અને સુકવણી કરતા પ્રોસેસરોને જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસાવેલ સોલાર ટનલ ડ્રાયરની મદદથી તાજા લાલ મરચા, હળદર અને આદુ જેવા મરી-મસાલા પાકોની સુકવણી કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. જેના ઉપયોગથી પરંપરાગત સૂર્યપ્રકાશથી સુકવવાની પદ્ધતિની સરખામણીએ ઓછો સુકાવણી સમય, ઓછી જગ્યા, સૂકવણી અને જાળવણી દરમિયાન નહીવત બગાડ, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા સુકવેલ મરી-મસાલા, સૂકાયેલ મરી-મસાલા પાકોની વધારે રિકવરી તેમજ ઊંચું આર્થિક વળતર મેળવી શકાય છે.

- સુકવણીની ક્ષમતા : ૫૦૦ ± ૫ કિ.ગ્રા. (લાલ મરચા), ૫૪૦ ± ૫ કિલો (હળદર), ૫૨૫ ± ૫ (આદુ) પ્રતિ બેચ.
- સુકવણીના કલાકો : ૧૪ દિવસ (લાલ મરચા), ૨૨ દિવસ (હળદર), ૨૩ દિવસ (આદુ) (જાન્યુઆરી-એપ્રિલ).

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, રીન્યુએબલ એનર્જી ઈજનેરી વિભાગ, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, જૂ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ)



૭.૬ સ્થાનિક મસાલા પાકોની સુકવણી માટેનું વિકસાવેલ સોલાર ટનલ ડ્રાયર

મરીમસાલા પાકોનું ઉત્પાદન લેતા ખેડૂતો અને સુકવણી કરતા પ્રોસેસરોને તાજા મરી-મસાલા પાકોની સલામત ભેજના પ્રમાણ સુધી સુકવણી કરવા માટે જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસાવેલ સોલાર ટનલ ડ્રાયરની નીચે મુજબની ભલામણ કરવામાં આવે છે.



વિકસાવાયેલ સોલાર ટનલ ડ્રાયરની વિગત :

- સુકવણીની ક્ષમતા : ૫૦૦ ± ૫ કિ.ગ્રા. થી ૫૪૦ ± ૫ પ્રતિ બેચ (મરીમસાલા પાકો આધારિત).
- સુકવણીની ટ્રે : બે સ્તરમાં ગોઠવેલ કુલ - ૬૪ નંગ.
- સુકવણીની હવાનું તાપમાન : $૫૩ \pm ૨^\circ$ સે.
- સુકવણીની હવાના તાપમાનમા મેળવી શકાતો વધારો: ૨૫.૯° સે. (શિયાળામાં) અને ૨૮.૮° સે. (ઉનાળામાં).
- સોલાર કલેક્ટર (પૅકલ્પિક) : ૩ નંગ (૧.૨૨ મીટર $\times$ ૨.૪૪ મીટર).
(પ્રાધ્યાપક અને વડા, રીન્યુએબલ એનર્જી ઈજનેરી વિભાગ, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, જૂ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ)

૭.૭ દિવેલા અને તુવેરના પાકના અવશેષોનું ગેસીફિકેશન દ્વારા ગેસ અને બાયોચારનું ઉત્પાદન

ખેડૂતો અને ઉદ્યોગસાહસિકો ને જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસાવેલ ઓપન કોર ડાઉનડ્રાફ્ટ ગેસીફાયરમાં દિવેલા અને તુવેરની સાઠીના ટુકડાનો ઉપયોગ કરી બાયોચાર બનાવવા ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ ગેસીફાયરમાં દિવેલા અને તુવેર માટે ૨૨ મીટર^૩/કલાક ગેસ

પ્રવાહનાં દરે અનુક્રમે ૭૧.૪૪% અને ૭૩.૨૮% મહત્તમ ગેસિફિકેશન કાર્યક્ષમતા તથા ૨૧.૫૬% અને ૨૧.૭૮% સારો બાયોચાર જેમાં ૫૯.૬૧% અને ૪૯.૨૨% સ્થિર કાર્બન હોવાથી ઉત્પાદન મેળવવા ભલામણ કરવામાં આવે છે. બાયોચારની કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ (CF) એક ટન ફીડસ્ટોક દીઠ ૧.૬૭ ટન CO₂ નો ચોખ્ખો ઘટાડો કરે છે.



(પ્રાધ્યાપક અને વડા, રીન્યુએબલ એનર્જી ઈજનેરી વિભાગ, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)

૭.૮ એગ્રી વોલટેક સિસ્ટમ હેઠળ પાકો અને છાયડો પ્રતિકારક શાકભાજી પાકોનું ઉત્પાદન

ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોને આખા વર્ષ દરમિયાન એકજ જમીન પર; કપાસ, મગફળી અને કાકડી જેવા પાકોની ખેતી સાથે વીજળી ઉત્પાદન દ્વારા વધારાની આવક મેળવવા માટે એગ્રીવોલ્ટેઇક સિસ્ટમ નું જુ.ફ.યુ. મોડલ નો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.



(પ્રાધ્યાપક અને વડા, રીન્યુએબલ એનર્જી ઈજનેરી વિભાગ, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)

૮. અન્ય

૮.૧ નર્સરીમેન ઉપયોગી ભલામણ

ગુજરાતના નર્સરીમેનને આથી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે,



અગ્નિમંથાના કટકાને ૪૫૦ પી.પી.એમ. આઈ.બી.એ (IBA) (૭૩.૩૩ % સ્કુરણ) અથવા ૪૫૦ પી.પી.એમ. આઈ.આઈ.એ. (IAA) (૭૦.૬૭ % સ્કુરણ) ૪૫૦ મીલી ગ્રામ એક લીટર પાણીમાં ૧૫ મિનિટ સુધી છોડ વૃદ્ધિ નિયંત્રકનાં દ્રાવણમાં બોળીને વાવવાથી સારો ઉગાવો જોવા મળે છે.

(આચાર્ય અને ડીન, બાગાયત મહાવિદ્યાલય, જૂ.ફ.યુ., જૂનાગઢ)

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની સમગ્ર ગુજરાત માટે સંશોધન ભલામણો-૨૦૨૪

૧. પાક સુધારણા

૧.૧ મકાઈ: ગુજરાત મકાઈ હાઈબ્રીડ ૫ (જીએમએચ ૫: પાનમ ગોલ્ડ)

ગુજરાતમાં મકાઈ પાકનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને ખરીફ ઋતુમાં ગુજરાત મકાઈ હાઈબ્રીડ ૫ (જીએમએચ ૫ : પાનમ ગોલ્ડ) નું વાવતેર કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ સંકર જાત સરેરાશ ૭૦૯૪ કી.ગ્રા./હેક્ટર દાણાનું ઉત્પાદન આપે છે. જે અંકુશ જાતો ગુજરાત આણંદ પીળી મકાઈ હાઈબ્રીડ ૧ (જીએવાયએમએચ ૧) અને બાયો-૬૦૫ કરતાં અનુક્રમે ૪૪.૭ અને ૩.૫% વધારે ઉત્પાદન આપે છે. આ જાત મધ્યમ પાકતી તથા નારાંગી રાંગના અને વધારે વજન વાળા દાણા (૩૬૭ ગ્રામ/૧૦૦૦ દાણા) ધરાવે છે જેમાં ૬૯.૪૫% સ્ટાર્ચ, ૧૨.૫૫% પ્રોટીન, ૪.૮૫% તેલ, ૦.૫૯% ટ્રીપ્ટોફેન અને ૨.૬૭% પ્રોટીનમાં લાયસીન જોવા મળેલ છે. આ જાત પાનનો સુકારો અને થડના કોહવારા સામે મધ્યમ પ્રતીકારક શક્તિ ધરાવે છે.

(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, એમએમઆરએસ, આફ્યુ., ગોધરા)

૧.૨ કપાસ: ગુજરાત દેશી કપાસ ૫ (જીડીસી ૫: આણંદ કંચન)

બિનપિયત દેશીકપાસની ખેતી કરતા ગુજરાતના ખેડૂતોને વધુ ઉત્પાદન અને ૩ની સારી ગુણવત્તા ધરાવતી જાત ગુજરાત દેશી કપાસ ૫ (જીડીસી ૫: આણંદ કંચન)ની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ નવી જાતની કપાસની ઉત્પાદકતા ૧૩૭૫ કિ.ગ્રા./હેક્ટર છે જે અંકુશ જાતો



જી.કોટ.૨૧, જીએડીસી ૨ અને જીએડીસી ૪ કરતા અનુક્રમે ૫.૮, ૨૦.૩ અને ૨૪.૮% વધુ આવે છે. જીડીસી ૫ જાતની રૂની ટકાવારી ૩૪.૨, તારની લંબાઈ ૨૭.૩ મિ.મી., માઈક્રોનીયર ૪.૨ એમ.વી. અને ટેનાસીટી ૨૬.૬ ગ્રામ/ટેક્સ ધરાવે છે.

(સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, આરસીઆરએસ, આફ્યુ., વિરમગામ)

૧.૩ મરચી: ગુજરાત શાકભાજી સંકર મરચી ૨ (જીવીસીએચ ૨: આણંદ સુર્યા)

ગુજરાતમાં લીલા મરચાંની ખેતી કરતાં ખેડૂતો ને ખરીફ-રવી ઋતુ દરમિયાન ગુજરાત શાકભાજી સંકર મરચી ૨ (જીવીસીએચ ૨: આણંદ સુર્યા) નું વાવેતર કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ સંકર જાતમાં લીલા મરચાંનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૯૮.૯૬ કિવ./હે. જોવા મળેલ છે જે અંકુશ જાત જીએવીસીએચ ૧ અને જીએવીસી ૧૧૨ કરતા અનુક્રમે ૨૨.૬૪ અને ૫૨.૭૮% વધારે માલુમ પડેલ છે. આ જાતના મરચાં પાકતા પહેલા આછા લીલા રંગના તથા તેની છાલ મધ્યમ કરચલીવાળી, મધ્યમ ખરબચડી સપાટી ધરાવતી તેમજ વધુ ચળકાટ ધરાવે છે. આ જાતમાં ૦.૧૬૦% કુલ એન્ટીઓક્સિડેન્ટ એક્ટીવીટી, ૦.૧૯૫% કેપ્સીસીન, ૨.૮૦% કુલ દ્રાવ્ય શર્કરા અને ૦.૦૫૯% ફ્લેવેનોઈડ માલુમ પડેલ છે. આ જાત સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં અંકુશ જાત જીએવીસીએચ ૧ ની સરખામણીમાં પાનનાં કોકડવાનો રોગ અને ફળ કોરી ખાનાર ઇયળથી થતું નુકસાન તેમજ થ્રીપ્સનો ઉપદ્રવ તુલનાત્મક જોવા મળેલ છે.

(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાજી), એમવીઆરએસ, આફ્યુ., આણંદ)

૧.૪ ગલકા: ગુજરાત ગલકા ૩ (જીએસજી ૩: આણંદ મૃદુલા)

ગુજરાતમાં ચોમાસું ઋતુમાં ગલકાની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ગુજરાત ગલકા ૩ (જીએસજી ૩: આણંદ મૃદુલા) જાતનું વાવેતર કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં આ જાતનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૨૬.૭૨ કિવ./ હે જોવા મળેલ છે, જે અંકુશ જાત જીએસજી ૧, જીજેએસજી ૨ અને પુસા ચીકણી કરતા અનુક્રમે ૩૩.૮૮, ૧૯.૫૩ અને ૧૩.૬૯% વધારે મળેલ છે. આ જાતના ફળ મધ્યમ લાંબા, ઘાટા લીલા



રંગના તેમજ સફેદ માવો ધરાવે છે. આ જાતમાં ૨.૧૮% કુલ દ્રાવ્ય શર્કરા, ૯.૩૬ મિગ્રા/૧૦૦ ગ્રામ એસ્કોર્બીક એસીડ અને ૦.૯૭% કુલ પ્રોટીન જોવા મળેલ છે. આ જાતમાં અંકુશ જાત પુસા ચીકણી અને જીજેએસજી ૨ ની સરખામણીમાં પંચરંગીયો, ભૂકીછારો અને તળછારાનો રોગનું નુકશાન સપ્રમાણ તેમજ પાનકોરીયુ અને ફળમાખીનું નુકશાન ઓછું જોવા મળેલ છે.

(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાજી), એમવીઆરએસ, આફ્યુ., આણંદ)

૧.૫ મરચી: ગુજરાત શાકભાજી મોળા મરચાં ૧૩૨ (જીવીએનપીસી ૧૩૨: આણંદ સૌમ્યા)

ગુજરાતમાં ખરીફ-૨વી ઋતુ દરમિયાન લીલા મરચાંની ખેતી કરતાં ખેડૂતોને ગુજરાત શાકભાજી મોળા મરચાં ૧૩૨ (જીવીએનપીસી ૧૩૨: આણંદ સૌમ્યા) જાતનું વાવેતર કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ જાતનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૯૫.૨૬ કિવ./હે. જોવા મળેલ છે જે અંકુશ જાત એવીએનપીસી ૧૩૧ કરતાં ૬૯.૨૩% વધારે માલૂમ પડેલ છે. આ જાતના મરચાં મધ્યમ લીલા રંગના અને મોટા, સ્વાદે મોળા, લીસી સપાટીવાળા તથા વધુ ચળકાટ ધરાવતા માલૂમ પડેલ છે. આ જાતમાં કુલ એન્ટીઓક્સિડેન્ટ એક્ટીવીટી (૦.૧૧૨%) તેમજ કુલ દ્રાવ્ય શર્કરા (૩.૦૦%) વધારે પ્રમાણમાં અને કેપ્સીસીન (૦.૦૮૮%) નું પ્રમાણ અંકુશ જાત એવીએનપીસી ૧૩૧ કરતાં ઓછું ધરાવતા માલૂમ પડેલ છે. આ જાતમાં પાનનાં કોકડવાનો રોગ, ફળ કોરીખાનાર ઇયળ તથા શ્રીપ્સથી થતું નુકશાન અંકુશ જાત એવીએનપીસી ૧૩૧ જેટલું અથવા તેના કરતાં ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળેલ છે.

(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાજી), એમવીઆરએસ, આફ્યુ., આણંદ)

૧.૬ ભીંડા: ગુજરાત ભીંડા ૯ (જીઓ ૯ : આણંદ અનામિકા)

ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસુ અને ઉનાળુ ઋતુમાં ભીંડાની ખેતી કરતાં ખેડૂતોને ગુજરાત ભીંડા ૯ (જીઓ ૯ : આણંદ અનામિકા) જાતનું વાવેતર કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં આ જાતનું ચોમાસું ઋતુમાં સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૩૭.૮૬ કિવ./હે. જોવા મળેલ છે, જે અંકુશ જાતો જીએઓ ૫, જીઓ ૬, પુસા સાવની અને જીએઓ ૮ કરતાં અનુક્રમે ૨૨.૩૩, ૨૫.૮૪, ૩૩.૦૪ અને ૧૭.૨૦% વધારે છે. આ જાતનું ઉનાળુ



ઋતુમાં સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૧૧.૩૧ કિવ./હે. જોવા મળેલ છે, જે અંકુશ જાતો જીએઓ ૫, જીઓ ૬, પુસા સાવની અને જીએઓ ૮ કરતા અનુક્રમે ૨૨.૩૧, ૨૯.૬૬, ૩૪.૨૫ અને ૧૨.૪૮% વધારે છે. ઓછી ઉચાઈ ધરાવતા આ જાતના છોડમાં બે ગાંઠો વચ્ચેનું ઓછું અંતર, પાંદડા લાંબા અને પહોળા ઉંડા ખાંચાવાળા હોય છે. આ જાતની શીંગો ઘાટા લીલા રંગની, કુણી, મધ્યમ લંબાઈની અને પાતળી ટોચ ધરાવતી હોય છે. આ જાતમાં ૨.૭૧૫% કુલ દ્રાવ્ય શર્કરા, ૦.૧૧૨% ફીનોલ, ૦.૨૦૭% એન્ટીઓક્સીડન્ટ એક્ટીવીટી અને ૧૪.૪૭ ગ્રામ/કિ. મ્યુસીલેજ નું પ્રમાણ માલૂમ પડેલ છે જે અંકુશ જાતો સાથે તુલનાત્મક છે. આ જાતમાં પીળી નસનો પચરંગીયો, એનેસન પાનનો કોકડવા રોગ, લીલા તડતડીયા, સફેદ માખી તથા ડુંખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઇયળનો ઉપદ્રવ અંકુશ જાતો જીએઓ ૫, જીઓ ૬, પુસા સાવની, જીએઓ ૮ અને રોગ ગ્રાહ્ય જાત (એનેસન પાનનો કોકડવા રોગ) એઓએલ ૨૩-૦૧ કરતાં ઓછો જોવા મળે છે.

(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (શાકભાજી), એમવીઆરએસ, આફ્યુ., આણંદ)

૨. પાક ઉત્પાદન/કુદરતી સ્ત્રોત વ્યવસ્થાપન

૨.૧ ડુંગળીના ઘરૂંમાં નીંદણ વ્યવસ્થાપન

ડુંગળીના ઘરૂં બે હાર વચ્ચે ૧૦ સે.મી. અંતર રાખી ઉછેરવા માગતા ગુજરાતના ખેડુતોને અસરકારક નીંદણ વ્યવસ્થાન, ફેરોપણી લાયક વધુ ઘરૂં અને વળતર મેળવવા માટે નીચેના પૈકી કોઈ એક નીંદણ વ્યવસ્થાપન અપનાવવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

- વાવણી બાદ ૧૦-૧૫ દિવસે પ્રોપાકવીઝાફોપ ૫% + ઓક્સિફ્લુરેઈન ૧૨% ડબલ્યુ/ડબલ્યુઈસી (પ્રિમિક્ષ) ૪૩.૭૫+૧૦૫ ગ્રામ સક્રિય તત્વ/હે (૧૭.૫ મિ.લિ./૧૦ લિટર પાણી)
- વાવણી બાદ ૧૦-૧૫ દિવસે ઓક્સિફ્લુરેઈન ૨૩.૫% ઈસી ૮૦ ગ્રામ સક્રિય તત્વ/હે (૬.૮ મિ.લિ./૧૦ લિટર પાણી)
- વાવણી બાદ ૧-૨ દિવસે પેન્ડીમિથાલીન ૩૦% ઈસી ૩૦૦ ગ્રામ સક્રિય તત્વ/હે (૨૦ મિ.લિ./૧૦ લિટર પાણી)
- ૧૫ અને ૩૦ દિવસે હાથ નીંદામણ



ડુંગળીના ઘરૂવાડિયામાં છંટકાવ કરેલ નીંદણ નાશકોની કોઈ પણ પ્રકારની આડ અસર તેના પછીના પાકો ઉપર જોવા મળેલ નથી (ઘઉં, ચણા અને રાઈ).

(એગ્રોનોમીસ્ટ અને પીઆઈ, એઆઈસીઆરપી વીડ મેનેજમેન્ટ, બીએસીએ, આઈયુ., આઈંદ)

૨.૨ ડુંગળીમાં નીંદણ વ્યવસ્થાપન

ગુજરાતમાં શિયાળુ ડુંગળીનું ફેરોપણીથી વાવેતર કરતા ખેડૂતોને ડુંગળીમાં અસરકારક નીંદણ વ્યવસ્થાપન, વધુ ઉત્પાદન અને વળતર મેળવવા માટે નીચેના પૈકી કોઈ એક નીંદણ વ્યવસ્થાપન અપનાવવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

- ફેરોપણી બાદ ૨૫-૩૦ દિવસે પ્રોપાકવીઝાફોપ ૫% + ઓકિસફ્લુઈન ૧૨% W/W EC (પ્રિમિક્ષ) ૪૩.૭૫+૧૦૫ ગ્રામ સક્રિય તત્વ/હે (૧૭.૫ મિ.લિ./૧૦ લિટર પાણી)
- ફેરોપણીના ૨-૩ દિવસ પહેલાં પેન્ડીમિથાલીના ૩૦% EC ૫૮૦.૫ ગ્રામ સક્રિય તત્વ/હે (૩૦ મિ.લિ./૧૦ લિટર પાણી) અને ફેરોપણી બાદ ૨૫-૩૦ દિવસે ઓકિસફ્લુઈન ૨૩.૫% EC ૧૨૦ ગ્રામ સક્રિય તત્વ/હે (૧૦.૨ મિ.લિ./૧૦ લિટર પાણી)
- ફેરોપણીના ૨-૩ દિવસ પહેલાં ઓકિસફ્લુઈન ૨૩.૫% EC ૧૨૦ ગ્રામ સક્રિય તત્વ/હે (૧૦.૨ મિ.લિ./૧૦ લિટર પાણી) અને ફેરોપણી બાદ ૨૫-૩૦ દિવસે પ્રોપાકવીઝાફોપ ૫% + ઓકિસફ્લુઈન ૧૨% W/W EC (પ્રિમિક્ષ) ૪૩.૭૫+૧૦૫ ગ્રામ સક્રિય તત્વ/હે (૧૭.૫ મિ.લિ./૧૦ લિટર પાણી)
- ફેરોપણી બાદ ૨૦ અને ૪૦ દિવસે હાથ નીંદામણ

શિયાળુ ડુંગળીના પાકમાં છંટકાવ કરેલ નીંદણનાશકોની કોઈપણ પ્રકારની આડઅસર તેના પછીના પાકો (બાજરી, મકાઈ અને મગ) પર જોવા મળેલ નથી.

(એગ્રોનોમીસ્ટ અને પીઆઈ, એઆઈસીઆરપી વીડ મેનેજમેન્ટ, બીએસીએ, આઈયુ., આઈંદ)

૩. પાક સંરક્ષણ

૩.૧ નર્સરીમાં ટામેટીના ઘરૂને નુકસાન કરતા ગંઠવા કૃમિનું પર્યાવરણ અનુકૂળ વ્યવસ્થાપન

ગુજરાતમાં ટામેટીનું ઘરૂ ઉછેરતા ખેડૂતોને ગંઠવા કૃમિના અસરકારક વ્યવસ્થાપન તેમજ તંદુરસ્ત રોપવા લાયક ઘરૂ વધુ મેળવવા માટે ૧૫ દિવસ પહેલા જમીનમાં લીંબોળીના ખોળનો ભૂકો પ્રતિ ૨૦૦ ગ્રામ/ચો. મીટર ઘરૂવાડીયાના વિસ્તારમાં આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, કૃમિશાસ્ત્ર વિભાગ, બીએસીએ, આફયુ., આણંદ)

૩.૨ બીડી તમાકુમાં ગંઠવા કૃમિના રોગને નિયંત્રિત કરવા પ્રતિકારક બીડી તમાકુ સાથે રોટેશનલ અભ્યાસ

બીડી તમાકુની ખેતી કરતા ખેડૂતો કે જેઓનાં ખેતરો ગંઠવા કૃમિથી રોગગ્રસ્ત છે તેઓને ગંઠવા કૃમિના અસરકારક વ્યવસ્થાપન માટે સતત ચાર વર્ષ માટે ગંઠવા કૃમિ ગ્રાહ્ય જાતોને બદલે આણંદ બીડી તમાકુ ૧૦ (ગંઠવા કૃમિ પ્રતિકારક) જાત વાવવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(સહ સંશોધન યૈજ્ઞાનિક (કૃમિશાસ્ત્ર) બીટીઆરએસ, આફયુ., આણંદ)

૪. બાગાયત અને વનીકરણ

૪.૧ ફોકસટેલ પામના બીજાંકુરણ ઉપર બીજ માવજતની અસર

નર્સરી ધારકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, ફોકસટેલ પામના બીજને બે દિવસ (૪૮ કલાક) સુધી ૧૦૦૦ પી. પી. એમ. જીબ્રેલીક એસિડ (૧૦૦૦ મિ. ગ્રા. ૧ લિટર પાણી) ના દ્રાવણમાં ડુબાડી કોથળીમા રોપ્યા બાદ વોક-ઈન ટનેલ માં ઉછેરવામાં આવે તો બીજનો વહેલો ઉગાવો અને વધુ જીવંત છોડ મળે છે.

(આચાર્ય, બાગાયત મહા વિદ્યાલય, આફયુ., આણંદ)

૪.૨ બીજ માવજતની ફિશ ટેલ પામના બીજાંકુરણ ઉપર અસર

નર્સરી ધારકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, ફિશ ટેલ પામના બીજને એક દિવસ (૨૪ કલાક) સુધી ૧૦૦૦ પી. પી. એમ. જીબ્રેલીક એસિડ (૧૦૦૦ મિ. ગ્રા. / ૧ લિટર પાણી) ના દ્રાવણમાં ડુબાડીને રાખ્યા બાદ નેચરલી વેન્ટિલેટેડ પોલી હાઉસમાં ઉછેરવામાં આવે તો બીજનો વહેલો ઉગાવો, વધુ જીવંત અને સારી ગુણવત્તાવાળા રોપા મળે છે.

(આચાર્ય, એસડીએમ પોલિટેકનિક, આફ્યુ., વડોદરા)

૪.૩ મોગરાની કલમના વિકાસ ઉપર આઈબીએની માવજતની અસર

નર્સરી ધારકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, શિયાળામાં (ડિસેમ્બર) મોગરાના અર્ધકાષ્ઠમય કટકા ના (સેમી હાર્ડવૂડ કટિંગ) નિચેના છેડાને આઈ.બી.એ. ૧૫૦૦ મિ.ગ્રા પ્રતિ ૧ લિટર પાણીના દ્રાવણમાં ૫ મિનિટ ડૂબાડીને રોપ્યા બાદ નેચરલી વેન્ટિલેટેડ પોલીહાઉસમાં રાખવાથી વહેલો ઉગાવો અને વધુ જીવંત છોડ મળે છે.

(આચાર્ય, એસડીએમ પોલિટેકનિક, આફ્યુ., વડોદરા)

૪.૪ જાંબુની કલમ ઉપર મૂળકાંડની ઊંચાઈ અને પોલિટ્યુબ કેપની અસર

નર્સરી ધારકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, જાંબુના ૧૫ મહિના જૂના મૂળકાંડને નવેમ્બર માસના પહેલા અઠવાડિયામાં ૨૦ સેમી ઊંચાઈએથી નુતન કલમ કરીને નેચરલી વેન્ટિલેટેડ પોલીહાઉસમાં રાખવાથી વધારે ઊંચાઈની કલમ તેમજ વૃદ્ધિ સારી થાય છે અને વધુ સંખ્યામાં જીવિત કલમો મળે છે.

(આચાર્ય, એસડીએમ પોલિટેકનિક, આફ્યુ., વડોદરા)

૫. કૃષિ ઈજનેરી/ ફુડ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજી અને બાયો એનર્જી / એગ્રી ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી/ પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ ટેકનોલોજી

૫.૧ લસણના સંગ્રહ માટે છિદ્રવાળી જાળીદાર કોઠીના ઉપયોગની ભલામણ



ઉત્પાદનકર્તા, ભોજનાલયના માલિકો અને છૂટક વેપારીઓને ૫૦ કિલો લસણનો ૨૧.૯૯% ની ઘટ સાથે ઓછામાં ઓછા ૦૬ મહિના સુધી સંગ્રહ માટે આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ ૦૬મીલી મીટર છિદ્રવાળી જાળીદાર કોઠીનો (૮૦૫ mm ઊંચાઈ x ૪૭૦ mm વ્યાસ) ઉપયોગ કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(પીઆઈ અને વિભાગીય વડા, પીએફઈ, કોલેજ ઓફ એગ્રિકલ્ચરલ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી, આફ્યુ., ગોધરા)

૫.૨ બાયકેસિયલ સોલાર ફોટોવોલ્ટેઇક મોડ્યુલ્સના ઉર્જા ઉત્પાદનનો પ્રાયોગિક અભ્યાસ અને મોનોક્રેસિયલ સોલાર ફોટોવોલ્ટેઇક મોડ્યુલ્સ સાથે તેની સરખામણી

સોલાર ફોટોવોલ્ટેઇક મોડ્યુલ્સ ફીટીંગ કરનાર (ઇન્સ્ટોલર્સ) અને સોલાર ફોટોવોલ્ટેઇક સિસ્ટમમાં રસ ધરાવતા ગ્રાહકોને આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ દ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રાયોગિક કાર્યોને આધારે ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, બાયકેસિયલ સોલાર ફોટોવોલ્ટેઇક મોડ્યુલ્સને દક્ષિણ દિશા તરફ બે ફૂટની ઊંચાઈ પર ૦.૨૫ થી ૦.૩૦ની વચ્ચે લઘુત્તમ અલ્બેડો ધરાવતી પ્રતિબિંબીત (સફેદ) સપાટી જેતે સ્થળના અક્ષાંશના કોણ જેટલા જ કોણ રાખીને પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે તો મોનો ફેસીઅલ સોલાર ફોટોવોલ્ટેઇક મોડ્યુલ્સની સરખામણીએ બાયકેસિયલ સોલાર ફોટોવોલ્ટેઇક પેનલ્સથી ૧૮-૨૦ ટકા વધુ ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે અને એ એક અને પાંચ ફૂટ બાય ફેસિયલ સોલાર ફોટોવોલ્ટેઇકની સરખામણીએ અનુક્રમે ૧૫-૧૬ ટકા અને ૧૯-૨૦ ટકા વધુ ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે

(પીઆઈ અને વિભાગીય વડા, બીઈએએસ, કોલેજ ઓફ એગ્રિકલ્ચરલ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી, આફ્યુ., ગોધરા)

૫.૩ રાજગરા ચુક્ત પોષક નાસ્તો બનાવવા ઉત્તોદન (extrusion) તકનીક

રાજગરા ચુક્ત પોષક નાસ્તો બનાવવામાં રસ ધરાવતા ઉદ્યોગ સાહસિકો અને ખાદ્ય પ્રક્રિયકોને આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ દ્વારા વિકસાવેલ ઉત્તોદન (extrusion) તકનીક અપનાવવાની સલાહ છે. આ



તકનીક માં કકરા દળેલા રાજગરાનાં લોટ (૪૦%), ચોખાનો લોટ (૩૦%) અને મકાઈનો લોટ (૩૦%) ને મિશ્રિત કરી તેમાં લેજનું પ્રમાણ ૧૫% નિયમિત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ મિશ્રણને ઉત્તોદન મશીન (સ્ક્રૂસ્પીડ: ૨૮૭.૫ આરપીએમ, બેરલ તાપમાન: ૧૧૮ઓસે.)માંથી પસાર કર્યા બાદ, ઓવનમાં ૬૦ઓસે. તાપમાને એક કલાક સુધી સૂકવવામાં આવે છે. આ પોષક એક્સટ્રુડેડ નાસ્તામાં ૧૨.૨% પ્રોટીન, ૪.૮% ચરબી, ૪.૯ મિ.ગ્રા./૧૦૦ ગ્રામ, લોહતત્વ, ૪.૯ મિ.ગ્રા./૧૦૦ ગ્રામ કેલ્શિયમ, ૩.૯ મિ.ગ્રા./૧૦૦ગ્રામ જસત તત્વ અને ૪૬૯.૩ મિ.ગ્રા./૧૦૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ રહેલું છે. આ ઉત્પાદ સામાન્ય તાપમાને ૯૦ દિવસ સુધી સ્વીકાર્ય રહે છે. ૧૦૦ ગ્રામ રાજગરા યુક્ત પોષક નાસ્તાની કુલ કિંમત આશરે રૂ. ૬.૪૨ જેટલી છે.

(પીઆઈ અને વિભાગીય વડા, એફપીટી વિભાગ, એફપીટી બીઈ આફ્યુ., આણંદ)

પ.૪ સરગવાની સીંગના માવાના થર્મલ પ્રોસેસિંગનું સ્ટાન્ડર્ડાઈઝેશન અને ખાદ્ય ઉત્પાદનોમાં તેનો ઉપયોગ

ભાગ-૧:

સરગવાની સીંગના માવાના પ્રોસેસિંગમાં રસ ધરાવતા ઉદ્યોગકારો અને ખાદ્ય પ્રક્રિયકોને આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં પરિપક્વ સરગવાની સીંગને પાણીથી ઘોઈ, કટકા કર્યા બાદ બ્લેન્ડિંગ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ બ્રશ પ્રકારના પલ્પરનો ઉપયોગ કરીને માવો કાઢવામાં આવે છે, આ માવાને રિટોર્ટેબલ પાઉચમાં ભરી, પાઉચને વરાળ માંથી પસાર (એક્ઝોસ્ટિંગ) કરી, પાઉચને સીલ કરીને રીટોર્ટમાં F05 ૫ મિનિટ સુધીમાં થર્મલ પ્રોસેસિંગ કરવામાં આવે છે. આ રીતે પ્રોસેસ અને પેક કરેલ સરગવાનું ઉત્પાદ સામાન્ય વાતાવરણમાં ૧૨ મહિના સુધી સ્વીકાર્ય રહે છે.

ભાગ-૨:

સરગવાની સીંગના માવાની ચટણીના ઉત્પાદનમાં રસ ધરાવતા ઉદ્યોગકારો અને ખાદ્ય પ્રક્રિયકોને આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં



આવે છે. સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોથી ભરપૂર સરગવાના માવાની ચટણી ૬૨ % સરગવાનો માવો તેમજ અન્ય ઘટકો સાથે તૈયાર કરી શકાય છે. ચટણીને ગરમ કર્યાબાદ મેટલાઈઝ્ડ લેમિનેટેડ પોલિએસ્ટર પાઉચમાં ભરી પેક કરવામાં આવે છે. આ ચટણીને ૭° સે તાપમાને ૧૩૭ દિવસ અને ૩૦° સે તાપમાને ૮૩ દિવસ સાચવી શકાય છે.

(પીઆઈ અને વિભાગીય વડા, એફપીટી વિભાગ, એફપીટી & બીઈ આફ્યુ., આણંદ)

૫.૫ જુવારા આધારીત મલ્ટિગ્રેઈન બિસ્કિટ બનાવવા

મલ્ટિગ્રેન ગ્લુટેનફ્રી બિસ્કિટના ઉત્પાદનમાં રસ ધરાવતા બેકરી ઉત્પાદક અને ઉદ્યોગ સાહસિકોને આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ દ્વારા વિકસિત તકનીકનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ તકનીકમાં ૬૫ % જુવારનો લોટ, ૨૦ % સોયાબીનનો લોટ અને ૧૫ % ઓટનો લોટ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ બિસ્કિટમાં ૧૧.૬૯ % પ્રોટીન અને ૨.૫૭ % ફાઇબર મળે છે. પોલીપ્રોપીલીન અને એલ્યુમીનીયમ લેમિનેટ્સમાં પેક કરી ૩૦±૧° સે. તાપમાને ૬૦ દિવસ સુધી બિસ્કિટનો સંગ્રહ કરી શકાય છે.

(પીઆઈ અને વિભાગીય વડા, એફપીટી વિભાગ, એફપીટી & બીઈ આફ્યુ., આણંદ)

૫.૬ મિલેટ્સના ઉપયોગથી પિટ્ઝાનો બેઝ બનાવવો

મિલેટપીઝા બેઈઝના ઉત્પાદન માં રસ ધરાવતા બેકરી ઉદ્યોગકારો અને ઉદ્યોગસાહસિકોને આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા ભલામણ છે. જેમાં ૪૦% મેંદો, ૩૫% જુવારનો લોટ, ૧૫% મોરિયાનો લોટ અને ૧૦% કોદરીનો લોટ ઉમેરી તૈયાર કરેલા મિલેટ પીઝા બેઈઝમાં સામાન્ય પીઝા બેઈઝ કરતા પ્રતિ ૧૦૦ ગ્રામ ૨.૦૬ ગ્રામ (૬૮.૯૦%) એશ અને ૨.૧૯ ગ્રામ (૧૦૬.૮૦%) રેષા વધુ મળે છે. મિલેટ પીઝા બેઈઝની એન્ટીઓક્સિડેન્ટ એક્ટીવીટી સામાન્ય પીઝા બેઈઝ કરતા વધુ મળેલ છે. આવા બેઈઝને પોલોથીલીન પાઉચમાં પેક કરી ૩મ તાપમાને ૪ દિવસ સુધી સંગ્રહ કરી શકાય છે.

(પીઆઈ અને વિભાગીય વડા, એફપીટી વિભાગ, એફપીટી & બીઈ આફ્યુ., આણંદ)



નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની સમગ્ર ગુજરાત માટે સંશોધન ભલામણો - ૨૦૨૪

૧. ધાન્ય પાકો

૧.૧ ડાંગરના પર્ણરહેદના સુકારાનું(શીથબ્લાઈટ) રાસાયણિક નિયંત્રણ

ગુજરાતમાં ડાંગર ખેતી કરતા ખેડૂતોને પર્ણરહેદનો સુકારાના (શીથ બ્લાઈટ) અસરકારક નિયંત્રણ માટે એઝોકસીસ્ટ્રોબીન ૧૮.૨ + ડાયફેનકોનાઝોલ



૧૧.૪ (૨૯.૬ એસસી) ૦.૦૩ % (૧૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી) અથવા ટ્રાયફ્લોકસીસ્ટ્રોબીન ૨૫ + ટેબુકોનાઝોલ ૫૦ (૭૫ ડબલ્યુ), ૦.૦૩ % (૪ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી) ના બે છંટકાવ પૈકી પહેલો છંટકાવ રોગની શરૂઆત થાય ત્યારે અને ત્યારબાદ બીજો છંટકાવ ધ્વજ પર્ણદંડ (બુટ લીફ સ્ટેજ) અવસ્થાએ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(મુખ્ય યોજા સંશોધન કેન્દ્ર, જળ અને જમીન વ્યવસ્થાપન સંશોધન એકમ, ન.કૃ.યુ., નવસારી)

૧.૨ જુવારની નવી જાત: ગુજરાત જુવાર-૧૦૩ (જીજે-૧૦૩: સુરતી પોંક-૧)

ગુજરાત રાજ્યમાં પોંકની જુવાર પકવતા ખેડૂતોને શિયાળુ ઋતુમાં જુવારની જાત જી.જે. ૧૦૩ (સુરતી પોંક-૧) નું વાવેતર કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. પોંકની આ સુચિત જાત શિયાળુ ઋતુમાં સરેરાશ ૨૪૬૫ કિ./હે. પોંક માટેના



દાણા, ૧૫૪૪ કિ./હે. પરિપક્વ દાણા અને ૯૧૭૪ કિ./હે. સુકા ઘાસચારાનું ઉત્પાદન મળેલ છે. જે અંકુશ જાતો વાની લોકલ અને કુલે મધુર કરતા અનુક્રમે પોંકના દાણાના ઉત્પાદનમાં ૧૯.૯% અને ૪૫.૧%, પરિપક્વ દાણાના ઉત્પાદનમાં ૧૯.૬% અને ૬૦.૦% તથા સુકા ઘાસચારાના ઉત્પાદનમાં ૧૧.૬% અને ૨૧.૪% વધુ છે. આ જાતના પોંક માટેના દાણામાં અંકુશ જાતો કરતા વધારે પ્રોટીન છે તથા દાણા પોચા, આકર્ષક ઘટ્ટ લીલા રંગના અને મીઠા છે. જુવારની આ સુચિત જાતમાં ગાભમારાની ઈચળ અને સાંઠાની માખીનો ઓછો ઉપદ્રવ તથા રાતડો, પાનનો સુકારો અને ગુંદરીયો રોગો સામે મધ્યમ પ્રતિકારકતા જોવા મળેલ છે.

(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (જુવાર), મુખ્ય જુવાર સંશોધન કેન્દ્ર, ન.કુ.યુ., સુરત)

૧.૩ જુવારની નવી જાત: સી.એસ.વી. ૫૫ (ગુજરાત ગોટી)

ગુજરાત રાજ્યમાં દાણાની જુવારની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ચોમાસુ ઋતુ માટે જુવારની જાત સી.એસ.વી. ૫૫ (ગુજરાત ગોટી)નું વાવેતર કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. જુવારની આ જાત ચોમાસુ ઋતુ પિચત પરિસ્થિતિમાં સરેરાશ ૨૬૩૧ કિ./હે. દાણા અને ૧૬૦૮૪ કિ./હે. સુકા ઘાસચારાનું ઉત્પાદન આપે છે. જે દાણાના ઉત્પાદનમાં ચોમાસુ અંકુશ જાતો જી.એન.જે. -૧, જી.જે.-૪૩, જી.જે.-૪૪ (મધુ), સી.એસ.વી. ૨૦ અને સી.એસ.વી. ૪૧ કરતા અનુક્રમે ૧૪.૭%, ૧૫.૧%, ૧૩.૦%, ૧૯.૧% અને ૧૪.૧% વધુ છે તથા સુકા ઘાસચારાના ઉત્પાદનમાં ચોમાસુ અંકુશ જાતો જી.એન. જે. -૧, જી.જે.-૪૩, જી.જે.-૪૪ (મધુ) અને સી.એસ.વી. ૨૦ અનુક્રમે ૨૮.૮%, ૩.૩%, ૩૭.૨% અને ૫.૬% વધુ છે. વધુમાં, જુવારની આ જાતમાં ગાભમારાની ઈચળનો ઓછો ઉપદ્રવ તથા રાતડો અને મધીયાના રોગો સામે આંશિક પ્રતિકારકતા જોવા મળેલ છે.



(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (જુવાર), મુખ્ય જુવાર સંશોધન કેન્દ્ર, ન.કુ.યુ., સુરત)



૧.૪ બંટીની નવી જાત: જી.બી.-૨ (શબરી)

ગુજરાતમાં બંટીની ખેતી કરતાં વિસ્તારમાં ચોમાસા ઋતુમાં બંટીની જાત જી.બી.-૨ (શબરી)ની વાવેતર માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. બંટીની જાત જી.બી.-૨ (શબરી)માં દાણાનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૯૫૭ કિ.ગ્રા./હેક્ટર આવે છે, જે એકંદરે સ્થાનિક જાત જી. બી.-૧ અને કુલે બંટી કરતાં અનુક્રમે ૧૮.૭૫%, ૨૩.૨૧% તથા રાષ્ટ્રીય કક્ષાની જાત વી. એલ.-૧૭૨ અને વી. એલ.-૨૦૭ કરતાં અનુક્રમે ૧૪.૭૬%, ૧૩.૦૭% વધારે ઉત્પાદન આપે છે. આ જાતમાં પ્રોટીન (૮.૪૫ ગ્રામ/૧૦૦ ગ્રામ), લોહતત્વ (૮.૨૬ મી.ગ્રા./૧૦૦ ગ્રામ), ઝીંક (૨.૮૮ મી.ગ્રા./૧૦૦ ગ્રામ) અને કેલ્શિયમ (૨૨.૩ મી.ગ્રા./૧૦૦ ગ્રામ)નું પ્રમાણ અંકુશ જાતો કરતાં વધારે નોંધાયેલ છે. આ જાત આકર્ષક મોટા ભરાવદાર દાણાવાળી, એકસરખી પરીપક્વતા ધરાવતી, દાણા ખરી જવા તેમજ ઢળી પડવા સામે પ્રતિકારકતા ધરાવતી હોવાથી વધુ ઉત્પાદન આપે છે. આ જાત પર્ણ અને ગાંઠના કરમોડીના રોગ તેમજ દાણા તથા કણસલાના આંજિયાના રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારકતા અને સાંઠાની માખી સામે પ્રતિકારકતા ધરાવે છે.



(સહ સંશોધન પૈજ્ઞાનિક, હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યુ., વઘઈ)

૧.૫ વરીની નવી જાત : જી.વી.-૫ (માવલી)

ગુજરાતમાં વરીની ખેતી કરતા વિસ્તારમાં ચોમાસું ઋતુમાં વરીની જાત જી.વી.-૫ (માવલી)ની વાવેતર માટે ભલામણ કરવામાં



આવે છે. વરીની જાત જી. વી.-૫ (માવલી)માં દાણાનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૭૪૮ કિ.ગ્રા./ હેક્ટર આવે છે જે એકંદરે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની જાત જે.કે.-૮ અને ઓ. એલ. એમ.- ૨૦૩ કરતા અનુક્રમે ૩૧.૩૫% અને ૧૦.૫૫% વધારે છે તથા જે એકંદરે સ્થાનિક જાત જી. વી.-૪ કરતાં પ્રતિ દિવસ ઉત્પાદકતા મુજબ ૧૨.૭૮% અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની જાત જે. કે. -૮ અને ઓ. એલ. એમ.-૨૦૩ કરતા અનુક્રમે ૩૧.૩૫% અને ૩૧.૧૭% વધારે છે. આ જાતમાં કેલ્શિયમ (૧૮.૪ મી.ગ્રા./૧૦૦ ગ્રામ), ઝીંક (૩.૮૮ મી.ગ્રા./૧૦૦ ગ્રામ) અને ફૂડ ફાઇબર (૮.૩૬%) નું પ્રમાણ અંકુશ જાતો કરતાં વધારે નોંધાયેલ છે. આ જાત (જી.વી.-૫) વહેલી પાકતી, દાણા ખરી જવા તેમજ ઢળી પડવા સામે પ્રતિકારકતા ધરાવે છે. આ જાત પર્ણ અને ગાંઠના કરમોડીના રોગ તેમજ આંજીયાના રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારકતા અને સાંઠાની માખી સામે પ્રતિકારકતા ધરાવે છે.

(સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, હલકાં ધાન્ય સંશોધન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યુ., વઘઈ)

૨. કઠોળ પાકો

૨.૧ તુવેરની જાત : ગુજરાત તુવેર-૧૧૦ (નવતુર)

ગુજરાતનાં ચોમાસું તુવેરનું વાવેતર કરતાં ખેડૂતોને ગુજરાત તુવેર-૧૧૦ (નવતુર) જાતનું વાવેતર કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ જાતનું ચોમાસામાં સરેરાશ ઉત્પાદન ૨૧૩૧ કિ.ગ્રા./હે. આવેલ છે. આ જાત અંકુશ જાત ગુજરાત તુવેર-૧૦૪, ગુજરાત તુવેર-૧૦૮, બીડીએન-૭૧૬, જીજેપી-૧, બીડીએન-૨ અને એજીટી-૨ કરતાં અનુક્રમે ૧૭.૧, ૮.૭, ૧૩.૧, ૭.૬, ૨૫.૪ અને ૩૭.૧ ટકા વધુ ઉત્પાદન આપેલ છે. આ

જાત ૧૭૦-૧૮૦ દિવસમાં પાકતી (મધ્યમ મોડી પાકતી), મધ્યમ ઊંચાઈ, વધુ ઘેરાવો ધરાવતી, લીલી શિંગોવાળી અને પ્રતિ શીંગ ૩-૫ સફેદ રંગના દાણા ધરાવે છે.



આ જાત વધુ ઉત્પાદકતા તેમજ વંધ્યત્વ અને સુકારા સામે મધ્યમ પ્રતિકારકતા ધરાવે છે.

(નોડલ ઓફિસર (મેગાસીડ) અને યુનિટ હેડ, કઠોળ અને દિવેલા સંશોધન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યુ., નવસારી)

૩. રોકડિયા પાકો

૩.૧ બીટી કપાસની હિરસુટમ પ્રકારની સ્થાયી જાત

ગુજરાતનાં પિયત વિસ્તારમાં હિરસુટમ કપાસની બીટી જાત જી.કોટ. ૧૦ કાય ૧ એસીનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૭૪૧ કિ.ગ્રા./ હેક્ટર મળેલ છે. જે નિયંત્રીત જાતો જેવી કે જી.કોટ.૧૦ નોન બીટી, સુરજ બીટી, કુલે ચમુના નોન બીટી અને જીએન. કોટ. ૩૨ નોન બીટી કરતાં અનુક્રમે ૪૯.૫, ૧૩.૯, ૭.૨ અને ૫૭.૨ ટકા વધારે ઉત્પાદન આપેલ છે. જી.કોટ. ૧૦ કાય ૧ એસીનું સ્થૂં સરેરાશ ઉત્પાદન ૬૨૫ કિ.ગ્રા./ હેક્ટર મળેલ છે. આ જાતની સ્થૂં ટકાવારી ૩૫.૮ ટકા છે. આ જાત પાનનાં સુકારાનો રોગ તેમજ પાનનાં ટપકાંના રોગ સામે રોગ રહિતથી લઈને પ્રતિકારાત્મક લક્ષણો ધરાવે છે. આ જાત દહિયાનો રોગ તેમજ પાનનાં ટપકાં સામે પ્રતિકારાત્મક લક્ષણો ધરાવે છે. આ જાતમાં યુસિયા પ્રકારની જીવાતો જેવી કે લીલા તડતડીયા, શિપ્સ, સફેદ માખી અને મોલોમશીનું નુકશાન આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રા કરતા ઓછું જણાયેલ છે, તેમજ લીલા તડતડીયાથી થતા નુકશાનનો ગ્રેડ-૨ જણાયેલ છે. જ્યારે આ જાતમાં જીંડવાની ઇચળનો ઉપદ્રવ નહિવત માલુમ પડેલ છે અને

તેથી જીંડવાની ઇચળથી થયેલ નુકશાન ઘણું ઓછું જણાયેલ છે, તેમજ ગુલાબી ઇચળથી થતું નુકશાન નિયંત્રિત જાતો કરતા ઓછું છે જેથી હિરસુટમ કપાસની બીટી જાત જી.કોટ.૧૦ કાય ૧



એસીને ગુજરાતનાં પિયત વિસ્તારમાં વાવેતર કરવા જી.કોટ.૧૦ બીટી (ગુજરાત કપાસ ૧૦ બીટી) તરીકે એન્ડોર્સમેન્ટ કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (કપાસ), મુખ્ય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર, ન.ફ.યુ., સુરત)

૩.૨ બીટી કપાસમાં ગુલાબી ઈયળની સામે જુદા જુદા સંકલિત કીટ નિયંત્રણના મોડ્યુલની ચકાસણી

ગુજરાતના બીટી કપાસની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, ગુલાબી ઈયળના વ્યવસ્થાપન માટે ગોસીપ્લુર ૪% આરટીયુ ટ્યુબના પટાણા કદના ટપકાઓ (અંદાજીત ૮૦૦ છોડ/હે., ૨૦૦-૨૫૦ ગ્રામ/હે.) એકાંતરે કપાસની હાર છોડીને બે છોડ વચ્ચે ૫ મીટરના અંતરે છોડના અગ્રભાગે (૩ થી ૪ ઈંચ નીચે) મુકવા. આ માવજત વાવણીના ૪૫, ૭૫ અને ૧૦૫ દિવસે આપવી.

(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક (કપાસ), મુખ્ય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર, ન.ફ.યુ., સુરત)

૪. શાકભાજી પાકો

૪.૧ રીંગણની નવી જાત: જી.આર.બી.- ૧૦ (નવનિધિ)

ગુજરાતના મોડી ખરીફ/રવી ઋતુમાં રીંગણનું વાવેતર કરતાં ખેડૂતોને (GRB-10 : નવનિધિ) જાત ભલામણ કરવામાં આવે છે. મધ્યમ મોડી પાકતી રીંગણની જી.આર.બી.- ૧૦ જાતનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૩૯૬.૩૩ નોંધાયેલ છે, જે અંકુશ જાતો જી.એન.આર.બી.-૧, જી.એ.ઓ.બી.-૨, જી.આર.બી.-૫ અને સુવર્ણ મણિ કરતાં અનુક્રમે ૧૧.૮૧%, ૧૦.૯૬%, ૧૬.૧૫% અને

૧૯.૫૬% વધુ ઉત્પાદન આપે છે. આ જીનોટાઇપના ફળો ગોળાકાર, મધ્યમ કદના, ઝાંખા જાંબલી રંગ સાથે મધ્યમ કદની લીલી



ડીંચ ધરાવે છે. રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય અંકુશ જાતોની સરખામણીમાં, આ જાતના ફળોમાં વિટામિન-સી (૨.૬૩ મિલિગ્રામ/૧૦૦ ગ્રામ), રેષા (૧.૬૨%) અને એનથોસાયનિન (૧૯.૩૨ મિલિગ્રામ/૧૦૦ ગ્રામ) વધુ નોંધાયું છે. રીંગણાની જી.આર.બી.- ૧૦ જાતમાં અંકુશ જાતોની સરખામણીએ ઘટ્ટિયાપાનના રોગ તથા ફૂંજ અને ફળ કોરી ખાનારી ઈયળ, તડતડિયાં અને સફેદ માખી જીવાતનો ઓછો ઉપદ્રવ જોવા મળેલ છે.

(પ્રાધ્યાપક, શાકભાજી વિજ્ઞાન વિભાગ, અ.બા.મ.,ન.ફ.યુ., નવસારી)

૪.૨ એફીડોપાઈરોપેન જંતુનાશકના અવશેષમુક્ત રીંગણા ઉત્પાદન માટે છંટકાવ અને ઉતાર વચ્ચેનો સુરક્ષિત સમય ગાળો

ગુજરાતમાં રીંગણામાં એફીડોપાઈરોપેન (૫૦ ગ્રામ/લિ ડીસી) જંતુનાશક ૫૦ ગ્રામ સ.ત./હે. ના દરે વાપરતા ખેડૂતોને એફીડોપાઈરોપેનની મહત્તમ અવશેષ મર્યાદાને (૦.૧૫ મિ.લિ.ગ્રામ/કિલો ગ્રામ) ધ્યાનમાં લેતા, છેલ્લા છંટકાવ અને ઉતાર વચ્ચે ઓછામાં ઓછા એક દિવસનો સમયગાળો રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, ફૂડ ક્વોલિટી ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરી, ન.મ.ફ.મ., ન.ફ.યુ., નવસારી)

૪.૩ ભીંડાની જાત: ગુજરાત ભીંડા-૧૦ (જીઓ ૧૦: પુર્ણા કાંતિ)

ગુજરાતમાં ખરીફ ઋતુમાં ભીંડાની ખેતી કરતાં ખેડૂતોને ગુજરાત ભીંડા-૧૦ (જીઓ ૧૦: પુર્ણા કાંતિ) જાતનું વાવેતર કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં આ જાતનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૧.૬૮ ટન/ હે. મળેલ છે, જે ભીંડાની અંકુશ જાતો જીએઓ-૫, જીઓ-૬, પુસા સાવની, અને જીએઓ ૮ કરતાં અનુક્રમે ૭.૦૬, ૮.૪૨, ૧૪.૫૧ અને ૦.૦૮ ટકા વધુ ઉત્પાદન આપે છે. આ મધ્યમ મોડી પાકતી જાતના ફળ મધ્યમ લાંબા, ઘાટા લીલા રંગના અને છોડનું સાડું બંધારણ (સ્ટ્રક્ચર) ધરાવે છે. આ જાતમાં અંકુશ જાતોની સરખામણીમાં પીળા



પચરંગીયો, ભૂકી છારો અને ઇએલસીવીનો રોગ તેમજ ફળ કોરી ખાનાર ઇયળ, તડતડિયા અને સફેદ માખીનું નુકશાન ઓછું જોવા મળેલ છે.

(પ્રાધ્યાપક, શાકભાજી વિજ્ઞાન વિભાગ, અ.બા.મ.,ન.ફ.યુ., નવસારી)

૪.૪ સુરણની નવી જાત: એન.ઈ.એફ.વાય-૨૫ (ડાંગી સુરણ)

સુરણની જાત એન.ઈ.એફ.વાય-૨૫ ને ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસું ઋતુમાં સુરણની ખેતી કરતા વિસ્તારમાં જી.ઈ.એફ.વાય-૨ (ડાંગી સુરણ) તરીકે ભલામણ કરવામાં આવે છે. સુરણની જાત એન.ઈ.એફ.વાય- ૨૫ નું ગુજરાતમાં સરેરાશ ઉત્પાદન ૪૮.૯૮ ટન/હેક્ટર જેટલું નોંધાયેલ છે, જે રાષ્ટ્રીય અંકુશ જાત ગજેન્દ્ર અને રાજ્ય અંકુશ જાત સ્વાગતા કરતાં અનુક્રમે ૩૦.૬૧ અને ૧૭.૪૯ ટકા વધુ છે. આ જાત નો ગર્ભ ઝાંખા નારંગી રંગનો તેમજ તેમાં સ્ટાર્ચ, પ્રોટીન, સુપાર્ય રેસા, ફીનોલ, એન્ટિઓક્સિડન્ટ, વીટામીન-એ અને સી, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, લોહતત્વ અને ઝીંકનું પ્રમાણ રાષ્ટ્રીય અંકુશ જાત કરતા વધારે નોંધાયેલ છે. આ જાતના કંદ ખાતા ગળામાં બળતરા થતી નથી. આ સૂચિત જાત કોલરોટ સામે પ્રતિકારક અને ફાયટોપથોરાના રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારકતા દર્શાવે છે.



(સહ સંશોધન યૈજ્ઞાનિક, હલકાં ધાન્ય સંશોધન કેન્દ્ર, ન.ફ.યુ., વઘઈ)

૪.૫ બ્રોકોલીના ઘરૂ પર વિવિધ કલરની શેડનેટ નો પ્રતિસાદ

ગુજરાતમાં બ્રોકોલીના ઘરૂ ઉછેરતા ખેડૂતો અને નર્સરીધારકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે બ્રોકોલીનું ઘરૂ ૫૦ ટકા લાલ શેડનેટમાં તૈયાર કરવાથી વહેલું બીજ સ્ફૂરણ, વધારે સારી ટકાઉ શક્તિ અને ઘરૂના ઉત્તમ વિકાસની સાથે વધુ




ચોખ્ખી આવક મેળવી શકાય છે.

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, બાગાયત વિભાગ, ન.મ.ફ.મ.વિ. ન.ફ.યુ., નવસારી)

૪.૬ વહેલી પાકતી લીલી હળદરની નવી જાત

લીલી હળદર પકવતા દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોની ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન વાવણી કરવા માટે વહેલી પાકતી અને સલાડ માટે અનુકૂળ જી.એન.ટી.૪ (અમૃતા) જાતની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ જાતનું સરેરાશ લીલા ગાંઠિયાનું ઉત્પાદન ૪૦.૮૫ ટન/હે. વાવણીના ૧૫૦ દિવસ પછી આવે છે, જે રાષ્ટ્રિય અંકુશ જાત પ્રગતિ અને સ્થાનિક અંકુશ જાતો જી.એન.ટી.-૩ અને જી.એન.ટી.-૨ કરતા અનુક્રમે ૨૬.૬૯%, ૬૧.૮૬% તથા ૮૮.૪૬% જેટલું વધુ લીલા ગાંઠિયાનું ઉત્પાદન આપે છે. આ જાતમાં વધુ ગાંઠિયાનું વજન, ગાંઠિયાની લંબાઈ, ગાંઠિયાની પહોળાઈ વધુ સંખ્યામાં માતૃગાંઠની સાથે અંગુલી ગાંઠો ધરાવે છે. આ જાતમાં વધારે કકુર્મીન, આવશ્યક ઉચ્ચન તેલ અને જરૂરી અપેક્ષિત લીલા ગાંઠિયાના ગુણવત્તાના લક્ષણો ધરાવતી હોવાથી સલાડના હેતુ માટે યોગ્ય છે. જી.એન.ટી.૪ (અમૃતા) જાત ગાંઠિયાનાં સડા સામે રોગ પ્રતિકારક અને પાનના ટપકાંનાં રોગ સામે મધ્યમરોગ પ્રતિકારકતા ધરાવે છે.



(પ્રાધ્યાપક અને વડા, જનીનવિદ્યા અને વનસ્પતિ સંવર્ધન વિભાગ, ન.મ.ફ.મ., ન.ફ.યુ., નવસારી)

પ. ફૂલ પાકો

પ.૧ પોલીહાઉસમાં ઓર્કિડની બેન્ચિંગ સીસ્ટમની નીચે હંસરાજને વિવિધ માધ્યમમાં મૂલ્યાંકન

કુદરતી હવા-ઉજાસવાળા પોલીહાઉસમાં ઓર્કિડની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, બેન્ચિંગ સિસ્ટમની નીચે ગોણપાક



તરીકે હંસરાજને કોકોપીટ મીડિયામાં ઉગાડવાથી છોડની વધુ સારી વૃદ્ધિ અને પાનનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

નોંધ: ચુરિયા- મહિનાના પ્રથમ અઠવાડિયામાં એકવાર ૫૦ મિ.ગ્રા./લિ. સાંદ્રતાવાળું પાણી ૧૦૦ મિ.લિ./કુંડાદીઠ આપવું. ૧૯:૧૯:૧૯ NPK- મહિનાના ત્રીજા અઠવાડિયામાં એકવાર ૫૦ મિ.ગ્રા./લિ સાંદ્રતાવાળું પાણી ૧૦૦ મિ.લિ./કુંડાદીઠ આપવું. કુંડાનું માપ : ૧૬ x ૧૧ સેમી. ૧૫૦૦ સીસી



(પ્રાધ્યાપક અને વડા, પુષ્પ વિજ્ઞાન વિભાગ, અબામ, ન.કૃ.યુ.,નવસારી)

૫.૨ મુન કેક્ટસની કલમ વિકસાવવા માટે મુલકાંડની પ્રકાર અને લંબાઈની અસર

ગુજરાતનાં નર્સરી ધારકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, કુદરતી હવા-ઉજાસવાળા પોલીહાઉસમાં મુન કેક્ટસની કલમ બનાવી વિકસાવવા માટે જીમ્નોકેલીસીયમ મિહાનોવિચી (ઉપરોપ)ને ૩ ધાર વાળા ૫ સેમી. ઉંચાઈ વાળા હાઈલોસેરીયસ મૂલકાંડ ઉપર કલમ કરવાથી કલમોનો ઊંચો જીવિત-શેષ દર તેમજ કલમ પર વધુ ફુલો અને બેબી કેક્ટસ મેળવી શકાય છે.



(પ્રાધ્યાપક અને વડા, પુષ્પ વિજ્ઞાન વિભાગ, અબામ, ન.કૃ.યુ.,નવસારી)

૬. સેન્દ્રિય ખેતી

૬.૧ વિવિધ પાક અવશેષોનો ઉપયોગ કરીને વર્મીકમ્પોસ્ટિંગ માટે બે એપીજીક અળસિયાની પ્રજાતિઓની અસરકારકતાનું મૂલ્યાંકન

વર્મીકમ્પોસ્ટ બનાવતા ગુજરાતના ખેડૂતોને આથી ભલામણ કરવામાં



આવે છે કે કેળના છોડના અવશેષોમાંથી (પાન અને થડ) પોષક તત્વોથી ભરપૂર સારી ગુણવત્તાવાળું અળસિયાનું ખાતર અંદાજિત ૯૦ દિવસે બનાવવા યુદ્ધિલસ યુજેનિયા અથવા આઈસેનિયા ફેટીડા અળસિયાની જાતનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

નોંધ : કેળના છોડના અવશેષોમાંથી અળસિયાના ખાતર બનાવવા નીચે મુજબની પદ્ધતી અપનાવવી

- ઉપરોક્ત દરેક પાકના કચરાને યાંત્રિક ચોપરની મદદથી અંદાજિત ૫ થી ૧૦ સેમી.ની કદના ટુંકડા કરવા.
- ૧૫૦ કિલો સૂકા વજન માટે અંદાજિત નીચે મુજબનું વજન ૮×૪×૨ ફુટના બેડમાં લેવું.
- કેળાના છોડનો કચરો (૭૦%) વજન- ૧૦૫૦ કિલો (૯૦% ભેજ પ્રમાણે) + ઢોરનું છાણ (૩૦%) વજન- ૨૨૫ કિલો (૮૦% ભેજ પ્રમાણે)
- ૩૦ દિવસ પછી ૧.૫ કિગ્રા યુદ્ધિલસ યુજેનિયા અથવા તો ઈસેનિયા ફેટીડા અળસિયા બેડમાં છોડો.
- વૈકલ્પિક રીતે, ડાંગરનું પરાળ અને શેરડીની પતારીમાંથી ઉપરોક્ત અળસિયાની જાતનો ઉપયોગ કરવાથી અનુક્રમે અંદાજિત ૧૦૫ અને ૧૨૦ દિવસે એનાજ જેવી ગુણવત્તાવાળું અળસિયાનું ખાતર તૈયાર થાય છે.
- નોંધ: ડાંગરનું પરાળ અને શેરડીની પતારીમાંથી અળસિયાના ખાતર બનાવવા નીચે મુજબની પદ્ધતી અપનાવવી
- ઉપરોક્ત દરેક પાકના કચરાને યાંત્રિક ચોપરની મદદથી અંદાજિત ૫ થી ૧૦ સેમી. ની કદના ટુંકડા કરવા.
- ૧૫૦ કિલો સૂકા વજન માટે અંદાજિત નીચે મુજબનું વજન ૮×૪×૨ ફુટ ના બેડમાં લેવું.
- ડાંગરનું પરાળ (૭૦%) વજન- ૧૩૧ કિલો (૨૦% ભેજ પ્રમાણે) + ઢોરનું છાણ (૩૦%) વજન- ૨૨૫ કિલો (૮૦ % ભેજ પ્રમાણે) અથવા
- શેરડીની પતારી (૭૦%) વજન- ૧૨૩ કિલો (૧૫% ભેજ પ્રમાણે) + ઢોરનું છાણ (૩૦%) વજન- ૨૨૫ કિલો (૮૦% ભેજ પ્રમાણે)



૩૦ દિવસ પછી ૧.૫ કિગ્રા યુરિલસ યુજેનીયા અથવા તો ઇસેનિયા ફેટીડા અળસિયા બેડમાં છોડો.



કેળના છોડ, ડાંગરનું પરાળ અને શેરડીની પતારીમાંથી ગુણવત્તાવાળુ અળસિયાનું ખાતર

(આચાર્ય, બાગાયત પોલીટેકનીક, ન.કૃ.યુ.નવસારી)

૭. કૃષિ ઇજનેરી

૭.૧ લીંબોળીના બીજ અર્કના છંટકાવ માટે બેટરી સંચાલિત સ્પ્રેયરની ડિઝાઇન અને વિકાસ

નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય, નવસારી દ્વારા વિકસાવેલ ફરતી ફ્લસ્ક પ્રકારની નોઝલનો ૬.૦૦ વોલ્ટની બેટરી દ્વારા સંચાલિત નેપસેક સ્પ્રેયરમાં લીંબોળીના બીજના અર્કનો (NSKE) ત્રણ ફૂટ ઊંચાઈથી અત્યારે મળતી નેપસેક સ્પ્રેયરની નોઝલ જેટલીજ કામગીરી અને અને ટીંપાના વેરણ સાથે નોઝલ બ્લોકેજ થયા વગર છંટકાવ કરવા માટે ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(કૃષિ ઇજનેરી વિભાગ અને કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, ન.મ.કૃ.મ., ન.કૃ.યુ., નવસારી)

૭.૨ નાશવંત ખોરાક ઉત્પાદનો માટે SPV સંચાલિત રેફ્રિજરેટિંગ સિસ્ટમનો વિકાસ અને કામગીરીનું મૂલ્યાંકન

ઘરેલું વપરાશકારોને ૩૦૦ L રેફ્રિજરેટરમાં નાશવંત ખાદ્ય ઉત્પાદનોના પરંપરાગત સંગ્રહ માટે નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ “SPV પાવર સપ્લાય, ઓફ લાઇન ગ્રીડ સિસ્ટમનો” ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. SPV પાવર



સપ્લાય સિસ્ટમ જેમાં ૧ kW પોલિક્રિસ્ટલાઇન સોલર પેનલ, ૧ KVA પ્યોર સાઇન વેવ ઇન્વર્ટર અને ૨૦૦AH, ૨૪ V લીડ એસિડ ડીપ ડિસ્ચાર્જ બેટરી બેંક અને સિસ્ટમ પેબેક સમયગાળો ૯ વર્ષનો હોવાનું જણાયું છે.



(સહ પ્રાધ્યાપક, બેસિક એન્જિનિયરિંગ એન્ડ એપ્લાઇડ સાયન્સીસ વિભાગ, કૃષિ ઇજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, ન.ફ.યુ. કેડીયાપાડા)

૭.૩ કેળાંની લુમ કાપવા માટેના સાધનની વિકસીત ડિઝાઇન

કેળ ઉગાડતા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે કાપણીના સમય અને મજૂર ઓછા કરવા માટે નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય, નવસારી દ્વારા ડિઝાઇન કરી અને વિકાસવેલ કેળાંની લુમ કાપવાનું સાધન મહત્તમ ૨૦ ± ૫ કિ.ગ્રા. કેળાંની લૂમના વજન અને ૪૦ ± ૫ મી.મી. કેળના દંડા ની જડાઈ માટે વાપરવું.


(પ્રાધ્યાપક અને વડા, પી.એચ.ટી. વિભાગ, અભામ, ન.ફ.યુ. નવસારી.)

૮. મૂલ્યવૃદ્ધિ

૮.૧ એલોવીરા - આમળાનો મીક્ષ રસ બનાવવા માટેની વિકસીત પદ્ધતિ

પ્રોસેસરો અને ફળોના રસ સાથે સંકળાયેલ ઉત્પાદકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, એલોવીરા અને આમળાનો મીક્ષ રસ બનાવવા માટે ૭૫:૨૫ પ્રમાણ મુજબ ૮ ગ્રામ ખાંડ પ્રતિ ૧૦૦ મિ.લિ. રસમાં ઉમેરી ટી.એસ.એસ.નું પ્રમાણ ૧૨° બ્રીક્ષ જાળવી સંચય ૩ ગ્રામ અને આદુનો રસ ૩ મિ.લિ. પ્રતિ લિટર મીક્ષ રસ પ્રમાણે ઉમેરવા. ત્યારબાદ મીક્ષ રસને ૯૫+૧° સે. તાપમાને ૫ મિનિટ સુધી ગરમ કરી કાચની બોટલમાં ભર્યા બાદ ૯૫+૧° સે. તાપમાને ૩૦ મિનિટ સુધી ગરમ કરવું. આ રીતે પેક કરેલ મીક્ષ રસને ૮ માસ સુધી સામાન્ય તાપમાને સંગ્રહ કરી શકાય છે.





એલોવીરા - આમળાનો મીક્ષ રસ

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, પી.એચ.ટી. વિભાગ, અબામ, ન.કૃ.યુ. નવસારી.)

૮.૨ કેસર કેરીની ચીરીઓને ઓસ્મો-એર દ્વારા સુકવણી કરવા માટેની વિકસીત પદ્ધતિ

પ્રોસેસરો અને ઉત્પાદકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, કેસર કેરીના ફળોમાંથી ઓસ્મો-એર દ્વારા સુકવણી કરીને ચીરીઓ તૈયાર કરવા માટે કેરીને ઉતાર્યા પછી છઠ્ઠા દિવસે 1.5 ± 0.2 સેમી. જાડાઈની ચીરીઓને 40° સે તાપમાને અને 50° દ્રિશ ખાંડની ચાસણી વાળા ઓસ્મોટીક દ્રાવણમાં ૨૪ કલાક ઓસ્મોટીક ટ્રીટમેન્ટ આપ્યા બાદ 15 ± 0.4 % ભેજનું પ્રમાણ રહે ત્યાં સુધી કેબિનેટ ડ્રાયર દ્વારા સુકવણી કરવી. આ પદ્ધતિથી તૈયાર કરવામાં આવેલ ઓસ્મો-એર સુકવણી કરેલ ચીરીઓમાં ૩૦.૮૬% ઉત્પાદન સાથે ઓછું બ્રાઉનીંગ તેમજ વધારે બીટાકેરોટીન અને સારી સ્વીકાર્યતા ધરાવે છે. ઓસ્મો-એર સુકવણી કરેલ ચીરીઓનો ઉત્પાદન ખર્ચ રૂ. ૮૩૩ પ્રતિ કિલો થાય છે અને ૯૫ માઈક્રોન પોલીપ્રોપીલીનની થેલીમાં સામાન્ય તાપમાને ૬ મહિના સુધી સંગ્રહ કરી શકાય છે.




કેસર કેરીની ઓસ્મો-એર સુકવણી કરેલ ચીરીઓ

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, પી.એચ.ટી. વિભાગ, અબામ, ન.કૃ.યુ. નવસારી.)

૮.૩ ચીકુ પલ્પ અને શેરડીના રસ આધારીત ચીકુબાર બનાવવા માટેની વિકસીત પદ્ધતિ

પ્રોસેસરો અને ઉત્પાદકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, ચીકુબાર બનાવવા માટે ચીકુ પલ્પ અને શેરડીનો રસ ૬૦:૪૦ પ્રમાણ મુજબ મીક્ષ કરી, ૦.૫ % પેક્ટીન ઉમેરી, ૪૦°બ્રીક્ષ ટી.એસ.એસ. થાય ત્યાં સુધી ખુદા વાસણમાં ગરમ કરી તેમાં ૧૦૦ પીપીએમ પોટેશીયમ મેટા બાય સલ્ફાઈટ ઉમેરવુ. ત્યારબાદ આ મીશ્રણને ૧૦ મી.મી. જાડાઈનું લેયર એસ.એસ. ટ્રેમાં પાથરી, ૧૬±૦.૫% ભેજનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે ત્યાં સુધી કેબિનેટ ડ્રાયરમાં ૬૦°સે. તાપમાને સુકવવું. આ રીતે તૈયાર થયેલ ચીકુ બારના ૨.૫×૨.૫×૦.૬ સેમી.ના ટુકડા ૯૫ માઈક્રોન એચ.ડી.પી.ઈ. બેગમાં પેક કરવામાં આવે તો ઝાંખી પડ્યા વગર, વધારે આઈરનનું પ્રમાણ અને સ્વીકાર્યતા સાથે ૯ માસ સુધી સામાન્ય તાપમાને સંગ્રહ કરી શકાય છે.



ચીકુ પલ્પ અને શેરડીના રસમાંથી બનાવેલ ચીકુબાર

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, પી.એચ.ટી. વિભાગ, અબામ, ન.કૃ.યુ. નવસારી)

૮.૪ ઢીંગરી મુશરૂમની ડબ્બાબંધી માટેની વિકસીત પદ્ધતિ

પ્રોસેસર્સ અને ઉદ્યોગ સાહસિકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઢીંગરી મુશરૂમ ને સારી ગુણવત્તા સાથે ૬ મહિના સુધી સંગ્રહિત અને ઉપયોગ કરવા, ૮૫૦ ગ્રા. ક્ષમતા વાળા એ-૨-૦.૫ એસ. આર. ટીન કેનમાં નીચે દર્શાવેલા પગલાં ક્રમ પ્રમાણે અનુસરી સાચવણી કરવી: મુશરૂમ ને ૦.૧% પોટેશિયમ મેટાબાઈ સલ્ફાઈટના દ્રાવણમાં ઘોયા બાદ બ્લોન્ચિંગ કરવું, ૪૦૦ ગ્રામ મુશરૂમને ડબ્બામાં ભરી, ૨.૦૦ % સોડિયમ ક્લોરાઈડ અને ૦.૦૫ % સાઈટ્રિક એસીડ ધરાવતાં દ્રાવણ થી કવર કરવું,



ઢાંકણનું કલીંચિંગ, એક્ઝોસ્ટિંગ, સીમિંગ, ૧૨૧ ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અને ૧૫ પી.એસ.આઈ. દબાણે, ૨૫ મિનિટ માટે રિટોર્ટિંગ કર્યા બાદ ચિલ્ડ પાણીમાં ડૂબાડી ઠંડા કરવા.



ડબ્બાબંધી કરેલ ઢીંગરી મુશરૂમ

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, પી.એચ.ટી. વિભાગ, અબાવકોન, ન.કૃ.યુ. નવસારી)

૮.૫ ચાનો અર્ક આધારીત કેન્ડી બનાવવાની પદ્ધતિ

પ્રસંસ્કરણ કરો ને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ચા ની કેન્ડી બનાવવા માટે ચા નો અર્ક, લિક્વિડ ગ્લુકોઝ, ખાંડ અને કોન્ડેન્સડ મિલ્ક ને અનુક્રમે ૧૬મિ.લિ., ૨૪ ગ્રામ, ૪૯ ગ્રામ અને ૧૧ ગ્રામ પ્રમાણે લઈ નવસારી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય, નવસારી દ્વારા વિકસાવેલ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો. જેમાં બધીજ સામગ્રીને ભેળવી ૨૫૪° સે. તાપમાને ૧૫ મિનિટ માટે ગરમ કરો, બીબમાં ઢાળી ૨૦ મિનિટ ઠંડુ કરી, બિબામાંથી કાઢી લેવું, કઠણ થવા માટે ૨૫° સે. અને ૪૫ % ભેજ વાળા ડીહ્યુમીડિફાઈડ રૂમમાં ૨ કલાક રાખી, ટ્રેપ્પિંગ અને પેકેજિંગ કરવું. ૧૦૦ ગ્રામ ચા-કેન્ડી બનાવવા રૂમ. ૧૬.૮૦ ના ખર્ચની સામે ૧૯ % નો ચોખ્ખા નફા મળે છે.

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, પી.એચ.ટી. વિભાગ, અબાવકોન, ન.કૃ.યુ. નવસારી)

૯. વનિય/ઔસધિય પાકો

૯.૧ અશોક સરાકા અશોકા (રોકસબ.) વિલ્ડ. ની વિવિધ અંતર હેઠળ વૃદ્ધિ અને છાલ બાયોમાસ સંભવિતતાનો અભ્યાસ

નર્સરીધારકને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે અશોકના બીજનો વધુ

ઉગાવો (>૮૫%) મેળવવા માટે તેના મોટા બીજ (એક બીજ નું વજન ૯.૯ થી ૧૩ ગ્રા.) પસંદ કરવા અને ત્યારબાદ તેને ૨૪ કલાક સાદા પાણીમાં ડુબાડી રાખવા. ખેડૂતોને સુચવવાનું કે છાલની લણણી માટે અશોકનું વાવેતર ૧મી x ૨મી ના અંતરે રાખવું અને ૫.૫ વર્ષે છાલ ઉત્પાદન મેળવી વાવેતરને (કાપણી /લણણી) કોપાઈસ પદ્ધતિ દ્વારા વૃક્ષ દીઠ ૨ થી ૩ ડાળી (શુટ) રાખવી જેથી વધુ વિકાસ અને છાલનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય.



(પી.આઈ. અને એચ.ઓ.ડી., સીલ્વી. અને એગ્રોફો., વનીય મહાવિદ્યાલય, ન.કૃ.યુ., નવસારી)

૯.૨ ખાટી ચમોલ (બોહીનીયા માલાબારીકા રોક્સબી.) માં અંકુરણ અને પ્રારંભિક વૃદ્ધિ પર વાવણી પહેલાની સારવારનો પ્રભાવ

ખેડૂતો, વનપાલો અને નર્સરીમાં રોપા ઉછેરનારાઓને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ખાટી ચામોલના બીજોને ૩૦ મિનિટ સુધી ૯૮ ટકા સાંદ્ર સલ્ફ્યુરીક એસિડ (૯૮ % Conc. H_2SO_4) માં અને ત્યાર બાદ ૨૪



કલાક માટે સામાન્ય પાણીમાં ભીંજવ્યા બાદ વાવેતર કરવાથી વધારે બીજ-અંકુરણ મળે છે તેમજ રોપાઓનો ઝડપી વિકાસ થાય છે.



(પી.આઈ. અને એચ.ઓ.ડી., સીલ્વી. અને એગ્રોફો., વનીય મહાવિદ્યાલય, ન.ફ.યુ., નવસારી)

૧૦. મશરૂમની ખેતી

૧૦.૧ ડાંગમાં ઢીંગરી મશરૂમની ખેતી માટે સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ સબસ્ટ્રેટ અને તેમના સંયોજનોનું મૂલ્યાંકન

ગુજરાતના ઢીંગરી મશરૂમની (પ્લુરોટસ ઓસ્ટ્રીટસ) ખેતી કરતા ખેડૂતોને ડાંગરનું પરાળ (૧૦૦%) અથવા નાગલી અને ડાંગરનું પરાળ (૫૦:૫૦) અથવા ઘઉંનું પરાળ (૧૦૦%) અથવા નાગલી અને ડાંગરનું પરાળ (૭૦:૩૦) અથવા નાગલીનું પરાળ (૧૦૦%) માધ્યમ તરીકે ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(આચાર્ય, કૃષી મહાવિદ્યાલય, ન.ફ.યુ., વઘઈ)

૧૦.૨ ઢીંગરી મશરૂમની ખેતી માટે વિવિધ અનાજના સ્પાનનું મૂલ્યાંકન

ગુજરાતના ઢીંગરી મશરૂમના (પ્લુરોટસ ઓસ્ટ્રીટસ) બીજ ઉત્પાદકોને જુવાર અથવા નાગલી અથવા વરી અથવા ઘઉંના દાણાનો માધ્યમ તરીકે ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(આચાર્ય, કૃષી મહાવિદ્યાલય, ન.ફ.યુ., વઘઈ)



દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીની સમગ્ર ગુજરાત માટે સંશોધન ભલામણો-૨૦૨૪

૧. પાક સુધારણા

૧.૧ વરીયાળી : ગુજરાત વરીયાળી ૩ (જીએફ ૩: સુગંધા)

ગુજરાત રાજ્યના ચોમાસુ વરીયાળીની વાવણી કરતા ખેડૂતોને મોટા દાણા વાળી, વધુ ઉત્પાદન આપતી અને સારી ગુણવત્તા ધરાવતી જાત ગુજરાત વરીયાળી ૩ (સુગંધા) નુ વાવેતર કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ જાતના દાણાનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૨૧૧૫ કિ.ગ્રા./હે છે, જે અંકુશ જાત ગુજરાત વરીયાળી ૧૨ સ્થાનિક સંદર્ભ જાત કરતા ૧૮.૧૫ ટકા વધારે છે. આ જાતમાં ચક્કરની સંખ્યા પ્રતિ છોડ અને ઉપચક્કરની સંખ્યા પ્રતિ ચક્કર સંદર્ભ જાતની સરખામણીએ વધુ છે. ચક્કરમાં દાણા ધનિષ્ઠ રીતે ગોઠવાયેલા છે અને છોડમાં પલુર ઓછુ જોવા મળે છે. આ જાત રામુલારીયા બ્લાઈટ (ચરમી) રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે.

(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, બીજ મસાલા સંશોધન કેન્દ્ર, સ.દાં.કૃ.યુ., જગુદણ)

૧.૨ સંકર ભીંડા (ગુજરાત સંકર ભીંડા ૨૦૬ (જીઓએચ ૨૦૬ : હરીત ભીંડા)

ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસુ ઋતુમાં ભીંડાની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ભીંડાની સંકરજાત ગુજરાત સંકર ભીંડા ૨૦૬ (હરીત ભીંડા)નું વાવેતર કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ જાતનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૨૩.૨૬ કિવ./હે છે, જે સ્થાનિક અંકુશ જાતો જીએઓએચ ૪, જીએઓ ૫, જીએઓ ૮, એઓએલ ૨૩-૧ અને રાષ્ટ્રીય અંકુશ જાત પુસા સાવની કરતા અનુક્રમે ૬.૯૭, ૧૦.૪૦, ૫.૫૮, ૨૬.૧૦ અને ૧૫.૪૦ ટકા વધારે છે. આ જાતના ભીંડા મધ્યમ લંબાઈના, ઘાટા લીલા રંગના, કુણા અને લીસી સપાટી સાથે પાતળી ટોચ ધરાવે છે. આ જાત પીળી નસનો પચરંગીયો અને એનેસન પાનનો કોકડવા સામે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે.

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર, જીનેટિક એન્ડ પ્લાન્ટ બ્રીડિંગ વિભાગ,
ચી. પ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, સ.દાં.કૃ.યુ., સરદારકૃષિનગર)



૧.૩ અંજીર : પૂના અંજીર (એન્ડોર્સમેન્ટ)

ગુજરાતના શુષ્ક અને અર્ધ શુષ્ક વિસ્તારો માટે અંજીરની જાત પુના અંજીર વાપવા માટેની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ જાતના ફળનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૫.૧૫ ટન/હેક્ટર મળેલ છે. જે દિનકર, કોનાડ્રીયા, એકસેલ અને કિયાના કરતાં અનુક્રમે ૪૫.૪, ૨૩.૭, ૬૪.૫ અને ૩૧.૦ ટકા વધારે છે. આ જાતના ફળો બેલ આકારના, લીસી સપાટી ધરાવતા મધ્યમ કદના છે. ફળનો રંગ જાંબલી તથા માવો આછા જાંબલી લાલ રંગનો તેમજ સ્વાદે ગળ્યા હોય છે.

(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, કૃષિ વનીકરણ, સ.દાં.કૃ.યુ., સરદારકૃષિનગર)

૧.૪ ઘઉંના બિયારણને કોઠારમાં સંગ્રહ કરવાની અસરકારક પદ્ધતિ

ગુજરાતના બીજ ઉત્પાદકોને અને ખેડૂતોને ઘઉંના બિયારણનો સંગ્રહ કરવા માટે કોઠારમાં ૫૦ માઈક્રોનની પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં ભરી ૧૦ ગ્રામ એલ્યુમિનીયમ ફોસ્ફાઈડ (૫૬%) ની પડીકી મૂકી એચ.ડી.પી.ઈ.ના થેલામાં સંગ્રહિત કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ મુજબ બીજને ૧૮ માસ સુધી જીવાતની નુકશાનથી બચાવી શકાય છે તેમજ બીજ નો મહત્તમ ઉગાવો, બીજમાં ભેજનું યોગ્ય પ્રમાણ અને ઉગાવાનો વધુ જુસ્સો મળેલ છે.

(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, સીડ ટેકનોલોજી વિભાગ, સ.દાં.કૃ.યુ., સરદારકૃષિનગર)

૨. પાક સંરક્ષણ

૨.૧ કપાસમાં ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોનું વ્યવસ્થાપન

ગુજરાતના બીટી કપાસની ખેતી કરતા ખેડૂતોને શિપ્સ અને તડતડિયાના અસરકારક વ્યવસ્થાપન માટે જ્યારે ચૂસીયા જીવાતો શિપ્સ અને તડતડિયાની સંખ્યા પ્રતિ પાન દીઠ ૫ (પાંચ) કરતાં વધારે હોય ત્યારે એસીટામિપ્રીડ ૨૦ % એસ.પી. ૦.૦૦૩૪ % (૧.૭૦ ગ્રામ / ૧૦ લિટર પાણી, (સ્પીનેટોરમ ૧૧.૭૦% એસ.સી. ૦.૦૦૯૪ % ૭.૮૩ મિલી / ૧૦ લિટર પાણી અને ફ્લોનીકામાઈડ) ૫૦ % ડબલ્યુ.જી. ૦.૦૧૨૫ % (૨.૫૦ ગ્રામ / ૧૦ લિટર પાણી) અથવા ફિપ્રોનીલ



૧૮.૮૭ % એસ. સી. ૦.૦૧૧૮ % (૬.૨૫ મિલી/ ૧૦ લિટર પાણી (થાયામેથોક્ઝામ ૧૨.૬ % + લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૮.૫ % ઝેડ.સી. ૦.૦૦૭૪% (૩.૩૩ મિલી/ ૧૦ લિટર પાણી) અને ડીનેટોફ્યુરાન ૨૦% એસ.જી. ૦.૦૦૫૦ % (૨.૫૦ ગ્રામ/ ૧૦ લિટર પાણીનો પંદર દિવસના અંતરે ક્રમાનુસાર છંટકાવ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. છેલ્લા છંટકાવ અને વીણી વચ્ચેનો સમયગાળો એસીટામિપ્રીડ, સ્પીનેટોરમ અને ફ્લોનીકામાઈડ અથવા ફિપ્રોનીલ, થાયામેથોક્ઝામ + લેમડા સાયહેલોથ્રીન અને ડીનેટોફ્યુરાન માટે અનુક્રમે ૧૫, ૩૦, ૨૫ અથવા ૨૧, ૨૬ અને ૧૫ દિવસ રાખવો.

વર્ષ	પાક	જીવાત	જંતુનાશક	પ્રમાણ			માત્રા /૧૦ લિટર પાણી	છંટકાવના સમય	પ્રતીક્ષા સમય (દિવસ)
				સક્રિય તત્વ ગ્રામ/હે.	જંતુનાશકનું પ્રમાણ/ હે.	પાણીની જરૂરીયા ત/હે.			
૨૦૨૪	કપાસ	શ્રીપ્સ અને તડત ડિયા	એસીટામિપ્રીડ ૨૦ % એસ.પી	૨૦	૧૦૦	૬૦૦	૧.૭૦	પ્રથમ છંટકાવ પાંચથી વધુ	૧૫
			સ્પીનેટોરમ ૧૧.૭૦ % એસ.સી.	૫૬	૪૭૦		૭.૮૩	ચૂસીયા પ્રકારની જીવાતો હોય ત્યારે અને બીજા	૩૦
			ફ્લોનીકામાઈડ ૫૦ % ડબલ્યુ.જી. ૦.૦૧૨૫%	૭૫	૧૫૦		૨.૫૦	બે છંટકાવ પંદર દિવસના અંતરે કરવા	૨૫
અથવા									
૨૦૨૪	કપાસ	શ્રીપ્સ અને તડત ડિયા	ફિપ્રોનીલ ૧૮.૮૭ % એસ. સી.	૭૫	૩૭૫	૬૦૦	૬.૨૫	પ્રથમ છંટકાવ પાંચથી વધુ ચૂસીયા પ્રકારની	૨૧
			થાયામેથોક્ઝામ ૧૨.૬% + લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૯.૫% ઝેડ.સી.	૪૪	૨૦૦		૩.૩૩	જીવાતો હોય ત્યારે અને બીજા બે છંટકાવ પંદર દિવસના અંતરે	૨૬
			ડીનેટોફ્યુરાન ૨૦% એસ.જી.	૩૦	૧૫૦		૨.૫૦	કરવા.	૧૫

(સહ સંશોધન યૈજ્ઞાનિક, કપાસ સંશોધન, સ.દાં.ફૂ.યુ., તલોદ)

૨.૨ ખારેકમાં કથીરીનું રાસાયણિક નિયંત્રણ (એકહોક ભલામણ)

ગુજરાતમાં ખારેક ઉગાડતા ખેડૂતોએ કથીરીના અસરકારક નિયંત્રણ માટે પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઇસી ૦.૦૫૭ % (૧૦ મીલી/ ૧૦ લી) અથવા ફેનાઝાકિવન ૧૦ ઇસી ૦.૦૧ % (૧૦ મીલી/ ૧૦ લી) અથવા સ્પાયરોમેસીફેન ૨૪૦ એસસી ૦.૧૨ % (૫ મીલી/ ૧૦ લી) અથવા ઇથીઓન ૫૦ ઇસી ૦.૦૫ % (૨૦ મીલી / ૧૦ લી), ના બે છંટકાવ કરવા, પ્રથમ છંટકાવ જીવાત દેખાય ત્યારે અને ત્યારબાદ બીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસ બાદ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

વર્ષ	પાક	જીવાત	કિટનાશક	પ્રમાણ				છંટકાવનો સમય	પ્રતિક્ષા સમય (દિવસ)
				સાંદ્રતા (%)	કિટનાશકનું પ્રમાણ લી/હે.	માત્રા /૧૦ લી.	પાણી સાથે મિશ્રણ (લી/હે.)		
૨૦૨૪	ખારેક	કથીરી	પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઇસી	૦.૦૫૭%	૦.૫ લી.	૧૦ મીલી	૫૦૦	પ્રથમ છંટકાવ	૦૭
			ફેનાઝાકિવન ૧૦ ઇસી	૦.૦૧%	૦.૫ લી.	૧૦ મીલી		જીવાત દેખાય ત્યારે	૦૭
			સ્પાયરોમેસીફેન ૨૪૦ એસસી	૦.૧૨%	૦.૨૫ લી.	૫ મીલી		અને ત્યારબાદ	૦૭
			ઇથીઓન ૫૦ ઇસી	૦.૦૫%	૧ લી.	૨૦ મીલી		બીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસ બાદ	૦૫

(સહ સંશોધન પૈજાનિક, ખારેક સંશોધન, સ.દાં.કૃ.યુ., મુન્દ્રા)

૨.૩ ખારેકના પાકમાં ઉપદ્રવ કરતી કથીરીનું જૈવિક વ્યવસ્થાપન

ખારેકમાં કથીરી વ્યવસ્થાપન માટે નીચે મુજબના જૈવ-દ્રવ્યોના છંટકાવ કરવા.

- બ્યુવેરિયા બેસિયાના (૧ × ૧૦૮ cfu) (૪૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર) પ્રથમ છંટકાવ અને બીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસ બાદ એઝાડાયરેક્ટીન ૧૫૦૦ પીપીએમ (૫૦ મીલી/૧૦ લીટર) નો કરવો અથવા

- બ્યુવેરિયા બેસિયાના (1×10^8 cfu) (૪૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર) ના બે છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવા અથવા
- એકાડાયરેક્ટીન ૧૫૦૦ પીપીએમ (૫૦ મીલી/૧૦ લીટર) ના બે છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવા અથવા
- બ્યુવેરિયા બેસિયાના (1×10^8 cfu) (૪૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર)નો પ્રથમ છંટકાવ અને બીજો છંટકાવ ૧૫ દિવસ બાદ એકાડાયરેક્ટીન ૧૦૦૦૦ પીપીએમ (૩૦ મીલી/૧૦ લીટર)નો કરવો અથવા
- કરંજ તેલ + ૦.૧ % સાબુ સોલ્યુશન (૨૦ મીલી/૧૦ લીટર) ના બે છંટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવા

(સહ સંશોધન પૈજ્ઞાનિક, ખારેક સંશોધન, સ.દાં.કૃ.યુ., મુન્દ્રા)

૨.૪ સક્કરટેટીમાં ફળમાખીનું અસરકારક પર્યાવર્ણીય વ્યવસ્થાપન

ગુજરાતમાં શક્કરટેટીની ખેતી કરતા ખેડૂતોને ફળમાખીના અસરકારક અને પર્યાવરણીય અનુકુળ વ્યવસ્થાપન માટે ગોમૂત્ર + લીમડાના પાનનો અર્ક અથવા ગોમૂત્ર + રતનજયોતના પાનનો અર્ક અથવા ગોમૂત્ર + સીતાફળના પાનનો અર્ક ૧૦% + ૧૦% (૧લિ./૧૦ લિ. પાણી) પ્રમાણે ત્રણ છંટકાવ કરવા. પ્રથમ છંટકાવ જીવાતના ઉપદ્રવની શરૂઆત થયે અને ત્યારબાદ બે છંટકાવ ૧૦ દિવસના અંતરે કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

વર્ષ	પાક	જીવાત	કીટનાશક	પ્રમાણ			છંટકાવ નો સમય	પ્રતીક્ષા સમય (દિવસ)
				સંક્રાંતિ (%)	માત્રા મિલી/ ૧૦ લિટર પાણી	જીવિક કીટનાશક નું પ્રમાણ લીટર/હે.	પાણી સાથે મિશ્રણ (લીટર/હે.)	
૨૦૨૪	શક્કરટેટી	ફળમાખી	ગોમૂત્ર+લીમડા પાનનો અર્ક	૧૦+૧૦	૧૦૦૦ + ૧૦૦૦	૫૦ + ૫૦	૫૦૦	પ્રથમ છંટકાવ જીવાત ઉપદ્રવની શરૂઆત અને ત્યારબાદ બે છંટકાવ ૧૦ દિવસના ગાળે
			ગોમૂત્ર+રતનજયોત પાનનો અર્ક	૧૦+૧૦	૧૦૦૦ + ૧૦૦૦	૫૦ + ૫૦		-
			ગોમૂત્ર+સીતાફળ પાનનો અર્ક	૧૦+૧૦	૧૦૦૦ + ૧૦૦૦	૫૦ + ૫૦		-

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, કિટકશાસ્ત્ર વિભાગ, ચી. પ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, સ.દાં.કૃ.યુ., સરદારકૃષિનગર)



૨.૫ રાઈમાં મધમાખીઓ દ્વારા પરાગનયન વધારવા માટેની ભલામણ

ગુજરાતમાં રાઈની ખેતી કરતા ખેડૂતોએ મધમાખીઓને આકર્ષવા તેમજ વધુ ઉત્પાદન માટે ગોળનું દ્રાવણ ૧૫ % (૧.૫ કિગ્રા/૧૦ લીટર પાણી) મુજબનાં બે છંટકાવ કરવા, જે પૈકી પ્રથમ છંટકાવ ૧૦ % ફૂલ અવસ્થાએ અને બીજો છંટકાવ ૫૦ % ફૂલ અવસ્થાએ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, કિટકશાસ્ત્ર વિભાગ, ચી. પ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, સ.દાં.કૃ.યુ., સરદારકૃષિનગર)

૨.૬ મગફળીમાં આવતી સફેદ ફૂગથી થતા થડના સડાના સંકલિત વ્યવસ્થાપન માટે અલગ અલગ પ્રકારના સેન્દ્રીય ઇનપુટ્સનું મૂલ્યાંકન:

ટ્રાઈકોડર્મા હર્ઝિયનમ ૧% ડબલ્યુ.પી. (૨×૧૦^૬ સીએફયુ/ગ્રામ) (૧૦ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. વર્મિકમ્પોસ્ટ) વડે સારી રીતે સંમ્પર્ધિત કરેલ વર્મિકમ્પોસ્ટ (૧ ટન/હેક્ટર) તથા મગફળીના બિયારણને બીજામૃતમાં (૩૦૦ મિ.લી. પ્રતિ કિ.ગ્રા. બિયારણ) મુજબ પાંચ મિનિટ માટે બોળી રાખ્યા બાદ સૂકવણી કર્યા પછી ટ્રાઈકોડર્મા હર્ઝિયનમ (૧% ડબલ્યુ.પી.) (૨×૧૦^૬ સીએફયુ/ગ્રામ) (૧૦ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બિયારણ) મુજબ માવજત આપવાથી મગફળીમાં આવતી સફેદ ફૂગથી થતા થડના સડા સામે અસરકારક જણાયેલ છે.

(સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક , કુદરતી સંશાધન વ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર, સ.દાં.કૃ.યુ., સરદારકૃષિનગર)

૨.૭ મીલ્કી મશરૂમ ઉગાવા માટે જુદા જુદા માધ્યમોની અસર

ગુજરાતના મિલ્કી (દૂધિયા) મશરૂમની ખેતી કરતા ખેડૂતોને મશરૂમના વધુ ઉત્પાદન માટે ૫% સ્પાન (બીજ) (૫૦ ગ્રામ/કિ.ગ્રા) સાથે ઘંઉના પરાળને માધ્યમ તરીકે વાપરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કૃષિ પોલીટેક્નિક, સ.દાં.કૃ.યુ., ડીસા)

૩. બાગાયત અને કૃષિવનીકરણ

૩.૧ ગ્લેડીઓલસની ફૂલદાંડીની આવરદા વધારવા ભલામણ

ગ્લેડીઓલસની ફૂલદાંડીની આવરદા (વાઝલાઈફ) વધારવા માટે



ફૂલદાનીમાં ૫૦ પીપીએમ સોડીયમ હાઇપોકલોરાઇટ સાથે ૨ ટકા સુક્રોઝના દ્રાવણમાં મૂકવાની ઉપભોક્તાઓને ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, બાગાયત વિભાગ, ચી. પ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, સ.દાં.કૃ.યુ., સરદારકૃષિનગર)

૩.૨ પ્રવાહી જૈવિક ખાતર અને બાયો એજન્ટ દ્વારા શાકભાજી કચરાનું વ્યવસ્થાપન

શાકભાજી ઉગાડતા ખેડૂતો અને જૈવિક ખાતર બનાવવા રસ ધરાવતા વ્યવસાયિકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, ૪ કી.ગ્રા. શાકભાજીનો કચરો લઈને તેના ઉપર ૧ કી.ગ્રા. ઘનજીવામૃત નાંખવું અને તેમાં પ્રવાહી વેસ્ટડીકમ્પોઝરનું ૧ લીટર દ્રાવણ અઠવાડિયાના અંતરે પાંચ વખત નાંખવાથી ઝડપી કોદવાયેલું અને સારી ગુણવત્તાવાળું જૈવિક ખાતર મળે છે.

(વૈજ્ઞાનિક, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, બનાસકાંઠા-૧, સ.દાં.કૃ.યુ., ડીસા)

૩.૩ ખારેકમાં પીલા દ્વારા પ્રસર્જન પરની ભલામણ

ખારેક ઉગાડતા ખેડૂતો અને નર્સરી ધારકોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ખારેકના પીલા (ઓફ્શૂટ) ઓછામાં ઓછા ૪૦ સે.મી. નો ઘેરાવો હોય તેવા પસંદ કરવા અને તેને ઈન-સીટુ પદ્ધતિથી (જુલાઈ-ઓગસ્ટ દરમિયાન) તૈયાર કરવા અને છ મહિના પછી (જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી દરમિયાન) માતૃ છોડથી અલગ કરીને બે મહિના સુધી નર્સરી બેગમાં શેડનેટમાં રાખ્યા પછી વાવેતર કરવું (માર્ચ-એપ્રિલ દરમિયાન) જેથી જીવંત પીલા મળે છે.

(સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, ખારેક સંશોધન, સ.દાં.કૃ.યુ., મુન્દ્રા)

૩.૪ ખારેકની બરહી જાત માટે વાવેતર અંતરની ભલામણ

ખારેક ઉગાડતા ખેડૂતોને વધુ ઉપજ મેળવવા માટે ૬ મી. × ૬ મી. ના અંતરે વાવેતર કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, ખારેક સંશોધન, સ.દાં.કૃ.યુ., મુન્દ્રા)

૩.૫ ખારેકમાં પરાગનયન પછી પુષ્પગુચ્છને પેપર બેગથી ન ઢાંકવા પરની ભલામણ

ખારેક ઉગાડતા ખેડૂતોને વધુ ખર્ચથી બચવા માટે પરાગનયન પછી પુષ્પગુચ્છને પેપર બેગથી ન ઢાંકવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, ખારેક સંશોધન, સ.દાં.કૃ.યુ., મુન્દ્રા)

૩.૬ ખારેકમાં પીલાની સંખ્યા નક્કી કરવા પરની ભલામણ

ખારેક ઉગાડતા ઝાડના સારા વિકાસ અને વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે ઝાડ દીઠ વધુમાં વધુ ચાર પીલા રાખવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, ખારેક સંશોધન, સ.દાં.કૃ.યુ., મુન્દ્રા)

૪. કૃષિ ઈજનેરી, ફૂડ ટેકનોલોજી અને બાયોઈ અનર્જ

૪.૧ હાથથી ચાલતા ઇલેક્ટ્રિક પાવર વીડરનું નિર્માણ

પર્યાવરણને અનુકૂળતેમજ ઓછા ખર્ચે નીંદણ કામગીરી માટે સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસિત ઇલેક્ટ્રિક રોટરી પાવર વીડરનો ઉપયોગ કરવા ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(આચાર્ય, કોલેજ ઓફ આર.ઈ. એન્ડ ઈ.ઈ., સ.દાં.કૃ.યુ., સરદારકૃષિનગર)

૪.૨ ગાજરની ગળી કાતરી બનાવવાની તકનીક

ખેડૂતો /ઉદ્યોગ સાહસીકોને સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસાવેલ ગાજરની કેન્ડી બનાવવા માટેની તજજ્ઞતા અપનાવવા ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં બે સેન્ટીમીટર જાડાઈની ગાજરની પતરીને ૧૦૦૦ સે. તાપમાને ૩ મિનિટ માટે ગરમ પાણીમાં બ્લોન્ચિંગ કર્યા બાદ ૧ કિ.ગ્રા. ગાજર પતરીને ૬૦૦ બ્રિક્સની ૧.૫ કિ.ગ્રા. ખાંડની ચાસણીમાં ૧૨ કલાક સુધી ડુબાડી રાખ્યા બાદ નિતારીને ટ્રે ડ્રાયરમાં ૬૫૦ સે. તાપમાને અચળ વજન પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી



સુકવણી કરવી આ રીતે તૈયાર થયેલ કેન્ડીસ્ખ તાપમાને ૮૦ માઈક્રોન પોલીથીન બેગમાં છ માસ સુધી સુરક્ષિત રીતે સાચવી શકાય છે. વિકસિત ગાજર કેન્ડી વધારે વળતર આપે છે તેમજ આનો લાભ-ખર્ચ ગુણોત્તર મહત્તમ મળે છે.

(આચાર્ય, બાગાયત મહાવિદ્યાલય, સ.દાં.કૃ.યુ., જગુદણ)

૪.૩ લેમનગ્રાસ અર્ક ચુક્ત એન્ટી ઓક્સિડન્ટ ગુણધર્મ વાળું હર્બલ ગ્રીન યોગર્ટ બનાવવાની તકનીક

સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર અને કામઘેનુ યુનિવર્સિટી, ગાંધીનગર દ્વારા લેમનગ્રાસ (Cymbopogon citratus)નો અર્ક ઉમેરી બનાવેલ હર્બલ ગ્રીક યોગર્ટ ઉત્પાદન માટેની પદ્ધતિ વિકસાવવામાં આવી છે. આ પ્રમાણિત કરેલી પદ્ધતિમાં ગાયના દૂધ ૩.૦% ફેટ અને ૮.૫% એસ એન એફમાં બેક્ટેરિયા @ ૦.૦૧૫ % દૂધના વજન પ્રમાણે ઉમેરી, ૪૨ ડીગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને ૦.૬% એસીડીટી આવે ત્યાં સુધી રાખી ત્યારબાદ મસ્તીન કપડામાં બાંધીને ૧૦-૧૨ કલાક લટકાવી વધારાનું પાણી દૂર કરી, લેમનગ્રાસ નો અર્ક ૩.૦% મુજબ અને ૨૦% મુજબ દળેલી ખાંડ ઉમેરવામાં આવે છે. આ રીતે બનાવેલ હર્બલ ગ્રીક યોગર્ટમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ ગુણોમાં વધારો થાય છે તથા તેને ૩૫ દિવસ સુધી ૭+૧ ડીગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને ખાવાલાયક સ્થિતિમાં સંગ્રહિત કરી શકાય છે.

(આચાર્ય, જી.એન.પટેલ ડેરી સાયન્સ કોલેજ, કામઘેનુ યુનિવર્સિટી, સરદારકૃષિનગર)

૪.૪ સેકેલા ખારેકના ઠળીયા માંથી કોફી જેવું પીણું બનાવવાની તકનીક અને તેના એન્ટી ઓક્સિડન્ટ ગુણધર્મ

કામઘેનુ યુનિવર્સિટી, ગાંધીનગર અને સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી, સરદારકૃષિનગર દ્વારા સૂકા ખજૂરના (૫૦ ડીગ્રી સેલ્સિયસ / ૨૪ કલાક) બીજને શેકીને (૧૬૦ ડીગ્રી સેલ્સિયસ / ૩૦ મિનટ) સંવર્ધિત એન્ટિઓક્સિડન્ટ ગુણધર્મો સાથે કોફી જેવી પાવડર તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા વિકસાવવામાં આવી છે. પાઉડર જેવી વિકસિત કોફીમાં અનુક્રમે ૧૦.૫૭%, ૧૨.૩૮%, ૦.૯૯%, અને ૭૩.૪૩% ફેટ, પ્રોટીન,



એશ અને કાર્બોહાઇડ્રેટનું પ્રમાણ હતું. પાવડરની એબીટીએસ, ટીપીપીએચ અને એફઆરએપીની દ્રષ્ટિએ એન્ટીઓક્સિડન્ટ પ્રવૃત્તિ ૧૨.૭૬, ૦.૯૫ અને ૮.૯૩ MM TE/g હતી. કોફી જેવા પીણાને ૧૦૦ મિલી પાણીમાં ૪ ગ્રામ શેકેલા ખજૂરના બીજનો પાવડર (૧૬૦ ડીગ્રી સેલ્સિયસ /૩૦ મિનિટ) ઉમેરીને ૨ મિનિટ સુધી ઉકાળીને તૈયાર કરવામાં આવે છે. સ્ટેનિંગ પહેલાં ઉકાળવાના અંતે ૧૦ મિલી દૂધ (૩.૦% ફેટ અને ૮.૫% એસ એન એફ) ઉમેરીને પણ પીણું પી શકાય છે.

(આચાર્ય, જી.એન.પટેલ ડેરી સાયન્સ કોલેજ, કામધેનુ યુનિવર્સિટી, સરદારકૃષિનગર)

૪.૫ ઘઉંના જવારાના રસ અને તુલસીના પાનના રસનું મિશ્રિત જ્યુસ બનાવવાની તકનીક હાથથી ચાલતા ઇલેક્ટ્રિક પાવર વીડરનું નિર્માણ

ફૂડ ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદારકૃષિનગર દ્વારા વિકસાવેલ પદ્ધતિથી ઘઉંના જવારાનો તાજો રસ (૫.૨° બ્રિક્ષ ટીએસએસ), રામ તુલસીના પાનનો તાજો રસ(૩.૮° બ્રિક્ષ ટીએસએસ) અને પાણી, અનુક્રમે ૭૭:૧૮:૫ નું પ્રમાણ રાખી તેમાં ૧૦% મધ ઉમેરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ થી વિકસાવેલ તાજો રસ એન્ટીઓક્સીડન્ટનો સારો ગુણધર્મ ધરાવે છે.

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, ફૂડ પ્રોસેસિંગ વિભાગ, ફૂડ ટેકનોલોજી કોલેજ, સ.દાં.કૃ.યુ., સરદારકૃષિનગર)

૫. બેઝીક સાયન્સ અને હ્યુમાનીટીઝ

૫.૧ દાડમ (પુનિકા ગ્રેનેટમ)ના અર્કનું ફાયટોકેમિકલ અને એન્ટિમાઇક્રોબીયલ ગુણધર્મો માટેનું પૃથક્કરણ

દાડમની ભગવા જાતના વિવિધ ભાગો (પાંદડા, નર ફૂલો, છાલ, બીજ સાથેની એરિલ, શાખા અને ડાળી)નું પાંચ દ્રાવકો (ઇથાઇલ એસીટેટ, ક્લોરોફોર્મ, મિથેનોલ, એસેટોન અને પાણી)નો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ અર્ક પૈકી જોવા મળેલ ઉચ્ચતમ એન્ટિમાઇક્રોબીયલ પ્રવૃત્તિ અને ફાયટોકેમિકલ સામગ્રી નીચે મુજબ છે



અર્ક	પરીક્ષણમાં લીધેલ સુક્ષ્મજીવાણું સામે એન્ટિમાઈક્રોબાયલ પ્રવૃત્તિ (નિષેધ ઝોન મિલી મીટરમાં)
પાંદડાનો મીથિનોલીક અર્ક	સ્ટેફાયલોકોકસ ઓરીયસ MTCC 3160 (૨૪.૦૦±૦.૮૨)
છાલનો મીથિનોલીક અર્ક	પ્રોટીયસ વલ્ગેરીસ(૨૨.૦૦±૦.૮૨)
પાંદડાનો મીથિનોલીક અર્ક	બેસીલસ સીરસ MTCC 9017 (૧૮.૨૫±૧.૫૦)
શાખાનો મીથિનોલીક અર્ક	ઝેન્થોમોનાસ સ્પી. (૧૨.૭૫±૧.૭૧)
શાખાનોએસીટોનીક અર્ક	ઈરચેરીચીયાકોલી MTCC 739 (૨૨.૭૫±૧.૫૦)
શાખાનો મીથિનોલીક અર્ક	ફ્યુઝેરીયમઓક્સિસ્પોરમએફ. સ્પી.રીસીની(૧૬.૦૦±૦.૮૨)
છાલનો મીથિનોલીક અર્ક	અલ્ટરનેરિયા સ્પી.(૨૫.૫૦±૧.૨૮)
નર કૂલોનોએસીટોનીક અર્ક	ફ્યુઝેરીયમઉડમ(૧૪.૦૦±૧.૪૧)
	ફાયટોકેમિકલસામગ્રી
ડાળીનો મીથિનોલીક અર્ક	કુલર્કિનોલ્સ (૧૪૮.૬૪±૮.૦૩ mg GAE/100g DW)
નર કૂલોનોપાણીમાં અર્ક	કુલર્કલેવોનોઈડ (૪૧૫.૩૮±૧૮.૨૨mg QE/100g DW)
નર કૂલોનો મીથિનોલીક અર્ક	કુલએન્થોસાયનીન(૮.૫૨±૦.૩૮ mg CGE/100 g DW)
પાંદડાનો મીથિનોલીક અર્ક	કુલએન્ટીઓક્સિડન્ટપ્રવૃત્તિ (૮.૭૩±૦.૮milimole Fe ²⁺ reduction/g DW)

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગ, કોલેજ ઓફ બેજીક સાયન્સ એન્ડ હ્યુમાનીટીઝ, સ.દાં.ફ.યુ., સરદારકૃષિનગર)

૫.૨ ભેંસ અને ઘોડાના છાણનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ જીવામૃતનું ભૌતિક-રાસાયણિક અને જૈવ-રાસાયણિક મૂલ્યાંકન

બત્રી ભેંસના છાણનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ જીવામૃતમાં મહેસાણી ભેંસ અને કાઠિયાવાડી ઘોડાની સરખામણીમાં કુલ નાઇટ્રોજન (૩૭૨.૩૩૫ પીપીએમ), આયર્ન (૫.૯૧૬ પીપીએમ), જસત (૦.૯૩૮ પીપીએમ), મેંગેનીઝ (૧.૫૯૨ પીપીએમ) અને કોપર (૦.૧૨૪ પીપીએમ) ની માત્ર વધારે મળેલ. જ્યારે મહેસાણી ભેંસના છાણનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ જીવામૃતમાં કુલ ફોસ્ફરસની માત્રા (૧૧૬.૮૬૩ પીપીએમ) અન્ય બે પ્રાણીઓની સરખામણીમાં વધુ જોવા મળેલ. તદઉપરાંત, કાઠિયાવાડી ઘોડાના છાણનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવેલ જીવામૃતમાં પોટેશિયમ (૪૬૭.૪૬૩ પીપીએમ) અને ઇન્ડોલ એસિટિક એસિડ (૭.૧૯૩ પીપીએમ) વધુ માત્રામાં જોવા મળેલ છે. શિયાળાની ઋતુમાં બનાવામાં આવેલ જીવામૃતમાં ઉનાળા અને ચોમાસાની ઋતુઓની સરખામણીમાં નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, કોપર અને ઇન્ડોલ



એસિટિક એસિડનની માત્રા ઉંચી જોવા મળેલ છે. જ્યારે ઉનાળાની ઋતુમાં બનાવામાં આવેલ જીવામૃતમાં અન્ય બે ઋતુઓની સરખામણીમાં આયરન અને મેંગેનીઝ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળેલ છે.

(પ્રાધ્યાપક અને વડા, બાયો કેમેસ્ટ્રી વિભાગ, બેજુક સાયન્સ અને હ્યુમાનીટીઝ કોલેજ, સ.દાં.ફ.યુ., સરદારકૃષિનગર)

૫.૩ કાંકરેજ અને એચ.એફ. સંકર ગાયના છાણનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ જીવામૃતનું ભૌતિક-રાસાયણિક અને જૈવ-રાસાયણિક મૂલ્યાંકન

શિયાળાની ઋતુ માં બનાવેલ જીવામૃતમાં નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશીયમ તત્વોની માત્રા વધુ જોવા મળેલ જ્યારે ઉનાળામાં બનાવેલ જીવામૃતમાં જસત, મેંગેનીઝ, લોહ તત્વો તેમજ ચોમાસામાં બનાવેલ જીવામૃતમાં ઈનડોલ એસિટીક એસીડ હોર્મોનનું વધુ પ્રમાણ જોવા મળેલ. કાંકરેજ ગાયના છાણનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલ જીવામૃતમાં કુલ નાઈટ્રોજન (૪૩૭.૧૧ પીપીએમ), કુલ પોટાશીયમ (૪૬૩.૮૭ પીપીએમ), કુલ જસત (૧.૫૮ પીપીએમ), કુલ મેંગેનીઝ (૨.૨૯ પીપીએમ) અને કુલ કોપર (૦.૨૦૩ પીપીએમ) ની માત્રા વધારે છે જ્યારે ગીર ગાયના છાણથી બનાવેલ જીવામૃતમાં કુલ ફોસ્ફેટ (૧૩૫.૨૬ પીપીએમ) અને એચ.એફ. સંકર ગાયના છાણથી તૈયાર કરેલ જીવામૃતમાં કુલ લોહ તત્વ (૯.૭૮ પીપીએમ) અને ઈનડોલ એસિટીક એસીડ હોર્મોન (૬.૧૫ પીપીએમ) નું પ્રમાણ વધારે છે.

(યુનિટ હેડ, બાયો સાયન્સ રીસર્ચ સેન્ટર, સ.દાં.ફ.યુ., સરદારકૃષિનગર)

૫.૪ લિંગ રંગસૂત્ર વિશિષ્ટ જનીન આધારિત મલ્ટિપ્લેક્સ પીસીઆર ખજૂરના પરિપક્વ અને સીડલિંગ અવસ્થામાં નર અને માદાની ઓળખ

લિંગ રંગસૂત્ર વિશિષ્ટ જનીન આધારિત Dp-Penta-59 સાથે dpBGPAT માર્કરનું મલ્ટિપ્લેક્સ પીસીઆર ખજૂરના પરિપક્વ અને સીડલિંગ અવસ્થામાં માદા અને નરની ઓળખ માટે ઉપયોગી છે. મલ્ટિપ્લેક્સ પીસીઆરના એમ્પ્લીફિકેશન માટે, પ્રમાણભૂત સાયકલિંગ સ્થિતિ અને પીસીઆર પ્રતિક્રિયા ઘટક સાથે ૫૬° C એન્નીલિંગ તાપમાન યોગ્ય છે.



એસ. નં.	પ્રાઈમરનામ	પ્રાઈમરએક્સ	પ્રાઈમરઆર
1	dpBGPAT	AGAAAACCTGATATGCTCTCTG	TGTGATGCACTTGGTAACTACT
2	Dp-Penta-59	AAAGAGGAACTACGCCAGCA	GCACAAGCATTGAGGAGACA

(યુનિટ હેડ, બાયો સાયન્સ રીસર્ચ સેન્ટર, સ.દાં.ફ.યુ., સરદારકૃષિનગર)

૬. સામાજિક વિજ્ઞાન

૬.૧ ગ્રામીણ મહિલાઓમાં પ્રધાનમંત્રી ઉજવલા યોજનાની ઉપયોગિતા

એલપીજી ચુલ્હાના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા અને ગ્રામીણ મહિલાઓમાં પ્રદુષણ ફેલાવતું રસોઈ ઇંધણ પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે, સિલિન્ડર ફરી ભરાવવાના ભાવ ઘટાડવા અથવા સરકારી સબસિડી વધારવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. વધુમાં, ઉજવલા એલપીજી સ્ટવના શ્રેષ્ઠ ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગ્રામીણ મહિલાઓમાં તેમની સ્થાનિક બોલીમાં જાગૃતિ ઊભી કરવી જોઈએ.

(મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કૃષિ વિસ્તરણ અને સંચાર વ્યવસ્થાપન વિભાગ, આરપી પોષણ અને સમુદાય વિજ્ઞાન મહાવિદ્યાલય, સ.દાં.ફ.યુ., સરદારકૃષિનગર)

૬.૨ અજમાના એકરૂપતા અખતરાના આંકડા ઉપરથી મહત્તમ ક્યારા (પ્લોટ) ના કદ અને આકારનો અંદાજ

અજમા ઉપર ક્ષેત્ર પ્રયોગો માટે ૧૩.૫ મીટર કદનો ક્યારો (પ્લોટ) જેની ૫ મીટર લંબાઈવાળી ૬ હાર (૨.૭ મી. x ૫.૦ મી.) ૫% પ્રમાણભૂત ભૂલ સાથે ઓછામાં ઓછી ૪ (ચાર) પ્રતિકૃતિઓ સાથે ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (કૃષિ આંકડાશાસ્ત્ર), સામાજિક વિજ્ઞાન વિભાગ, બાગાયત મહાવિદ્યાલય, સ.દાં.ફ.યુ., જગુદણ)

